

JA金沢

# 金沢営農 ごよみ

2019年

高品質金沢産米づくり  
JA金沢中央・金沢営農協議会

生産者の皆様方には、この営農ごよみを活用していただき、高品質な金沢産の米づくりに励んで下さい。  
尚、ご不明な点がございましたら、JAにご相談下さい。

## 目 次


|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| ○『高品質金沢産米づくり運動』について         | 1～4   |
| ○異物混入対策について                 | 5     |
| ○農作業安全対策について                | 6～7   |
| ○水稻初期除草剤の使用時期に注意してください      | 8～9   |
| ○野焼きは法律で禁止されています            | 10    |
| ○道路の泥汚れ防止について               | 11    |
| ○次年度に向けた土づくりに実践             | 12    |
| ○コシヒカリー発肥料の選定にあたって          | 13    |
| ○〈営農情報〉気象変動に左右されない米づくりをめざして | 14～15 |
| ○水稻肥料銘柄一覧                   | 16    |
| ○畦畔除草剤の使用について               | 17    |
| ○水稻防除剤の登録内容（平成30年10月登録現在）   | 18～19 |
| ○本田除草剤の登録内容（平成30年10月登録現在）   | 20～21 |
| ○ゆめみづほ栽培ごよみ                 | 22～23 |
| ○コシヒカリ栽培ごよみ                 | 24～25 |
| ○雑草防除基準・病害虫基幹防除基準           | 26～27 |
| ○3月の作業（は種）                  | 28～29 |
| ○4月の作業（育苗、荒起し・代かき、基肥施用）     | 30～33 |
| ○5月の作業（田植え、除草剤散布）           | 34～35 |
| ○6月の作業（中干し、溝切り、中間追肥施用）      | 36～37 |
| ○7月の作業（穂肥施用、基幹防除）           | 38～41 |
| ○8月の作業（水管理、適期刈取り）           | 42～43 |
| ○9月の作業（乾燥、籾すり、出荷）           | 44～47 |
| ○10月の作業（土づくり）               | 48～49 |
| ○農地・農作業の委託について              | 50    |
| ○JAが提案する今後の稲作省力体系           | 51    |
| ○BB肥料側条基肥開度目安表              | 52～57 |
| ○農作業の工程管理（自己点検）に取り組もう       | 58～62 |
| ○2019年産 水稻生産履歴記録簿           | 63～70 |
| ○稲の病気の種類・着色粒の種類             | 71    |
| ○稲の害虫の種類                    | 72    |
| ○水田の主な雑草                    | 73    |



整粒歩合 80%  
以上の良質米



登熟不良による  
乳白粒



カメムシによる  
斑点米

# 高品質金沢産米づくり運動

## 基本目標

- 1等比率 90%以上
- 整粒歩合 80%以上
- 乳白粒 3%以下
- 胴割粒 2%以下
- 着色粒 (斑点米) 0
- コシヒカリ  
玄米タンパク含有率 6.5%以下
- ゆめみづほ  
玄米タンパク含有率 7.0%以下

## 重点事項

- 着色粒 (カメムシ斑点米) 発生防止
- 乳白粒発生防止
- 胴割粒発生防止

## 2019年度「高品質金沢産米づくり運動」実施事項

斑点米、乳白粒、胴割粒の発生防止をめざして

- 「10の推進技術」の実施
- 「5つの1か月対策」の徹底
- 土壌分析に基づく土づくり、深耕の実施



# 高品質金沢産

## 〔10の推進技術〕を基本に〔5つの1か月対策〕を

### 1

## 10の推進技術って……なに？

お米の品質を落とす主な要因には、①米粒が白濁する乳白粒、②米粒に亀裂が入る胴割粒、③カメムシによる斑点米があげられます。

それらの発生を抑え、きれいなお米に育てあげるためには、必要な技術がいくつもあります。

うま・きれ運動では、10の技術の実践を推進し、高品質なお米の生産を目指しています。

下の表で、1つずつ確認してみてください。たぶん、日頃からみなさんが実践されている技術ばかりのほずです。

つまり、10の推進技術とは、もはや当たり前とも言える「基本技術」であり、みんなで継続して徹底することで、高品質な金沢産米を安定して食卓へ届けるために必要な技術です。



〔乳白粒〕



〔胴割粒〕



〔斑点米〕



## 10の推進技術

★どれだけ実践しているか、チェックしてみましよう！

| 推進技術                              | 目 標  | チェック |
|-----------------------------------|--|------|
| 1 播種量<br>(うす播きの励行)                | ・ 1箱当たり130g (太植による過剰生育の抑制)   |      |
| 2 育苗日数<br>(健苗の育成)                 | ・ 播種から田植えまで <b>1か月以内</b> (初期育成の確保)   |      |
| 3 植付本数<br>(細植えの励行)                | ・ 1株当たり3~4本 (適正茎数の確保)  |      |
| 4 栽植密度<br>(優良茎の確保)                | ・ 地帯・作型に応じた適正な栽植密度の徹底<br>(適正茎数の確保)   |      |
| 5 適正な施肥<br>(栄養凋落防止<br>と登熟向上)      | ・ 高温登熟に対応した基肥一発施肥への切り替え<br>・ 生育状況に応じた追加穂肥の実施                                 |      |
| 6 田植え時期<br>(早植えの防止)               | ・ 5月田植えの励行 (過剰生育の防止)   |      |
| 7 中干し・溝切り<br>(遅発分げつの抑制)           | ・ 田植え <b>1か月後</b> からの実施 (過剰生育防止)<br>・ 中干し期間 <b>1か月</b> (コシヒカリ) の遵守           |      |
| 8 除草・防除<br>(畦畔等の除草と<br>カメムシ防除の徹底) | ・ 7月上旬までの追加除草<br>・ 水稻の生育ステージにあわせた適期防除の実施                                     |      |
| 9 水管理<br>(飽水管理の徹底)                | ・ 中干し後から出穂までの <b>約1か月</b> (コシヒカリ) の飽水管理<br>・ 出穂から刈取り直前までの <b>1か月以上</b> の飽水管理 |      |
| 10 刈取時期<br>(適期刈取りの励行)             | ・ 籾の黄化程度に応じた刈取り  |      |

# 米づくり運動

実践し、おいしくてきれいな金沢産米を食卓へ届けよう

## 2

### 5つの1か月対策って……なに？

「水稻」は「<sup>みず</sup>水の<sup>いね</sup>稲」と書くとおり、お米の生産にとって水は最も重要な要素であり欠かすことができないものです。その水は、みなさんがご存知のとおり、上手に活用することで、お米の食味・品質・収穫は安定します。


5つの1か月対策とは、お米の生育期間中の水管理を中心とした管理対策を、1か月ごとに区切りシンプルに整理したもので、うま・きれ運動の大きな技術柱の1つとなっています。

本対策も、10の推進技術と同様で、必要な「基本技術」であり、本年産から「5つの1か月」を意識し、対策を実践していきましょう。



### 5つの1か月対策のポイント

- 【1】育苗日数は、1か月以内（20～25日間）
- 【2】中干し開始は、田植え1か月後
- 【3】中干し期間は、1か月間（コシヒカリ）
- 【4】中干し後から出穂までは、約1か月間（コシヒカリ）の飽水管理
- 【5】出穂から刈取り直前までの1か月以上は、  
①乾かさない・②ずっと溜めない・③すぐ落とさない



〔図〕コシヒカリの茎数の推移

# 米の食味について

ご飯の食味は、粘り・硬さのような物理的要素や、香り・うま味などの化学成分に支配されている。物理的要素は、米の食味に対し7～8割も寄与している。

粘りは、主にデンプンを構成しているアミロースとアミロペクチンが関係しており、アミロースの含有率が高くなると粘りが弱くなって食味が劣る。

硬さはタンパク質と関係しており、タンパク質含有率が高い米は、ご飯が硬く、粘りが弱くなって食味が劣る。

## 食味値について

|       | 食味との関係  | 主な変動要因        |
|-------|---------|---------------|
| タンパク質 | 高いと食味低下 | 窒素の施用量、施用時期など |
| アミロース | 低いと食味よい | 品種特性、登熟温度など   |
| 水分    | 低いと食味低下 | 乾燥調製など        |
| 脂肪酸   | 低いと食味よい | 貯蔵中の温度、湿度など   |

## 良食味生産のポイント！

基本技術を励行し、健康なイネを栽培し、稔りをよくすることが重要である。適期作業、適正施肥、適正な防除の実施が良質米生産へとつながる。

### 玄米タンパク質 低下対策

〈目標〉 コシヒカリ6.5%以下 ゆめみづほ7.0%以下

#### ○生育・地力に応じた穂肥の施用

地力が低く、登熟後半に凋落しやすい地帯では緩効性肥料（穂肥一発肥料、有機入り等）を活用する。

#### 土づくり

有機物、土壌改良剤を施し、保肥力の高い土壌をつくる。作土深15cmを目標に耕深を確保する。

#### 水管理

適期に中干し、溝切りを実施する。出穂後は飽水管理で根の活力を維持する。

#### 収 穫

適期収穫に努める。  
〈籾黄化率目安〉 高温年85%・平年90%

# 異物混入対策について(注意)

近年、消費者・実需者のお米の安全・安心に対する要望は年々高まっており、特に異物混入に対してはとても敏感になっています。悪気がない場合であっても、大きな問題に発展する恐れがあります。

玄米に混入する異物としては、駆除剤・異品種の米・小石・草の種・ワラくず・ゴミ等であり、農機具の使用前や品種の変更時に十分な清掃で混入防止対策をお願い致します。このような事故が発生しないよう、納屋や作業場所のネズミ対策には、駆除剤を使用しないようお願い致します。

ネズミが住み着く理由は、エサとなる米粒などが残っていることが原因です。このため、掃除を徹底的に行うことが一番の対策になりますが、どうしても侵入を防ぐことが出来ない場合は、粘着シートなど異物混入の危険が少ないものを利用下さいますようお願いいたします。

# 農作業安全対策について

## 主な農作業事故の発生状況と対策


①トラクターが転倒・転落し、投げ出されて機体の下敷きになった。



安全キャブ・フレームのある  
トラクターを使用し、シート  
ベルト着用を徹底する




作業環境を確  
認し、危険性  
に配慮する



作業が終わったら、昇降路を  
上がる前にブレーキの連結  
ロックをする



乗用トラクターによる事故の実態



平成26年に発生した農作業死亡事故のうち、乗用トラクターによる死亡事故が27%を占めています。そのうち、8割近くが、ほ場や道路からの転倒・転落によるものです。

②草刈りしていたところ、足を滑らせて草刈り機で足を切った。



安定な姿勢を保って作業  
できるように、作業前に点  
検し、準備をしておく



ヘルメット、フェイスガード、安全靴、  
機械の安全カバーなどの防護を徹底する



### 刈払機事故の4つの特徴

1 斜面・法面での不安定な姿勢  
による事故 (29.5%)

- 傾斜地・法面は滑りやすい
- ⇒小段の設置、スパイク靴の着用

2 回転刃による事故  
(接触、飛散物) (29.5%)

- キックバックや小石、チップの飛散
- ⇒防護の徹底、飛散物カバーを外さない

3 詰まりなどの除去時の事故  
(18.2%)

- 回転を止めず、草の詰まりなどを除こうとして
- ⇒確実にエンジンを切ってから

4 周辺環境に起因する事故  
(15.9%)

- 草むらの中に潜む杭や空き缶など
- ⇒慣れた場所でも事前確認

3～5月は春の農作業安全確認運動、9～10月は秋の農作業安全確認運動です。  
下の事例を参考に農作業安全の対策を行って下さい。

### ③コンバインで手こぎ作業を行っていたところ、手が巻き込まれた。



緊急停止装置のついた機械を使用し、停止ボタンの位置などを確認しておく



適切な服装で作業し、機体の中に手を入れないようにする



まてロキツリ



軍手はつけない

ほ場の出入り口の整備を行う。また、進入退出路をバックで走行させるときは、補助者による誘導や確認を行う。



## コンバイン事故の4つの特徴

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>1</b> 移動・走行中の事故 (34.7%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●後退時に確認不足</li> <li>⇒補助者による誘導、合図の確認</li> </ul> | <p><b>2</b> 作業中の詰まり除去時の事故 (20.4%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●機械を止めずに詰まり除去</li> <li>⇒エンジン停止の徹底</li> </ul> |
| <p><b>3</b> 点検・整備中の事故 (16.8%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●回転部への注油、詰まり除去で</li> <li>⇒作業手順の順守</li> </ul>  | <p><b>4</b> 手こぎ作業の際の事故 (14.3%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●衣服がチェーンに引っ掛かり</li> <li>⇒作業に適した服装の徹底</li> </ul> |

## その他にも、農作業中には次のような事故が発生しています。

**熱中症**

夏に屋外で農作業をしていて、熱中症になった。

暑いときの作業

- ・作業時は定期的に日陰で休む。
- ・のどが渴いていなくても、定期的に水分補給をする。

**大風・豪雨のとき**

増水時に田の見回りに行き、水路に転落した。

※画像は環境省、(国研)農研機構、農水省HPより引用


農家の皆さんへ

# 農薬散布後の止水期間は

# 7

# 日間!

水田用除草剤や本田粒剤の  
散布後7日間は落水やかけ流しをしない!



効果の安定・環境への影響軽減のために、  
移植前の散布でも、必ず7日間止水しましょう。

JAグループ  全農

農薬工業会

# 水稻初期除草剤の使用時期に注意してください

水稻除草剤の移植前・播種前の使用時期が変更となりました。

移植前・播種前の使用は「**7日前まで**」です

適用内容変更後

移植栽培の使用時期は

植代後～移植**7日前**まで  
植代時（移植**7日前**まで）

直播栽培の使用時期は

直播の代かき後～は種**7日前**まで  
直播の代かき時（は種**7日前**まで）

移植前や播種前に農薬を使用する場合は、**7日前までに行いましょう**



水稻除草剤の移植前、播種前の使用時期が登録変更されました（平成24年8月）

水稻初期除草剤の使用時期は、これまで「植代後(時)～移植4日前まで」「代かき後(時)～播種4日前まで」の適用がありましたが、これからは、移植や播種の前に使用する場合は、移植又は播種の「**7日前まで**」の使用となります。移植または播種の前日～6日前の間は、農薬は使用できません。誤って使用した場合は農薬取締法の違反であり、罰則の対象となりますので必ず守ってください。

**農薬の使用時期を守り、農薬散布後の止水管理を徹底します**

水田での除草剤や粒剤を散布した後は、農薬が土壌などに落ち着くまでの7日間は、田面水を圃場外に出さない水管理を徹底してください。

7日間の止水管理は、農薬の効果を十分発揮させるとともに、周辺環境の保全に繋がります。



## 「野焼き」は原則として法律で禁止されています (廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

農作物の残さは、なるべく焼却せずに、堆肥にするなど、土づくりに有効活用しましょう。

ただし、農林業を営むために、やむを得ないものとして行われる焼却については、法律の例外として認められています。

節度を守り、必要最小限の範囲で行ってください。

環境指導課まで  
ご確認ください。

やむを得ない場合、焼却が認められているもの

(例) 「稲わら」「籾殻」「剪定枝」「いもの蔓」などの**農作物の残さ**

※ ほ場内で発生し、燃やすゴミとして搬出することが困難なもの。

いかなる場合でも、焼却してはいけないもの

(例) 「ビニール」や「支柱」などの**農業用資材**

## やむを得ず焼却する場合は、次のことを必ず守ってください。

- 近くの住民に迷惑がかからないよう、時間帯や風向きなどに配慮してください。
- 焼却している間は、火の側から離れないでください。
- 焼却できるものは、あくまでも法律の例外として認められたものに限り、**ビニールや生活ゴミ等は、絶対に焼却しないでください。**
- 法律の例外として認められているものであっても、万が一、近隣の住民等から苦情が発生した場合は、**すみやかに焼却を止めてください。**

火災との誤解を避けるため、焼却する前には必ず、最寄りの消防署(出張所)と環境指導課へ、電話連絡(火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為の届出)をしてください。

(例) 「**今から、○○(場所)で、△時間、□□を焼却します。**」

なお、近隣の住民等から消防署へ通報があった場合には、消防車が出動する場合があります。

農家の皆様へ

# 道路の泥汚れ防止に ご協力ください

春の農作業が始まり、道路に泥の汚れが目立つ時期になりました。

道路に落ちた大きな泥や土のかたまりは、歩行者や車両の通行に支障をきたし、地域住民の迷惑になるうえ、交通事故の原因にもなるため大変危険です。



農作業後に公道に出る際は泥を落としていただくよう、ご協力をお願いします。

# 次年度に向けた土づくりに実践

## ～米づくりの基本は土づくり～


- ① 稲わらのすき込みや堆肥施用による地力向上
- ② 深耕による根張りの改善（14ページに事例）
- ③ バランスの取れた土壌養分（チッソ、リン酸、ケイ酸）



## 稲わらは貴重な有機資源です

**収穫後の稲わらは焼却せず、田んぼへすき込み、土づくりに利用しましょう。地力の維持、向上に期待できます。**

- ◎ 稲わらすき込みは地温が高い10月中旬頃までに行い、稲わらの分解を促進しましょう（これ以降でも、可能であれば早めに行いましょう）。すき込みの深さは、浅うちとし5～10cmの深さで行いましょう。
- ◎ 排水性の悪い田んぼは明きょ等により表面排水につとめると稲わらの分解が進みます。
- ◎ 稲わらすき込みと同時に土づくり資材を施用すると稲わらの分解を促します。また、アグリ革命を施用するとさらに効果的です。  
※土づくり資材の特長や選定については48、49ページを確認ください。
- ◎ 稲わらを秋期にすき込むことにより分解・腐熟が促進し、翌年の栽培に影響が少なくなります。下図にあるように秋期にすき込むことにより春期にすき込むより、ワキ（メタンガス、硫化水素）の発生が抑えられ、根ぐされ等の生育障害を軽減することができます。



### ケイ酸肥料の効果

- ケイ酸が葉の表面に集積し、病害虫に対して抵抗力を高める。
- 稲全体が丈夫になり、葉が直立し、受光態勢が良くなる。また、倒伏に強くなる。
- 根の活力が向上し、養分・水の吸収が良くなる。

### リン酸肥料の効果

- 根の発育や発芽力を促進し、作物生長を早める。
- 分けつ数や、根、茎、葉の数を増やし、実入りをよくする。

登熟向上、米の品質・収量向上につながる

# コシヒカリ一発肥料の選定にあたって

ここ近年、温暖化の影響で出穂後の肥料不足が懸念されております。

高温による乳白対策として「新コシー発くん特号」を

初期生育の確保が難しい(茎数の少ない)ほ場には「有機入りコシー発くん」をお奨めします。

## 高温による乳白対策として



### 新コシー発くん特号

N-P-K  
20-17-10

有機入りコシー発くんと比べ、チッソ含量は同じですが、  
基肥を減らし、穂肥を増やした温暖化対策の肥料です。

**施肥量** 側条施肥: 35~40kg / 10a  
全層施肥: 45kg / 10a

## 初期生育の確保が難しいほ場



### 有機入りコシー発くん

N-P-K  
20-12-11

現在使用していただいている一発肥料。初期生育の  
確保が難しい(茎数が少ない)ほ場で使用してください。

**施肥量** 側条施肥: 35~40kg / 10a  
全層施肥: 45kg / 10a


中間追肥  
入り

中間追肥の省力が図れる、中間追肥入りの  
一発肥料について

14~15ページ

# 気象変動に左右され

〈現状〉ここ近年、7～8月の気象が平年と大幅にちがっている。



## 〈対策〉

- (1) 適切な水管理で健全な根づくりの実践 → 6月の中干し+収穫直前までの間断通水
- (2) 過剰な窒素施用を回避 → 穂肥時は葉色・草丈・茎数・幼穂長を確認
- (3) 土づくりの励行 → けい酸+稲ワラの鋤き込み
- (4) 秋季(春季)の深耕による根域の確保 → 目標15cm

「土づくり」と「深耕」が  
不足しています

(1) 深耕の効果確認：秋耕あるいは春季の荒耕で深く耕すとどうなるのか？

| 実証区   | 慣行区  |
|---|--|
| 春季に15cm以上荒耕   | 通常の荒耕(12～13cm)   |
|  |  |
| ●根量全体のボリューム・細根の量についても実証区が勝っている。深耕により根域拡大が図られた。                                      |  |



米づくりの基本である「土づくり」には、けい酸施用と深耕が重要です。単年度で結果は見えにくいですが、継続して取り組めば気象変動に左右されない米づくりが実現できます。

# ない米づくりをめざして!!

(2) けい酸効果の確認：けい酸をしっかり効かせたらどうなるのか？

| 実証区   | 慣行区  |
|---|--|
| けい酸を施用した場合<br>(けい酸アップ・コシー発くん)   | けい酸を施用していない場合  |
|  |  |

● けい酸の効果で稲体が硬くなり、葉がぴんと立ち、受光態勢が良くなった。

|   |  |
|---|--|
|  |  |
|---|--|

● サーマグラフィーで撮影すると、実証区の方の温度が1～2度低かった。実証区の稲は、高温のストレスも少なく、体力の消耗も少ないことから、登熟向上が期待できる。

※葉温の違いを赤外線写真(サーモグラフィー)で撮影

## けい酸加里入りの一発肥料を使ってみませんか

けい酸が  
米づくりを  
助けます

### けい酸パワー・コシー発くん



N-P-K  
10-15-12  
苦土2  
ケイ酸12

施肥量 70～80kg/10a

### けい酸アップ・コシー発くん



N-P-K  
15-15-10  
苦土1  
ケイ酸12

施肥量 45～55kg/10a

# 水稲肥料銘柄一覧

| 区分   | 肥料名              | 規格   | 成分 (%) |    |    |     |                         | 備考   |
|------|------------------|------|--------|----|----|-----|-------------------------|--|
|      |                  |      | N      | P  | K  | 有機  | その他                     |  |
| 育苗期  | 稲10号             | 20kg | 10     | 10 | 10 |     |                         | 苗床・床土用肥料                                   |
|      | 液肥10号            | 5kg  | 10     | 5  | 8  |     |                         | 育苗期追肥                                      |
|      |                  | 20kg |        |    |    |     |                         |  |
| 基肥   | BB 有機入820号 (みさと) | 20kg | 8      | 12 | 10 | 52  | Mg1                     | JA金沢中央、有機含量の高い基本の基肥                        |
|      | BB いしかわ有機入056号   | 20kg | 10     | 25 | 16 | 18  |                         | コシヒカリ・早生どちらでも                              |
|      | BB エコ028号        | 20kg | 10     | 12 | 8  |     | Mg2 AL13                | 低PKの基肥                                     |
|      | BB 新コシー発くん特号     | 15kg | 20     | 17 | 10 |     | (N.基肥分6.5%<br>穂肥分13.5%) | 温暖化対策の一発肥料<br>(穂肥不要)                       |
|      | BB 有機入りコシー発くん    | 15kg | 20     | 12 | 11 | 20  | (N.基肥分9%<br>穂肥分11%)     | 金沢用に設計されたコシヒカリ<br>一発肥料 (穂肥不要)              |
|      | BB けい酸パワー・コシー発くん | 15kg | 10     | 15 | 12 |     | Mg2 Si12                | 新コシー発くん特号にけい酸加里を加えた<br>もので、中間追肥の省力が図れます。   |
|      | BB けい酸アップ・コシー発くん | 15kg | 15     | 15 | 10 |     | Mg1 Si12                | 新コシー発くんにけい酸加里を加えた<br>もので、中間追肥の省力が図れます。     |
|      | BB スリム早生一発くん     | 15kg | 24     | 10 | 10 |     | (N.基肥分10%<br>穂肥分14%)    | ゆめみづほ用に設計された、一発<br>肥料 (穂肥不要)               |
| 中間追肥 | BB PKけいさん        | 20kg |        | 13 | 11 |     | Mg4 Si17 B0.05          | 登熟促進、根張り促進、倒伏防<br>止に、必ず施用しましょう。            |
|      | 粒状草木加里           | 20kg |        | 2  | 30 | 100 | Mg3                     | 登熟促進、根張り促進、倒伏防止に                           |
| 穂肥   | BB 有機入り追肥526号    | 20kg | 15     | 2  | 6  | 30  | Mg1                     | JA金沢中央、基本の穂肥                               |
| 土づくり | BB スーパーけい酸       | 20kg |        | 3  |    |     | Mg6 Si26<br>AL45        | 登熟促進、根張り促進、倒伏防<br>止に、必ず施用しましょう。            |
|      | BB パワフル大地        | 20kg |        | 12 | 5  |     | Mg9 Si20<br>AL27        | 10a当たり60kg施用で堆肥150kg相当<br>の効果が得られる省力土づくり肥料 |
|      | ケイカル (粒)         | 20kg |        |    |    |     | Mg5 Si30<br>AL45        | ケイ酸補給で稲体を強化し倒伏<br>防止、病害虫に対して強くなる           |
|      | 輸入ようりん (粒)       | 20kg |        | 20 |    |     | Mg12 Si20 AL45          | 健全な稲を育て多収の効果があ<br>る。まき易い粒状タイプ              |

※一発肥料は基本的に穂肥がいらないように設計されておりますが、高温年の場合は多少穂肥が必要になる場合があります。

※表示成分 N=窒素 P=りん酸 K=カリ Mg=苦土 Si=ケイ酸 B=ホウ素 AL=アルカリ 有機=有機含量

# 水田畦畔等の除草剤の使用

| 区分   | 薬剤名<br>(成分)                      | 使用時期                             | 10a当たり使用量  |             |                           | 使用回数 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|---------------------------|------|
|  |                                  |                                  | 薬量         |             | 希釈水量                      |      |
|  |                                  |                                  | 一年生雑草      | 多年生雑草       |                           |      |
| 水田<br>畦畔   | ラウンドアップマックスロード<br>(グリホサート)       | 雑草生育期(収穫前日まで)                    | 200～500ml  | 500～1000ml  | 通常散布50～100L<br>少量散布25～50L | 3回以内 |
|  | グリホエキス液剤<br>(グリホサート)             | 雑草生育期:草丈30cm以下<br>(収穫14日前まで)     | 250～500ml  | 500～1000ml  | 50～100L                   | 2回以内 |
|  | バスタ液剤<br>(グルホシネート)               | 雑草生育期:草丈30cm以下<br>(収穫7日前まで)      | 500～1000ml | 500～1000ml  | 100～150L                  | 2回以内 |
|  | カーメックスD水和剤<br>(DCMU)             | 雑草発生前～雑草発生初期                     | 150～300g   | —           | 70～100L                   | 1回   |
|  | ダイロンゾル<br>(DCMU)                 | 雑草発生前～雑草発生初期<br>:草丈15cm以下        | 200～250ml  | —           | 100L                      |      |
|  | 2,4-Dアミン塩<br>(2.4PA)             | 雑草生育期:草丈30cm以下<br>(収穫30日前まで)     | 100g       | 100g        | 100L                      | 3回以内 |
|  | カソロン粒剤6.7<br>(DBN)               | 秋冬期～春期の雑草<br>(11月中下旬～降雪前)        | 4～6kg      | 4～6kg       | —                         | 1回   |
| 休耕田  | ラウンドアップマックスロード<br>(グリホサート)       | 雑草生育期                            | 200～500ml  | 500～1000ml  | 通常散布50～100L<br>少量散布25～50L | 3回以内 |
|  | バスタ液剤<br>(グルホシネート)               | 雑草生育期:草丈50cm以下                   | 500～1000ml | 500～1000ml  | 100～150L                  | 3回以内 |
| 農道、<br>公園、<br>庭園、<br>堤とう、<br>駐車場、<br>道路、<br>運動場、<br>宅地、<br>のり面、<br>鉄道等 | ラウンドアップマックスロード<br>(グリホサート)       | 雑草生育期                            | 200～500ml  | 500～1000ml  | 通常散布50～100L<br>少量散布25～50L | 3回以内 |
|  | グリホエキス液剤<br>(グリホサート)             | 雑草生育期:草丈30cm以下                   | 500ml      | 1000ml      | 100L                      |      |
|  | バスタ液剤<br>(グルホシネート)               | 雑草生育期                            | 500～1000ml | 1000～2000ml | 100～200L                  | 3回以内 |
|  | サンダーボルト007<br>(グリホサート、ピラフルフェニチル) | 雑草生育期:草丈50cm以下                   | 500～1000ml | 500～1000ml  | 100L                      | 3回以内 |
|  | カソロン粒剤6.7<br>(DBN)               | 雑草発生前～雑草発生初期                     | 6～9kg      | 10～15kg     | —                         | 3回   |
|  | カーメックスD水和剤<br>(DCMU)             | 雑草発生前～雑草発生初期<br>(多年生は、生育初期～生育中期) | 300～600g   | 1000～2000g  | 100～200L                  | 3回以内 |
|  | 2,4-Dアミン塩<br>(2.4PA)             | 雑草生育期:草丈20cm以下                   | 100～200g   | 200～300g    | 70～100L                   | 3回以内 |

◎ラウンドアップマックスロード、グリホエキス液剤、サンダーボルト007は同じ成分(グリホサート)を含んでいます。

例：水田畦畔で使用する場合

①ラウンドアップマックスロード3回 → ○

②グリホエキス3回 → ×(グリホエキスは使用回数2回までのため)

③グリホエキス2回 + ラウンドアップマックスロード1回 → ○

④グリホエキス2回 + ラウンドアップマックスロード2回 → ×

(上記2剤の場合、グリホサートを含む除草剤の総使用回数は3回までのため、4回目は使用できない。)

◎カーメックスD水和剤、ダイロンゾルは同じ成分を含んでいます。水田畦畔で使用する場合はどちらか1回までしか使用できません。

◎使用回数は前作の水稲収穫後からカウントされます。(水稲→水稲の場合)

# 水稲防除剤の登録内容

平成30年10月登録現在

| 薬剤名                        | 適用病害虫   | 使用量                         | 使用時期                  | 使用方法                             | 使用上のポイント   |
|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| テクリードC<br>フロアブル            | もみ枯細菌病、苗立枯細菌病、褐条病、<br>ばか苗病、いもち病、ごま葉枯病、苗立<br>枯病(リゾープス菌・トリコデルマ菌)                    | 200倍                        | 浸種前                   | 24時間種子浸漬                         |  |
| ダコレート<br>水和剤               | 苗立枯病(リゾープス菌、トリ<br>コデルマ菌、フザリウム菌)   | 400～<br>600倍                | 播種時～緑化期<br>但し播種14日後まで | 育苗箱の上か<br>ら均一に散布<br>する。          | いもち病(苗い<br>もち)は播種時<br>400倍/1回                            |
| タチガレエースM<br>粉剤             | 苗立枯病(ピシウム菌、フザリウ<br>ム菌)、ムレ苗防止、根の生育促進   | 6～8g<br>/1箱                 | 播種前                   | 育苗土壌に均<br>一に混和する。                | 土壌混和は<br>1回のみ  |
| タチガレエースM<br>液剤             | 苗立枯病(ピシウム菌、フザリウム<br>菌)、ムレ苗防止、根の生育促進、<br>移植時の発根及び活着促進                              | 500～1000倍<br>(500ml/<br>1箱) | 播種時又は発芽後              | 本剤の所定<br>量を土壌灌<br>注する。           | 育苗箱への灌<br>注は1回のみ   |
| エバーゴルフフォルテ<br>箱粒剤          | いもち病、紋枯病、イネミズゾ<br>ウムシ、イネドロオイムシ、白葉<br>枯病、ウンカ類、ツマグロヨコ<br>バイ                         | 50g<br>/1箱                  | 播種時(覆土前)～移<br>植当日     | 育苗箱の苗の<br>上から均一に<br>散布する。        | 散布量は育苗箱<br>1箱当たり50gを<br>守ってください。<br>50g以下では、<br>効果が劣ります。 |
| ドクター<br>Dr.オリゼ<br>スタークル箱粒剤 | いもち病、ウンカ類、イネミズ<br>ゾウムシ、イネドロオイムシ、ツ<br>マグロヨコバイ、ニカメイチュ<br>ウ、イネクロカメムシ、もみ枯<br>細菌病、白葉枯病 | 50g<br>/1箱                  | 緑化期～移植当日              | 育苗箱の上か<br>ら均一に散布<br>する。          | 散布量は育苗箱<br>1箱当たり50gを<br>守ってください。<br>50g以下では、<br>効果が劣ります。 |
|                            | フタオビコヤガ   |                             | 移植3日前～移植当<br>日        |                                  |  |
| オリゼメート<br>1キロ粒剤            | いもち病、もみ枯細菌病、<br>白葉枯病  | 1～1.3kg<br>/10a             | 収穫14日前まで              | 散布                               | 箱施薬した方<br>は不要  |
| オリゼメート<br>パック              | いもち病、もみ枯細菌病   | (パック)<br>20～26<br>個/10a     | 収穫14日前まで              | 水田に小包装<br>(パック)のまま投げ<br>入れる。湛水散布 | 箱施薬した方<br>は不要  |
| ビームトレ<br>モンセレン粉剤DL         | いもち病、紋枯病、ごま葉枯れ<br>病、ウンカ類、カメムシ類、コ<br>ブノメイガ、ツマグロヨコバ<br>イ、イネツトムシ                     | 4kg/<br>10a                 | 収穫21日前まで              | 散布                               | 散布適期は、<br>出穂7～3日前  |
| ラブサイド<br>スタークル粉剤DL         | いもち病、ツマグロヨコバイ、ウンカ類、<br>カメムシ類、イナゴ類、ニカメイチュウ   | 4kg/<br>10a                 | 収穫7日前まで               | 散布                               | 散布適期は、<br>出穂7～10日後                                       |
| スタークル粉剤DL                  | カメムシ類、イナゴ類、ウン<br>カ類、ツマグロヨコバイ、イネ<br>ドロオイムシ、ニカメイチュ<br>ウ、フタオビコヤガ                     | 3kg/<br>10a                 | 収穫7日前まで               | 散布                               | 散布適期は、<br>出穂2週間後頃  |
| サジェスト微粒剤F                  | いもち病、紋枯病、ウンカ類、<br>ツマグロヨコバイ、カメムシ類  | 3～4kg<br>/10a               | 収穫21日前まで              | 散布                               | 散布適期は、<br>出穂前7～3日  |
| ビームスタークル<br>微粒剤F           | いもち病、ウンカ類、ツマグロ<br>ヨコバイ、カメムシ類  | 3～4kg<br>/10a               | 収穫7日前まで               | 散布                               | 散布適期は、<br>出穂後7～10日                                       |
| キラップ微粒剤F                   | ウンカ類、カメムシ類、イネ<br>ドロオイムシ、イナゴ類  | 3～4kg<br>/10a               | 収穫14日前まで              | 散布                               | 散布適期は、<br>出穂後14～17日                                      |

| 薬剤名                      | 適用病害虫  | 使用量               | 使用時期     | 使用方法 | 使用上のポイント                    |
|--------------------------|--|-------------------|----------|------|-----------------------------|
| モンガリット粒剤                 | 稲こうじ病、紋枯病、疑似紋枯症（褐色紋枯病菌、赤色菌核病菌、灰色菌核病菌、褐色菌核病菌）、墨黒穂病      | 3～4kg<br>／10a     | 収穫45日前まで | 湛水散布 | 散布適期は、<br>出穂21～14日前         |
|                          | 穂枯れ（ごま葉枯病菌、すじ葉枯病菌）                                     | 4kg<br>／10a       |          |      |                             |
| イモチエース<br>キラップ粒剤         | いもち病、穂枯れ（ごま葉枯病菌）、紋枯病、ウンカ類、カメムシ類、変色米（アルタナリア菌、カーブラリア菌）   | 3kg<br>／10a       | 収穫35日前まで | 湛水散布 | 散布適期は、<br>出穂14～10日前         |
| スタークル粒剤                  | カメムシ類、ウンカ類、ニカメイチュウ、ツマグロヨコバイ、イネドロオイムシ                   | 3kg<br>／10a       | 収穫7日前まで  | 散布   | 散布適期は、<br>出穂7～10日後頃         |
| スタークル豆つぶ                 | カメムシ類  | 250g/10a          | 収穫7日前まで  | 散布   | 散布適期は、<br>出穂7～10日後頃         |
|                          | ウンカ類、ツマグロヨコバイ  | 250g～500g<br>／10a |          |      |                             |
| トレボン粒剤                   | イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、イネゾウムシ、イネヒメハモグリバエ、イナゴ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ | 2～3kg<br>／10a     | 収穫21日前まで | 散布   | 初期害虫防除。<br>箱施薬した方は<br>不要。   |
|                          | ニカメイチュウ（第一世代）  | 3kg/10a           |          |      |                             |
| リンバー粒剤                   | 紋枯病、疑似紋枯症（褐色菌核病菌、赤色菌核病菌）                               | 3～4kg<br>／10a     | 収穫30日前まで | 散布   | 散布適期は、<br>出穂14～10日前         |
| ブラシン粉剤DL                 | いもち病・ごま葉枯病、穂枯れ、変色米                                     | 3～4kg<br>／10a     | 収穫7日前まで  | 散布   | 発病初期を逃<br>さず散布する            |
|                          | もみ枯細菌病、稲こうじ病、内穎褐変病                                     | 4kg<br>／10a       |          |      |                             |
| Zボルドー<br>粉剤DL            | 稲こうじ病  | 3～4kg<br>／10a     | 出穂10日前まで | 散布   | 前年発生圃場<br>は必ず散布             |
| ミスター<br>MR.ジョーカー<br>粉剤DL | イネアザミウマ、イネツトムシ   | 4kg<br>／10a       | 収穫7日前まで  | 散布   | コブノメイガ、イ<br>ナゴの多発時<br>に散布する |
|                          | イナゴ類、ウンカ類、カメムシ類、コブノメイガ、ツマグロヨコバイ                        | 3～4kg<br>／10a     |          |      |                             |
|                          | イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ（成虫）、フタオビコヤガ                          | 3kg<br>／10a       |          |      |                             |

## 倒伏軽減剤の使用法

使用目的・・・節間短縮による倒伏の軽減（倒伏が予想される場合のみ散布、使用時期厳守）

| 薬剤名       | 使用時期      | 10a当たり使用量 |              | 使用方法 |
|-----------|-----------|-----------|--------------|------|
| ロミカ粒剤     | 出穂25～10日前 | 2～3kg     |              | 湛水散布 |
| スマレクト粒剤   | 出穂20～7日前  | 2～3kg     |              | 湛水散布 |
| ビビフル粉剤DL  | 出穂10～5日前  | 3～4kg     |              | 散布   |
| ビビフルフロアブル | 出穂10～2日前  | 75～       | 通常散布量50～150ℓ | 茎葉散布 |
|           |           | 100ml     | 少量散布量25～50ℓ  |      |

# 本田除草剤の登録内容

平成30年10月登録現在

## <初期除草剤>

| 除草剤名           | 成分                             | 使用量/10a | 使用時期   | 使用方法   | 適用雑草  |
|----------------|--------------------------------|---------|--|--------|---|
| ソルネット<br>1キロ粒剤 | プレチラクロール                       | 1kg     | 植代後～移植前7日まで<br>移植直後～ノビエ1葉期まで<br>(田植同時登録あり)<br>(移植後30日まで) | 湛水散布   | 水田1年生雑草、マツバイ、<br>ホタルイ、ヘラオモダカ、ミ<br>ズカヤツリ               |
| 農将軍<br>フロアブル   | ジメタメトリン<br>ピリブチカルブ<br>プレチラクロール | 300ml   | 植代後～移植前7日まで<br>移植直後～ノビエ1葉期まで<br>(田植同時登録あり)<br>(移植後30日まで) | 原液湛水散布 | 水田1年生雑草、マツバイ、<br>ホタルイ、ヘラオモダカ、ア<br>オミドロ・藻類による表層は<br>く離 |

## <一発除草剤>

| 除草剤名                               | 成分   | 使用量/10a     | 使用時期  | 使用方法                                   | 適用雑草   |
|------------------------------------|--|-------------|---|--|--|
| バッチリ<br>1キロ粒剤<br><b>抵抗性雑草対策</b>    | イマズスルフロン<br>ピラクロニル<br>プロモブチド                   | 1kg         | 移植直後～ノビエ2.5葉期まで<br>(田植同時登録あり)<br>(移植後30日まで)<br><直播登録あり> | 湛水散布                                   | 水田1年生雑草、ウリカワ、<br>オモダカ、クログワイ、セリ、<br>ヒルムシロ、ホタルイ、マツ<br>バイ、ミズガヤツリ、アオミ<br>ドロ・藻類による表層はく離                   |
| キクトモ<br>1キロ粒剤<br><b>抵抗性雑草対策</b>    | カフェンストール<br>ダイムロン<br>ジメタメトリン<br>ベンゾビシクロン       | 1kg         | 移植直後～ノビエ2.5葉期まで<br>(田植同時登録あり)<br>(移植後30日まで)             | 湛水散布                                   | 水田1年生雑草、マツバイ、<br>ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤ<br>ツリ、ヒルムシロ、アオミド<br>ロ・藻類による表層はく離                                     |
| ベンケイ<br>1キロ粒剤<br><b>抵抗性雑草対策</b>    | ピリミスルファン<br>フェノキサスルホン<br>ベンゾビシクロン              | 1kg         | 移植直後～ノビエ3葉期まで<br>(田植同時登録あり)<br>(移植後30日まで)<br><直播登録あり>   | 湛水散布                                   | 水田1年生雑草、マツバイ、<br>ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤ<br>ツリ、ヘラオモダカ、ヒルム<br>シロ、セリ、オモダカ、クログ<br>ワイ、コウキヤガラ、シズイ                  |
| アップアレZ<br>ジャンボ<br><b>抵抗性対策</b>     | ピラクロニル<br>プロピリスルフロン<br>プロモブチド                  | 40g×<br>10個 | 移植後3日～ノビエ3葉期まで<br>(移植後30日まで)<br><直播登録あり>                | 水田に小包装<br>(パック)のまま<br>投げ入れる。<br>(湛水散布) | 水田1年生雑草、マツバイ、ホタル<br>イ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリ<br>カワ、オモダカ、クログワイ、コウキ<br>ヤガラ、ヒルムシロ、セリ、シズイ、ア<br>オミドロ・藻類による表層はく離 |
| ガンガン<br>ジャンボ<br><b>抵抗性雑草対策</b>     | ピリミスルファン<br>フェノキサスルホン                          | 25g×<br>10個 | 移植後3日～ノビエ2.5葉期<br>(移植後30日まで)<br><直播登録あり>                | 水田に小包装<br>(パック)のまま<br>投げ入れる。<br>(湛水散布) | 水田1年生雑草、ウリカワ、オモ<br>ダカ、クログワイ、コウキヤガラ、セ<br>リ、ヒルムシロ、ヘラオモダカ、ホ<br>タルイ、マツバイ、ミズガヤツリ、ア<br>オミドロ・藻類による表層はく離     |
| 銀河<br>ジャンボ<br><b>抵抗性雑草対策</b>       | ピラクロニル<br>メタズスルフロン<br>ダイムロン                    | 40g×<br>10個 | 移植後5日～ノビエ3葉期<br>(収穫60日前まで)                              | 水田に小包装<br>(パック)のまま<br>投げ入れる。<br>(湛水散布) | 水田1年生雑草、ウリカワ、オモダ<br>カ、クログワイ、コウキヤガラ、シズ<br>イ、セリ、ヒルムシロ、ヘラオモダカ、<br>ホタルイ、マツバイ、ミズガヤツリ、<br>アオミドロ・藻類による表層はく離 |
| シリウスエグザ<br>フロアブル<br><b>抵抗性雑草対策</b> | オキサジクロメホン<br>ピラクロニル<br>ピラリスルフロンエチル<br>ベンゾビシクロン | 500ml       | 移植直後～ノビエ2.5葉期<br>(田植同時登録あり)<br>(移植後30日まで)               | 原液湛水散布                                 | 水田1年生雑草、ウリカワ、<br>セリ、ヒルムシロ、ヘラオモダ<br>カ、ホタルイ、マツバイ、ミズ<br>ガヤツリ  |

## <中期除草剤>


| 除草剤名              | 成分                                    | 使用量/10a | 使用時期  | 使用方法 | 適用雑草   |
|-------------------|---------------------------------------|---------|---|------|--|
| マメットSM<br>1キロ粒剤   | シメトリン<br>モリネート<br>MCPB                | 1kg     | 移植後15日～<br>ノビエ3.5葉期まで<br>(収穫60日前まで)<br><直播登録あり> | 湛水散布 | 水田1年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、アオミドロ・藻類による表層はく離 |
| ザーベックスDX<br>1キロ粒剤 | シハロホップブチル<br>シメトリン<br>ベンフレセート<br>MCPB | 1kg     | 移植後20～30日<br>(ノビエ3.5葉期まで)<br><直播登録あり>           | 湛水散布 | 水田1年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズカヤツリ、オモダカ                         |

## <後期除草剤>

| 除草剤名              | 成分                                       | 使用量/10a                 | 使用時期  | 使用方法                   | 適用雑草  |
|-------------------|--|-------------------------|---|------------------------|---|
| ヒエクリーン<br>1キロ粒剤   | ピリミノバックメチル                               | 1kg                     | 移植後15日～ノビエ4葉期まで<br>(収穫45日前まで)<br><直播登録あり>                           | 湛水散布                   | ノビエ   |
| クリンチャー<br>1キロ粒剤   | シハロホップブチル                                | 1.5kg                   | 移植後25日～ノビエ5葉期まで<br>(収穫30日前まで)<br><直播登録あり>                           | 湛水散布                   | ノビエ、キシユウスズメノヒエ、アゼガヤ   |
| クリンチャーEW          | シハロホップブチル                                | 100ml<br>希釈量<br>100ℓ    | 移植後20日～ノビエ6葉期まで<br>(収穫30日前まで)<br><直播登録あり>                           | 湛水散布又は<br>落水散布         | ノビエ、キシユウスズメノヒエ、アゼガヤ   |
| バサグラン粒剤           | ベンタゾン                                    | 3～4kg                   | 移植後15～55日<br>(収穫60日前まで)<br><直播登録あり>                                 | 落水散布又は<br>ごく浅く湛水<br>散布 | 水田1年生雑草(イネ科を除く)、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、シズイ、エゾノサヤヌカゲサ |
| アトトリ<br>豆つぶ250    | ピリミスルファン                                 | 250g                    | 移植後20日～<br>ノビエ4葉期まで<br>(収穫45日前まで)                                   | 湛水散布                   | ノビエ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、シズイ、コウキヤガラ                        |
| レブラス<br>1キロ粒剤     | ジメタメトリン<br>ダイムロン<br>テフリルトリオン<br>メタゾスルフロン | 1kg                     | 移植後14日～<br>ノビエ4葉期まで<br>(収穫60日前まで)                                   | 湛水散布                   | 水田1年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ   |
| ワイドパワー粒剤          | ペノキススラム<br>ベンタゾン                         | 3kg                     | 移植後20日～<br>ノビエ5葉期まで<br>(収穫60日前まで)<br><直播登録あり>                       | 落水散布                   | 水田1年生雑草、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、ホタルイ、マツバイ、ミズガヤツリ                        |
| アトカラSジャンボ<br>MX   | アジムスルフロン<br>ペノキススラム<br>メソトリオン            | 25g<br>×20個             | 移植後14日～<br>ノビエ3.5葉期まで<br>(収穫45日前まで)<br><直播登録あり>                     | 湛水散布                   | 水田1年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ       |
| ワイドアタックD<br>1キロ粒剤 | ダイムロン<br>ペノキススラム                         | 1kg                     | 移植後15日～<br>ノビエ5葉期まで<br>(収穫60日前まで)<br><直播登録あり>                       | 湛水散布                   | 水田1年生雑草、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、セリ、ヒルムシロ、ホタルイ、マツバイ、ミズガヤツリ、コウキヤガラ、ヘラオモダカ       |
| クリンチャーバス<br>ME液剤  | シハロホップブチル<br>ベンタゾン                       | 1000ml<br>希釈量<br>100ℓ   | 移植後15日～<br>ノビエ5葉期まで<br>(収穫50日前まで)<br><直播登録あり>                       | 落水散布又は<br>ごく浅く湛水<br>散布 | 水田1年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ                       |
| ノミニー液剤            | ビスピリバック<br>ナトリウム塩                        | 50～100ml<br>希釈量<br>100ℓ | 移植後30日～<br>クサネムの草丈40cmまで<br>イボクサの茎長30cmまで<br>(収穫60日前まで)<br><直播登録あり> | 落水散布又は<br>ごく浅く湛水<br>散布 | クサネム、イボクサ   |
| モゲトン粒剤            | ACN                                      | 2～3kg                   | 発生始～発生盛期<br>(収穫45日前まで)<br><直播登録あり>                                  | 湛水散布                   | 藻類による表層はく離、<br>ウキクサ類、藻類   |

# ゆめみづほ栽培ごよみ

|      |      |                               |
|------|------|-------------------------------|
| 目標収量 | 収 量  | 600kg/10a                     |
|      | 株 数  | 60株/坪 (18.2株/m <sup>2</sup> ) |
|      | 穂 数  | 25本/株                         |
|      | 1穂籾数 | 67粒/穂                         |
|      | 登熟歩合 | 85%                           |
|      | 千粒重  | 23g                           |



| 月<br>旬      | 4                                     |                          |          | 5   |     |                                      | 6   |       |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|---|-----|--------------------------------------|---|-------|
|             | 上                                     | 中                        | 下        | 上   | 中   | 下                                    | 上   | 中     |
| 生 育<br>ステージ | 育苗期                                   |                          |          | 移植期   | 活着期 | 分けつ期                                 | 有効分けつ<br>決定期                                |       |
| 栽培のポイント     | 薄播きによる健苗育成<br><br>(乾籾130g/箱<br>適正播種量) |                          |          | 温度および水管理<br>苗の成長段階に応じた<br>60株/坪植えとする<br>太植えをさける |     | 根の活性化<br>田干しによる<br>分けつの促進<br>浅水管理による | 中干し開始<br>早めに<br><br>(確保された時<br>莖数が15~16本/株) |       |
| 水管理         |                                       |                          |          | 保温のため<br>やや深水                                   |     | 日中浅水<br>夜間深水                         | 間断通水  | 中干し   |
| 施肥基準        | 〔一般体系〕                                |                          | (kg/10a) |   |     |                                      |   |       |
|             | 肥料名                                   | 品種                       | ゆめみづほ    |   |     |                                      |   |       |
|             | 土づくり資材                                | BB パワフル大地 または BB スーパーけい酸 |          |   |     |                                      |   | 60    |
|             | 基 肥                                   | BB 有機入り820 (みさと)         |          |   |     |                                      |   | 45~50 |
|             |                                       | BB いしかわ有機入り056           |          |   |     |                                      |   | 35~40 |
| 中間追肥        | 草 木 加 里                               |                          |          |   |     |                                      | 10  |       |
|             | BB P K けいさん                           |                          |          |   |     |                                      | 20  |       |
| 穂 肥         | BB 有機入り追肥526号                         |                          |          |   |     |                                      | 1回目   | 2回目   |
|             |                                       |                          |          |   |     |                                      | 20  | 25    |

※ほ場により施用量を加減して下さい。

栽培上の注意点


- ・ 苗丈は短いが高温管理等で無理に伸ばさない。
- ・ 他品種に比べ早めに中干しを開始する。
- ・ 紋枯病に弱いため、出穂14~10日前の粒剤防除を徹底する。

33本

無効分げつ

25本

25本



カメムシ侵入盛期

|        |                                 |                 |                        |           |             |   |            |              |
|--------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------|-------------|---|------------|--------------|
| 8      | 9                               | 10              | 11                     | 12        | 13          |   |            |              |
|        | 4.0                             | 4.5~5.0         |                        |           | 3.5~4.0     |   |            |              |
|        | 7                               |                 |                        | 8         |             |   | 9          |              |
|        | 下                               | 上               | 中                      | 下         | 上           | 中 | 下          | 上            |
| 最高分げつ期 |                                 | 幼穂形成期           | 穂ばらみ期                  | 出穂期       | 登熟期         |   | 成熟期        |              |
|        | 第一回目穂肥<br>(幼穂長約1~2ミリ)<br>(-23日) | 紋枯病防除<br>(-10日) | 第二回目穂肥<br>(幼穂長約5~8センチ) | 出穂期 7/17頃 | カメムシ(斑点米)防除 |   | 落水(刈取り5日前) | 適期刈取り<br>成熟期 |

飽水管理

〔基肥一発体系〕


(kg/10a)

| 肥料名    | 品種                       | ゆめみづほ |
|--------|--------------------------|-------|
| 土づくり資材 | BB パワフル大地 または BB スーパーけい酸 | 60    |
| 基肥     | BB スリム早生一発くん             | 40~50 |
| 中間追肥   | 草木加里                     | 10    |
|        | BBPKけいさん                 | 20~40 |

注) 穂肥の必要はありません。  
 側条施肥が前提ですが、全層施肥でも施用できます。  
 初年目は上記を上限とし、2年日以降生育や収量から判断し、ほ場にあった施肥量を決定して下さい。  
**PKけいさん又は草木加里を必ず施用下さい。**


# コシヒカリ栽培ごよみ

|      |      |                               |
|------|------|-------------------------------|
| 目標収量 | 収 量  | 530kg/10a                     |
|      | 株 数  | 60株/坪 (18.2株/m <sup>2</sup> ) |
|      | 穂 数  | 21本/株                         |
|      | 1穂粒数 | 73粒/穂                         |
|      | 登熟歩合 | 85%                           |
|      | 千粒重  | 22.5g                         |



|                  |   |                          |          |                       |                   |                 |   |     |
|------------------|---|--------------------------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|---|-----|
| 出穂前後日数           |   |                          |          |                       |                   |                 |   |     |
| 月<br>旬           | 4   |                          |          | 5                     |                   |                 | 6                                       |     |
|                  | 上   | 中                        | 下        | 上                     | 中                 | 下               | 上                                       | 中   |
| 生育<br>ステージ       | 育苗期   |                          |          | 移植期                   | 活着期               | 分けつ期            | 有効分けつ<br>決定期                            |     |
| 栽培のポイント          | 薄播きによる健苗育成<br><br>温度および水管理<br>苗の成長段階に応じた<br>乾籾130g/箱<br>(適正播種量) |                          |          | 60株/坪植えとする<br>太植えをさける | 浅水管理による<br>分けつの促進 | 田干しによる<br>根の活性化 | 確保された時<br>(茎数が14~15本/株)<br>中干し開始<br>早めに |     |
| 水<br>管<br>理      |   |                          |          | 保温のため<br>やや深水         |                   | 日中浅水<br>夜間深水    | 中干し<br><br>間断通水                         |     |
| 施<br>肥<br>基<br>準 | 〔一般体系〕  |                          | (kg/10a) |                       |                   |                 |   |     |
|                  | 肥料名   | 品種                       | コシヒカリ    |                       |                   |                 |   |     |
|                  | 土づくり資材  | BB パワフル大地 または BB スーパーけい酸 |          |                       |                   |                 |   | 60  |
|                  | 基 肥   | BB 有機入り820 (みさと)         |          |                       |                   |                 |   | 40  |
|                  |   | BB いしかわ有機入り056           |          |                       |                   |                 |   | 30  |
|                  | 中間追肥  | 草 木 加 里                  |          |                       |                   |                 |   | 10  |
| BB P K けいさん      |   |                          |          |                       |                   | 20              |   |     |
| 穂 肥              | BB 有機入り追肥526号   |                          |          |                       |                   |                 | 1回目                                     | 2回目 |
|                  |   |                          |          |                       |                   |                 | 13                                      | 17  |

※ほ場により施用量を加減して下さい。



|               |                                   |      |                |                                   |             |          |     |            |              |      |      |
|---------------|-----------------------------------|------|----------------|-----------------------------------|-------------|----------|-----|------------|--------------|------|------|
|               | -23日                              | -18日 | -15日           | -11日                              | -6日         | 0日       | +8日 | +12日       | +18日         | +24日 | +42日 |
|               | <b>7</b>                          |      |                |                                   |             | <b>8</b> |     |            | <b>9</b>     |      |      |
|               | 下                                 | 上    | 中              | 下                                 |             | 上        | 中   | 下          | 上            | 中    |      |
| <b>最高分げつ期</b> | <b>幼穂形成期</b>                      |      | <b>穂ばらみ期</b>   | <b>出穂期</b>                        | <b>登熟期</b>  |          |     | <b>成熟期</b> |              |      |      |
|               | 第一回目穂肥<br>(幼穂長約15~20ミリ)<br>(-16日) |      | 紋枯病防除<br>(-8日) | 第二回目穂肥<br>(幼穂長約8センチ)<br>出穂期 7/30頃 | カメムシ(斑点米)防除 |          |     | 落水(刈取り5日前) | 適期刈取り<br>成熟期 |      |      |

飽水管理




|          |                                      |          |
|----------|--------------------------------------|----------|
| 〔基肥一発体系〕 |                                      | (kg/10a) |
| 肥料名      | 品種                                   | コシヒカリ    |
| 土づくり資材   | BB パワフル大地 または BB スーパーけい酸             | 60       |
| 基肥       | BB 新コシー発くん特号<br>または<br>BB 有機入りコシー発くん | 35~40    |
| 中間追肥     | 草木加里                                 | 10       |
|          | BB P K けいさん                          | 20~40    |

注) 穂肥の必要はありません。側条施肥が前提ですが、全層施肥でも施用できます。  
初年目は上記を上限とし、2年目以降生育や収量から判断し、ほ場にあった施肥量を決定して下さい。  
**PKけいさん又は草木加里を必ず施用下さい。**

# 雑草防除基準

## 除草体系


### ●基本処理



### ●省力タイプ



### ●雑草が多い場合



初期剤と一発剤・中期剤を組み合わせることで雑草を長期間抑制することができます。

### ※ヒエが残った場合

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| ヒエクリーン1キロ粒剤 | 田植後15日～ノビエ4葉期まで (収穫45日前まで) |
| クリンチャー1キロ粒剤 | 田植後25日～ノビエ5葉期まで (収穫30日前まで) |
| クリンチャーEW    | 田植後20日～ノビエ6葉期まで (収穫30日前まで) |

### ※広葉 (多年生雑草) が残った場合

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| バサグラン粒剤 | 田植後15日～55日 (収穫60日前まで) |
| バサグラン液剤 | 田植後15日～55日 (収穫50日前まで) |

### ※ヒエと広葉 (多年生雑草) が残った場合

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| レブラス1キロ粒剤     | 田植後14日～ノビエ4葉期まで (収穫60日前まで) |
| ワイドパワー粒剤      | 田植後20日～ノビエ5葉期まで (収穫60日前まで) |
| ワイドアタックD1キロ粒剤 | 田植後15日～ノビエ5葉期まで (収穫60日前まで) |
| クリンチャーバスME液剤  | 田植後15日～ノビエ5葉期まで (収穫50日前まで) |

# 病害虫基幹防除基準

## 種子消毒

テクリードCフロアブル

いもち病・白葉枯病・**紋枯病**  
イネミズゾウムシ・  
イネドロオイムシ・その他害虫

・エバーゴルフフォルテ箱粒剤  
田植3日前～田植当日箱施用

※散布注意事項は  
33ページを  
参照して下さい。

### 〔粉剤体系〕

(1回目) 紋枯病・穂いもち・  
カメムシ類他

・ビームトレモンセレン粉剤DL  
出穂前7～3日  
(収穫21日前まで)

(2回目) 穂いもち・カメムシ類・  
ウンカ類・ツマグロヨコバイ他

・ラブサイドスタークル粉剤DL  
出穂後7～10日  
(収穫7日前まで)

(随時) カメムシ類・ウンカ類他

・スタークル粉剤DL  
または  
・スタークル豆つぶ  
出穂後14～17日  
(収穫7日前まで)

### 〔微粒剤体系〕

(1回目) 紋枯病・穂いもち・  
カメムシ類他

・サジェスト微粒剤F  
出穂前7～3日  
(収穫21日前まで)

(2回目) 穂いもち・カメムシ類・  
ウンカ類・ツマグロヨコバイ他

・ビームスタークル微粒剤F  
出穂後7～10日  
(収穫7日前まで)

(随時) カメムシ類・ウンカ類・  
イナゴ類他

・クラブ微粒剤F  
出穂後14～17日  
(収穫14日前まで)

※微粒剤専用ホースあるいは粒剤専用ホースが必要です。

### 〔粒剤体系〕

(1回) いもち病・紋枯病・  
ウンカ類・カメムシ類他

・イモチエースクラブ粒剤  
出穂前14～10日  
(収穫35日前まで)

(2回目) カメムシ類・ウンカ類・  
ツマグロヨコバイ他

・スタークル粒剤  
または  
・スタークル豆つぶ  
出穂後7～10日  
(収穫7日前まで)

# 3月

## 5月植えを目標に種まきを行いましょう!!

### うす播き、計画的なは種による、過剰生育防止、乳白粒発生防止

(作業手順  
のめやす)

比重選

- 水10ℓに硫安…うるちの場合2.5kg  
もちの場合 1.4kg

水洗

- 発芽障害をおこさぬよう、よく水洗いをし、芽出し袋に詰める。芽出し袋(網袋)に5~6割程度入れる。

種子消毒

- テクリードCフロアブル200倍

浸種

- 水温が違えば浸種期間も違います。

|      |      |     |
|------|------|-----|
| 水温   | 10℃  | 15℃ |
| 浸種期間 | 10日間 | 7日間 |

- 吸水不足は出芽ムラになるので特に水温に注意する。
- 2日に1回は水の入れ替えを行う。
- 水温が低く推移する場合は、浸種期間を長くして下さい。
- コシヒカリは、他品種より長く浸種を行う。

催芽

| 催芽適温 | 催芽の程度       | 日数                |
|------|-------------|-------------------|
| 32℃  | 1.0mm(ハトムネ) | 1.5~2.0日(36~48時間) |

- 期間が長すぎると芽傷みが出やすい。短いと出芽ムラになる。

育苗箱の消毒

- イチバン500倍液

床土の準備

- 床土は1箱当たり4~5kg
- 床土はpH4.5~5.5  
(加工床土の場合 pH調整と肥料混合がされています。)

肥料農薬混

- 肥料—稲10号 1箱当たり18g
- 農薬—タチガレースM粉剤 1箱当たり6g

床土入れ

- 床土は平らにならす。

灌水


- 灌水は1箱当たり800~1000mlとし、やり過ぎないようにする。
- カビの発生防止に灌水を兼ねて(ダコレート水和剤)を散布する場合は、500倍液を1箱当たり500ml灌水する。

4月9日

は種

覆土

| 種類  | 1箱当たりは種量 |        |
|-----|----------|--------|
|     | 乾 粃      | 芽出し粃   |
| 稚 苗 | 130g     | 170g程度 |



4月10日

出芽

4月11日

- 出芽器内で芽を伸ばし過ぎないように注意する。

| 出芽適温   | 日数     | 芽の長さ  |
|--------|--------|-------|
| 30~32℃ | 2~2.5日 | 7mm程度 |

4月12日

緑化・硬化

5月2日

5月3日 田植え

5月植えにより、過剰生育防止、乳白粒の発生防止をはかりましょう。



粃は袋に5~6分目に


目標 130g/箱 (乾粃)



◎育苗箱の消毒

イチバン  
500倍液  
水100ℓに薬剤を  
200ml入れる

瞬間浸漬  
液の中で箱をゆさぶる  
ジョウロで散布



◎種子消毒

| 薬剤名         | 希釈倍率<br>(水10ℓ当たり薬量) | 浸漬時間 | 水温     |
|-------------|---------------------|------|--------|
| テクリードCフロアブル | 200倍 (50ml)         | 24時間 | 10~20℃ |

種粉量に対する水量及び薬量

| 種粉重量 (kg) | 5  | 10  | 15  | 20  | 50  | 100  |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|------|
| 水量 (ℓ)    | 10 | 20  | 30  | 40  | 100 | 200  |
| 薬量 (ml)   | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 1000 |

- 10℃以下にならぬよう対応する。
- 樹脂性のラベルは字が消えるので木製の札を使用する。
- 消毒中に2~3回袋を動かし液を攪拌する。
- ※消毒後の廃液は河川等へ絶対に流さないで下さい。


◎催芽の状態

〈80%以上ハトムネ状態に！〉

ハトムネ



良



伸ばしすぎは  
芽や根が折れ  
やすい

悪

|    |   |      |
|----|---|------|
| 1  | 金 |      |
| 2  | 土 |      |
| 3  | 日 |      |
| 4  | 月 |      |
| 5  | 火 |      |
| 6  | 水 |      |
| 7  | 木 |      |
| 8  | 金 |      |
| 9  | 土 |      |
| 10 | 日 |      |
| 11 | 月 |      |
| 12 | 火 |      |
| 13 | 水 |      |
| 14 | 木 |      |
| 15 | 金 |      |
| 16 | 土 |      |
| 17 | 日 |      |
| 18 | 月 |      |
| 19 | 火 |      |
| 20 | 水 |      |
| 21 | 木 | 春分の日 |
| 22 | 金 |      |
| 23 | 土 |      |
| 24 | 日 |      |
| 25 | 月 |      |
| 26 | 火 |      |
| 27 | 水 |      |
| 28 | 木 |      |
| 29 | 金 |      |
| 30 | 土 |      |
| 31 | 日 |      |

# 4月


# 水と温度管理でガッチリ苗!!

## 緑化期

### ◎保温が第一、苗の素質が決まる

#### 1日目

- 1 灌水は覆土の持ち上がりがある場合のみ軽く行う。  
また、種籾の見えるところは軽く覆土する。
- 2 夜間は温度が15℃以下にならないように保温する。
- 3 出芽直後の白い芽は、直射日光に当たると白化現象を起こすので、直ちにラブシートや寒冷紗で被覆する。



#### 2日目~

- 1 晴れた日は、高温障害（ヤケ）にならないように日中ビニールをすかして換気を行う。  
※シルバーポリトウ使用の場合または、ハウスビニールを更新した場合は特に注意する。
- 2 夜温が15℃を下回るときは、十分な被覆を行い保温に努める。
- 3 床土表面が白く乾いた場合、灌水する。
- 4 緑化終了の目安は、葉が緑色になり、苗の長さが3cm程度になった時点とし、日中はラブシートや寒冷紗の被覆をとる。

## 硬化期

### ◎きめ細かな水・温度管理で丈夫な苗づくり

#### 初中期

(本葉1.0~2.0葉期)

- 1 徒長防止のため、日中は高温に注意し、換気につとめる。
- 2 夜間の温度が10℃以下になる場合は、被覆等を行い保温する。
- 3 土の乾き具合を見て、午前中に灌水する。雨天時の灌水は控える。
- 4 カビの早期発見・防除に努めること。(タチガレエースM液剤)

| 硬化初期              | 硬化中期 | 硬化後期    |
|-------------------|------|---------|
| 6日                | 6日   | 5日      |
| 昼間15~20℃ 夜間10~15℃ |      | 外気温にならす |
|                   |      |         |
| 日中は換気             |      |         |


#### 後期

(本葉2.0葉以降)

- 1 昼夜の温度差が大きいとムレ苗が出やすくなるので、日中の高温に注意し換気に努める。
- 2 水は1日に1~2回、たっぷりとかける。但し、夕方以降は行わない。
- 3 田植4~5日前からは極端な低温の恐れがない限り、夜間もビニールを開け外気に馴らし、硬い苗に仕上げる。
- 4 苗の葉色低下が著しい場合、田植3~4日前に、弁当肥を与える。

## 《温度管理と被覆資材使用の目安》

ハウスを閉めきったままにしておくと室温が50度程度まで上がるので上がり過ぎないように換気する。



| ステージ | 緑化期   | 硬化初期   | 硬化中期   | 硬化後期   | 注意事項   |     |
|------|-------|--------|--------|--------|--|-----|
| 日数   | 3~5日間 | 6日間    | 6日間    | 6日間    | ※育苗日数 20~25日<br>※緑化期は30℃<br>硬化期は25℃<br>以上に上げない<br>※最低8℃以下に<br>下げない |     |
| 昼    | 温度    | 20~25℃ | 15~20℃ | 15~20℃ |  | 外気温 |
|      | 被覆資材  | ○      | △      | ×      |  | ×   |
| 夜    | 温度    | 15~20℃ | 10~15℃ | 10~15℃ |  | 外気温 |
|      | 被覆資材  | ○      | △      | ×      |  | ×   |

注) ○は常時必要、△は状況に応じて必要、×は不要

## 箱育苗の生育障害と対策


| 病害名          | 使用時期                                | 薬剤名<br>(使用回数)   | 使用量   | 備考                                    |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 苗立枯病<br>(かび) | 播種時~<br>緑化期<br>(但し播種<br>14日後<br>まで) | ダコレート<br>水和剤<br>(播種時含み<br>2回以内)   | 500倍液を<br>1箱当たり<br>500ml灌注  | ●白カビ、青カビ<br>発生時                       |
|              | 播種時<br>または<br>発芽後                   | タチガレ<br>エースM<br>液剤<br>(1回)  | <水50ℓに<br>100ml(1本)<br>で100箱分>  | ●赤カビ発生時<br>●ムレ苗防止<br>根の生育促進にも<br>効果あり |
| ムレ苗          | 硬化期<br>(1.5~2葉<br>期が出や<br>すい)       | ●pH5.0前後にし、通<br>気性のある床土を使用する<br>●低温時は保温資材を<br>かける<br>●夜間冷えて晴天の日<br>には早めにビニール<br>をあけるようにする | ●葉身が針状に巻き、<br>しだいに黄褐色に<br>変わる<br>●夜間8℃以下の低温<br>と日中の高温によ<br>る地上部と地下部<br>のバランスがとれ<br>なくなり発生する |                                       |

## 弁当肥の施用法 (稀釈液の使用量は500ml/箱)

| 肥料名   | 施用法 (100箱当たり)            |
|-------|--------------------------|
| 硫安    | 500gを50ℓの水にとかして施用 (100倍) |
| 液肥10号 | 250mlを50ℓの水に薄めて施用 (200倍) |

・施用後は、軽く灌水し葉についた肥料を落とす。

比べてみましょう! 《稚苗》  
原寸大の苗です



## 土づくり

- 秋に土づくり資材を施用できなかったほ場は必ず春に施用しましょう。
- 『金沢土づくりパワーアッププラン』に基づき、土づくり資材を施用し稲体を強くしましょう。

## 荒 耕

- 15cm以上の深耕に努める(深耕は根の伸びる範囲を広げ、養分吸収を良くする)
- 均平は耕起前に高い所から低い所に土を運び、高低差を修正しましょう。

## 基肥施用基準 (10a当たり)

| 施肥方法              | 肥料名                                  | コシヒカリ   | ゆめみづほ   |
|-------------------|--------------------------------------|---------|---------|
| 一般体系              | BB 有機入り820号(みさと)                     | 40kg    | 45~50kg |
|                   | BB いしかわ有機入056号                       | 30kg    | 35~40kg |
|                   | BB エコ028号                            | 30kg    | 35~40kg |
| 基肥一発体系            | BB 新コシー発くん特号<br>または<br>BB 有機入りコシー発くん | 35~40kg | —       |
|                   | BB スリム早生一発くん                         | —       | 40~50kg |
| 基肥一発体系・<br>中間追肥省力 | BB けい酸パワー・コシー発くん                     | 70~80kg | —       |
|                   | BB けい酸アップ・コシー発くん                     | 45~55kg | —       |

※側条施肥機を利用する場合はJAの指導に従って開度を設定して下さい。(52ページ参照)

## 代 か き


- 田植え3日前までに行い、田面の高低差をなくす。
- 代かきは水を少なめにして、稲わらを土の中に埋め込むように作業すると、田植作業の能率と精度が上がります。

### ●代かきはねりすぎにならないように



枕地になる所はねり込みすぎないように注意する。代かき時の水の深さに注意し、ワラが浮かないようにする。

### ●ほ場を均平にする



田面が露出していると除草効果が落ち、また低い部分は薬害が出やすくなるので田面を均平にする。

**濁り水などが排水路に流れ込まないように水管理に注意しましょう。**

～ 今月の1か月対策 ～  
育苗日数(播種～田植まで)は  
1か月以内(20～25日間)が目安

|    |   |      |
|----|---|------|
| 1  | 月 |      |
| 2  | 火 |      |
| 3  | 水 |      |
| 4  | 木 |      |
| 5  | 金 |      |
| 6  | 土 |      |
| 7  | 日 |      |
| 8  | 月 |      |
| 9  | 火 |      |
| 10 | 水 |      |
| 11 | 木 |      |
| 12 | 金 |      |
| 13 | 土 |      |
| 14 | 日 |      |
| 15 | 月 |      |
| 16 | 火 |      |
| 17 | 水 |      |
| 18 | 木 |      |
| 19 | 金 |      |
| 20 | 土 |      |
| 21 | 日 |      |
| 22 | 月 |      |
| 23 | 火 |      |
| 24 | 水 |      |
| 25 | 木 |      |
| 26 | 金 |      |
| 27 | 土 |      |
| 28 | 日 |      |
| 29 | 月 | 昭和の日 |
| 30 | 火 |      |
|    |   |      |


葉いもち・初期害虫防除

(育苗箱施薬)

|         |  |   |
|---------|--|---|
| 薬剤名     | エバーゴルフオルテ箱粒剤   | Dr.オリゼスタークル箱粒剤  |
| 散布時期    | 播種時(覆土前)～移植当日  | 田植3日前～田植当日  |
| 施用量     | 1箱当たり50g   | 1箱当たり50g  |
| 散布方法    | 育苗箱の苗の上から均一に散布   | 育苗箱の上から均一に散布  |
| 主な対象病害虫 | いもち病、 <b>紋枯病</b> 、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、白葉枯病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ | いもち病、ウンカ類、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウ、イネクロカメムシ、もみ枯細菌病、白葉枯病、フタオビコヤガ |

●箱施薬剤散布における注意事項

- 箱施薬剤は育苗ハウス使用後、後作に野菜類を栽培する場合は、必ずハウス外にて散布を行って下さい。
- 必ず1箱当たり50gの施用量を守りましょう。
- ※間違えて水稻除草剤を使用しないで下さい。




50g散布

畦畔および農道等の除草

| 使用時期            | 薬剤名            | 薬量    | 水量  | 散布面積 | 使用回数   |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|--------|
| 雑草発生前～生育初期      | カーメックスD水和剤     | 80g   | 40L | 400㎡ | どちらか1回 |
|                 | ダイロンゾル         | 80ml  | 40L | 400㎡ |        |
| 4月～6月<br>雑草発生盛期 | ラウンドアップマックスロード | 200ml | 20L | 400㎡ | 3回以内   |
|                 | バスタ液剤          | 400ml | 40L | 400㎡ | 2回以内   |

注) 風の強い日は稲やその他作物にかからないよう注意して下さい。  
※バスタ液剤にカーメックスD水和剤またはダイロンゾルを混用して散布すると、抑草期間が長くなります。



# 5月

## 適切な初期管理で、高品質な米の第一歩

### 田植え

—5月植え・細植え・浅植えを心がけましょう—

- (1) 過剰生育や高温下での登熟を避けるため、5月植えを行う。
- (2) 過剰生育を抑えるため栽植密度は60株/坪とする。
- (3) 植付け本数は1株3~4本の細植えにする。植付け深さは2~3cmの浅植えにする。
- (4) 田植後5日間は、苗が水没しない程度の深水にする。

### 水田除草体系

—除草剤散布後は7日間止め水を徹底しましょう—


#### ●基本処理(初・中期一発剤)



#### ●省力化処理(初・中期一発剤)



#### ●雑草が多い場合



#### ※散布上の留意点

- (1) フロアブル剤、ジャンボ剤は湛水散布とし、特に水持ちの良いほ場で藻の発生前に使用する。
- (2) マメットSM1キロ粒剤、ザーベックスDX1キロ粒剤について気温が27℃以上となる高温時は薬害の恐れがあるので散布は行わない。
- (3) 藻の多発生したほ場では、モゲトン粒剤を2~3kg/10a散布する。

## 《農作業メモ》

2019年

5月

～ 今月の1か月対策 ～  
中干し開始は田植え  
1か月後が目安

|    |   |       |
|----|---|-------|
| 1  | 水 |       |
| 2  | 木 |       |
| 3  | 金 | 憲法記念日 |
| 4  | 土 | みどりの日 |
| 5  | 日 | こどもの日 |
| 6  | 月 | 振替休日  |
| 7  | 火 |       |
| 8  | 水 |       |
| 9  | 木 |       |
| 10 | 金 |       |
| 11 | 土 |       |
| 12 | 日 |       |
| 13 | 月 |       |
| 14 | 火 |       |
| 15 | 水 |       |
| 16 | 木 |       |
| 17 | 金 |       |
| 18 | 土 |       |
| 19 | 日 |       |
| 20 | 月 |       |
| 21 | 火 |       |
| 22 | 水 |       |
| 23 | 木 |       |
| 24 | 金 |       |
| 25 | 土 |       |
| 26 | 日 |       |
| 27 | 月 |       |
| 28 | 火 |       |
| 29 | 水 |       |
| 30 | 木 |       |
| 31 | 金 |       |

### 〈後期剤〉

#### ●ノビエの取りこぼしに

| 薬剤名             | 使用時期                              | 10a当たり<br>使用量       | 注意事項                             |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| ヒエクリーン<br>1キロ粒剤 | 田植後15日～<br>ノビエ4葉期まで<br>(収穫45日前まで) | 1 kg                | 湛水状態で散布<br>遅効性だが抑草期<br>間が長い      |
| クリンチャー<br>1キロ粒剤 | 田植後25日～<br>ノビエ5葉期まで<br>(収穫30日前まで) | 1.5kg               | 湛水状態で散布<br>速効性だが抑草効<br>果は期待できない  |
| クリンチャー<br>EW    | 田植後20日～<br>ノビエ6葉期まで<br>(収穫30日前まで) | 薬量100ml<br>希釈水量100ℓ | 落水状態で散布<br>効果を高めるため、<br>展着剤を加用する |

#### ●広葉雑草の取りこぼしに

| 薬剤名         | 使用時期                    | 10a当たり<br>使用量       | 注意事項                |
|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| バサグラン<br>粒剤 | 田植後15～55日<br>(収穫60日前まで) | 3～4 kg              | 落水状態で散布<br>3日間入水しない |
| バサグラン<br>液剤 | 田植後15～55日<br>(収穫50日前まで) | 薬量500ml<br>希釈水量100ℓ | 落水状態で散布<br>展着剤必要なし  |

#### ●ノビエも広葉も残った場合

| 薬剤名               | 使用時期                              | 10a当たり<br>使用量        | 注意事項               |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| アトトリ<br>豆つぶ250    | 移植後20日～<br>ノビエ4葉期まで<br>(収穫45日前まで) | 250g                 | 湛水状態で散布            |
| レプラス<br>1キロ粒剤     | 移植後14日～<br>ノビエ4葉期まで<br>(収穫60日前まで) | 1kg                  | 湛水状態で散布            |
| ワイドパワー<br>粒剤      | 移植後20日～<br>ノビエ5葉期まで<br>(収穫60日前まで) | 3kg                  | 落水状態で散布            |
| ワイドアタックD<br>1キロ粒剤 | 移植後15日～<br>ノビエ5葉期まで<br>(収穫60日前まで) | 1kg                  | 湛水状態で散布            |
| クリンチャーバス<br>ME液剤  | 田植後15日～<br>ノビエ5葉期まで<br>(収穫50日前まで) | 薬量1000ml<br>希釈水量100ℓ | 落水状態で散布<br>展着剤必要なし |

### 田植後の管理

- 田植後4～5日間は、やや深水としその後は日中浅水管理とする。
- 生ワラ等による有害ガスの除去を図るため、中干しまでに2～3回の軽い田干しを繰り返すこと。(根ぐされ防止対策)
- 本田初期害虫の防除。(育苗箱施薬できなかった場合)  
箱施薬剤を散布していないほ場で、イネドロオイムシ・イネミズゾウムシの発生がみられたらトレボン粒剤を2～3kg/10a散布する。

| 薬剤名    | 対象害虫                  | 10a当たり使用量 | 注意事項    |
|--------|-----------------------|-----------|---------|
| トレボン粒剤 | イネドロオイムシ、<br>イネミズゾウムシ | 2～3 kg    | 湛水状態で散布 |

# 6月

# 中干し・溝切りで健全な稲体づくり!!


## 中干し

—中干しは根の健全化と、無効分けつを抑える大切な作業です。—

### ◎中干しの方法

- 中干しは14～15本程度が確保されたら開始する。(6月初旬)
- 中干しの程度は、土中に「小ひび」が入るのを目安にし、湿田では程度を強める。
- 高温乾燥が続く場合は、落水期間を短くしたり、土壌に応じた水管理を行う。
- 中干しやその後の間断通水を完全に実施するために溝切り(ネキカキ)を行う。

### 《中干しのやり方(3日落水、1日通水)》




※乾田や地力の低いほ場では3日程度落水、1日通水。

※湿田や過繁茂になりやすいほ場では5日程度落水、1日通水。

※中干しの期間は早生で6月末まで、中生で7月上旬までとし、その後は飽水管理を行う。


### ◎中干しの効果

- |             |                         |           |
|-------------|-------------------------|-----------|
| 1. 元気な根づくり  | ➔ 根腐れ・倒伏防止              | ➔ 登熟・食味向上 |
| 2. 余分な窒素を抜く | ➔ 過剰生育抑制                | ➔ 乳白粒発生防止 |
| 3. 田面を固くしめる | ➔ 収穫直前まで通水してもコンバイン作業は楽々 |           |



#### 中干しをした稲体

- 水管理が良いため根が健全。
- 下葉の枯れ上りが少ない。





#### 中干しをしない稲体

- 水管理が悪いため根ぐされを生じる。
- 下葉の枯れ上りが多い。

## 溝切り

### ◎溝切り(ネキカキ)の方法

- 中干し開始直前あるいは中干し開始3日後を目安に行う。
- 溝切りは3～5m間隔に1本の割合を目安に行う。



|    |   |  |
|----|---|--|
| 1  | 土 |  |
| 2  | 日 |  |
| 3  | 月 |  |
| 4  | 火 |  |
| 5  | 水 |  |
| 6  | 木 |  |
| 7  | 金 |  |
| 8  | 土 |  |
| 9  | 日 |  |
| 10 | 月 |  |
| 11 | 火 |  |
| 12 | 水 |  |
| 13 | 木 |  |
| 14 | 金 |  |
| 15 | 土 |  |
| 16 | 日 |  |
| 17 | 月 |  |
| 18 | 火 |  |
| 19 | 水 |  |
| 20 | 木 |  |
| 21 | 金 |  |
| 22 | 土 |  |
| 23 | 日 |  |
| 24 | 月 |  |
| 25 | 火 |  |
| 26 | 水 |  |
| 27 | 木 |  |
| 28 | 金 |  |
| 29 | 土 |  |
| 30 | 日 |  |
|    |   |  |

## 中間追肥の施用

ー健全な稲づくりのため必ず施用しようー

| 資材名       | 施用量         | 施用時期                           |
|-----------|-------------|--------------------------------|
| 草木加里      | 10Kg/10a    | 6月1～15日                        |
| BB PKけいさん | 20～40Kg/10a | (早生) 6月10～20日<br>(中生) 6月15～30日 |

<PKけいさん・草木加里の効果>

○登熟向上 ○根張り促進 ○耐病性向上 ○耐倒伏性向上

※基肥一発肥料を使用の方は、必ず施用して下さい。

## 葉いもち・白葉枯病の予防

◆育苗箱施薬できなかったほ場

|      |             |
|------|-------------|
| 防除時期 | 6月上・中旬      |
| 対象病害 | 葉いもち・白葉枯病   |
| 薬剤名  | オリゼメート1キロ粒剤 |
| 使用量  | 1kg/10a     |

## 着色粒発生防止対策

ーカメムシ斑点米や褐色粒の発生を防止しようー



◆カメムシ防除をかねた畦畔沿い除草の4つのポイント

- **ポイント1** 畦畔・農道等の雑草は5～6月にかけて除草し、更に7月上旬に追加除草する。
- **ポイント2** 除草は、刈取るか除草剤(ラウンドアップマックスロードまたはバスタ液剤)を散布する。
- **ポイント3** 休耕田には、6月下旬にスミチオン乳剤1000倍を散布し、カメムシの生息密度を下げる。
- **ポイント4** 長く伸びた雑草を7月中旬以降に刈取るとカメムシを水田に追い込むので注意する。

# 7月

# 適切な穂肥で高品質米生産を!!

## 穂肥の施用



※葉色は、裏表紙の葉色見本を参考にして下さい。


## 穂肥施用時の注意点

### 1. 施用する前に、幼穂長と葉色を必ず確認

#### 【幼穂の確認方法】

平均的な株の一番背の高い茎を  
根元から抜き取る

カッターで  
茎のまん中を切る



### 2. 最終の穂肥は、出穂7日前までに


食味（玄米タンパク含有率）と穂肥（施肥窒素）には密接な関係があるので、施用する時期が遅いほど、また量が多いほど玄米中のタンパク含有率が高まり、食味が低下する。

### 3. 生育、地力に応じた施肥量、時期を判断

特にコシヒカリで茎数が多く葉色が濃い場合は、1回目の穂肥の施肥時期を基準より遅らせたり、施肥量を減らすなどして、乳白粒等の発生を軽減させることが必要です。

## 稲の姿による診断

### 十分穂肥を施用できる稲




- ・茎揃いが良く、茎数少なめ
- ・稲が硬い
- ・葉色が淡く、直立ぎみ

### 穂肥を施用できない稲



- ・茎数が多い
- ・葉が垂れている
- ・葉色が濃い

### 穂肥時期を遅らせる稲



- ・茎揃いが良く、茎数少なめ
- ・直立ぎみの稲
- ・葉色が濃い


## 水管理

…飽水管理で高品質化

### ●中干し終了後の水管理

- 中干し後から刈取り5日前まで飽水管理に努め、常に土壤に水分を与え乾き過ぎないようにする。
- 穂ばらみ期に極端な低温が予想される場合は、深水管理とする。
- この時期は稲体の水分蒸散量が最も多くなるので、特に飽水管理を徹底する。
- 台風等によるフェーン現象時には、事前に通水する。
- 通水する場合、可能な限り夜間通水に努め、根の活力低下を防ぐ。

### ●飽水状態とは



**出穂期とは**…茎から穂の先端部が抽出することを出穂といいます。水田全体の40～50%が出穂した日が出穂期です。出穂10日前とは出穂期の10日前のことをいいます。

# 基幹防除

・・・きれいな金沢米づくりは防除の完全実施から・・・

〈粉剤体系〉  基幹防除  随時防除

|       | 7 月  |  |     | 8 月  |  |
|-------|--|--|-----|--|--|
|       | 上 旬  | 中 旬  | 下 旬 | 上 旬  | 中 旬  |
| ゆめみづほ | 出穂前20~10日<br>Zボルドー<br>粉剤DL<br>4kg/10a<br><br>稲こうじ病 | 出穂前7~3日<br>ビームトレモン<br>セレン粉剤DL<br>4kg/10a<br><br>いもち病・紋枯病<br>カメムシ類他<br>(収穫21日前まで) | 出穂期 | 出穂後7~10日<br>ラブサイド<br>スタークル粉剤DL<br>4kg/10a<br><br>いもち病・カメム<br>シ類・ウンカ類他<br>(収穫7日前まで) | 出穂後14~17日<br>スタークル<br>粉剤DL<br>3kg/10a<br><br>カメムシ類他<br>(収穫7日前まで) |
| コシヒカリ | 出穂前20~10日<br>Zボルドー<br>粉剤DL<br>4kg/10a<br><br>稲こうじ病 | 出穂前7~3日<br>ビームトレモン<br>セレン粉剤DL<br>4kg/10a<br><br>いもち病・紋枯病<br>カメムシ類他<br>(収穫21日前まで) | 出穂期 | 出穂後7~10日<br>ラブサイド<br>スタークル粉剤DL<br>4kg/10a<br><br>いもち病<br>カメムシ類他<br>(収穫7日前まで)       | 出穂後14~17日<br>スタークル<br>粉剤DL<br>3kg/10a<br><br>カメムシ類他<br>(収穫7日前まで) |

〈微粒剤体系〉  基幹防除  随時防除 (微粒剤専用ホースまたは粒剤専用ホースが必要です)

|       | 7 月 |   |     | 8 月  |  |
|-------|-----|---|-----|--|--|
|       | 上 旬 | 中 旬   | 下 旬 | 上 旬  | 中 旬  |
| ゆめみづほ |     | 出穂前7~3日<br>サジェスト<br>微粒剤F<br>3kg/10a<br><br>いもち病・紋枯病<br>カメムシ類他<br>(収穫21日前まで) | 出穂期 | 出穂後7~10日<br>ビームスタークル<br>微粒剤F<br>3kg/10a<br><br>いもち病<br>カメムシ類・ウンカ類<br>(収穫7日前まで) | 出穂後14~17日<br>キラップ<br>微粒剤F<br>3kg/10a<br><br>カメムシ類他<br>(収穫14日前まで) |
| コシヒカリ |     | 出穂前7~3日<br>サジェスト<br>微粒剤F<br>3kg/10a<br><br>いもち病・紋枯病<br>カメムシ類他<br>(収穫21日前まで) | 出穂期 | 出穂後7~10日<br>ビームスタークル<br>微粒剤F<br>3kg/10a<br><br>いもち病<br>カメムシ類・ウンカ類<br>(収穫7日前まで) | 出穂後14~17日<br>キラップ<br>微粒剤F<br>3kg/10a<br><br>カメムシ類他<br>(収穫14日前まで) |

〈粒剤体系〉  基幹防除  随時防除

|       | 7 月  |  |     | 8 月  |     |
|-------|--|--|-----|--|-----|
|       | 上 旬  | 中 旬  | 下 旬 | 上 旬  | 中 旬 |
| ゆめみづほ | 出穂前14~10日<br>イモチエース<br>キラップ粒剤<br>3kg/10a<br><br>いもち病・紋枯病<br>ウンカ類・カメムシ類<br>(収穫35日前まで) |  | 出穂期 | 出穂後7~10日<br>スタークル粒剤<br>3kg/10a<br>または<br>スタークル豆つぶ<br>250g/10a<br><br>カメムシ類他<br>(収穫7日前まで) |     |
| コシヒカリ | 出穂前21~14日<br>モンガリット<br>粒剤<br>3kg/10a<br><br>稲こうじ病<br>紋枯病・他<br>(収穫45日前まで)             | 出穂前14~10日<br>イモチエース<br>キラップ粒剤<br>3kg/10a<br><br>いもち病・紋枯病<br>ウンカ類・カメムシ類<br>(収穫35日前まで) | 出穂期 | 出穂後7~10日<br>スタークル粒剤<br>3kg/10a<br>または<br>スタークル豆つぶ<br>250g/10a<br><br>カメムシ類他<br>(収穫7日前まで) |     |

## ポジティブリスト制度に対応した農薬飛散防止対策を

水稻ほ場の近くに他の作物(なし、なす、きゅうり等)がある場合は、水稻の防除薬剤がこれらの作物にかからないように、飛散防止対策をとって下さい。

- ① 散布時の風力、風向き、散布機の圧力調整などに注意する。
- ② 飛散しにくい粒剤に切り替える。

## 異常発生時の防除

(随時防除)

(10a当たり)

| 対象病害虫        | 薬剤名          | 防除時期                    | 使用量   |
|--------------|--------------|-------------------------|-------|
| 紋枯病          | リンバー粒剤       | 出穂14～10日前<br>(収穫30日前まで) | 3～4kg |
| 紋枯病<br>稻こうじ病 | モンガリット粒剤     | 出穂14～10日前<br>(収穫45日前まで) | 3～4kg |
| いもち病         | ブラシン粉剤DL     | 発生時<br>(収穫7日前まで)        | 3～4kg |
| 稻こうじ病        | Zボルドー粉剤DL    | 出穂20～10日前               | 3～4kg |
| コブノメイガ       | Mr.ジョーカー粉剤DL | 多発時<br>(収穫7日前まで)        | 3～4kg |


### 《稻こうじ病防除》

- 前年度、稻こうじ病の発生したほ場は必ずZボルドー粉剤DLを散布する。
- 発生したほ場では3年間継続して防除する。
- 穂ばらみ期に雨の多い場合は発生を助長するので、晴れ間をみて防除する。
- Zボルドー粉剤DLは薬害の恐れがあるため、出穂10日前以降の散布はしない。また、散布量(4kg/10a)を守り、均一に散布する。

### 追加除草の実施

カメムシの生息密度を下げるため、追加除草を実施する。

○畦畔・農道等の雑草は7月上旬にもう1回、追加除草を行う。



トゲシラホシカメムシ



アカスジカスミカメ



ホソハリカメムシ



アカヒゲホソミドリカスミカメ

## 《農作業メモ》

2019年

7月

～ 今月の1か月対策 ～

中干し後(幼穂形成期以降)から出穂までの約1か月間は飽水管理

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 1  | 月 |     |
| 2  | 火 |     |
| 3  | 水 |     |
| 4  | 木 |     |
| 5  | 金 |     |
| 6  | 土 |     |
| 7  | 日 |     |
| 8  | 月 |     |
| 9  | 火 |     |
| 10 | 水 |     |
| 11 | 木 |     |
| 12 | 金 |     |
| 13 | 土 |     |
| 14 | 日 |     |
| 15 | 月 | 海の日 |
| 16 | 火 |     |
| 17 | 水 |     |
| 18 | 木 |     |
| 19 | 金 |     |
| 20 | 土 |     |
| 21 | 日 |     |
| 22 | 月 |     |
| 23 | 火 |     |
| 24 | 水 |     |
| 25 | 木 |     |
| 26 | 金 |     |
| 27 | 土 |     |
| 28 | 日 |     |
| 29 | 月 |     |
| 30 | 火 |     |
| 31 | 水 |     |

※祝日は平成30年9月末時点

# 8月

# きめ細かな水管理と防除の徹底できれいなお米!!

## カメムシ等害虫防除の徹底!!

### ◆粉剤散布の場合


|      |            |            |
|------|------------|------------|
| 防除時期 | 3回目防除      |            |
|      | ゆめみづほ：8月上旬 | コシヒカリ：8月中旬 |
| 薬剤名  | スタークル粉剤DL  |            |
| 使用量  | 3kg/10a    |            |

### ◆微粒剤散布の場合

|      |            |            |
|------|------------|------------|
| 防除時期 | ゆめみづほ：8月上旬 | コシヒカリ：8月中旬 |
| 薬剤名  | キラップ微粒剤F   |            |
| 使用量  | 3kg/10a    |            |

### ◆粒剤散布の場合（粉剤散布できない所）

|      |                       |            |
|------|-----------------------|------------|
| 防除時期 | ゆめみづほ：7月下旬            | コシヒカリ：8月上旬 |
| 薬剤名  | スタークル粒剤 3kg/10a       |            |
| 使用量  | または スタークル豆つぶ 250g/10a |            |



カメムシによる斑点米



### カメムシ粒剤防除におけるスタークル粒剤・豆つぶの使い方

- 散布適期…穂が出揃った時～穂が傾き始めた頃
- 散布方法…湛水状態（3～5cm）で均一に散布し、3～4日間は水の出し入れをしない。

## 品質向上のための水管理

- 刈取り5日前まで、飽水管理を継続する。
- 台風等によるフェーン現象時には、事前に通水する。
- 高温時は可能な限り、夜間の通水に努める。
- 飽水管理後は、刈取り直前まで、ほ場に応じた通水管理を行う。

刈取り前に  
クサネムを除去する



乳白粒・胴割粒の発生を防止するために、きめ細かな水管理に努めましょう!!

《農作業メモ》

2019年

8月

～ 今月の1か月対策 ～  
出穂から刈取直前までの1か月以上は  
①乾かさない ②ずっと溜めない  
③すく落とさない

|    |   |      |
|----|---|------|
| 1  | 木 |      |
| 2  | 金 |      |
| 3  | 土 |      |
| 4  | 日 |      |
| 5  | 月 |      |
| 6  | 火 |      |
| 7  | 水 |      |
| 8  | 木 |      |
| 9  | 金 |      |
| 10 | 土 |      |
| 11 | 日 | 山の日  |
| 12 | 月 | 振替休日 |
| 13 | 火 |      |
| 14 | 水 |      |
| 15 | 木 |      |
| 16 | 金 |      |
| 17 | 土 |      |
| 18 | 日 |      |
| 19 | 月 |      |
| 20 | 火 |      |
| 21 | 水 |      |
| 22 | 木 |      |
| 23 | 金 |      |
| 24 | 土 |      |
| 25 | 日 |      |
| 26 | 月 |      |
| 27 | 火 |      |
| 28 | 水 |      |
| 29 | 木 |      |
| 30 | 金 |      |
| 31 | 土 |      |

適期刈取りで品質向上


- 籾数の85～90%が黄化した時期を目安とする(平年)。
- 出穂後の日数での目安

|       |         |
|-------|---------|
| ゆめみづほ | 34～38日頃 |
| コシヒカリ | 37～42日頃 |

**飽水管理で良好な稲体**  
根元が健全であり、登熟も良い。



**水不足の稲体**  
根元が不健全であり、乳白粒や着色粒が発生しやすい。また、早期落水で胴割粒が発生しやすい。



☆ 籾黄化率の目安



〈刈取り適期の目安〉

籾黄化率

|     |        |
|-----|--------|
| 平年  | 85～90% |
| 高温年 | 80～85% |

裏表紙に写真記載してありますので参考にして下さい。

◎ 最終防除後すみやかに、水稻栽培履歴記録簿を提出しましょう。(営農ごよみ添付)

※ 祝日は平成30年9月末時点

9月

適期収穫、適正な乾燥調製できれいなお米!!

### ◆万全な仕上げ6つのポイント

仕上乾燥は、ゆっくりと行う（毎時0.8%以下の乾減率が最適）▼

粳すりをていねいに行う▼


穀温が常温に戻ってから粳すりをする▼

胴割米防止



粳混入防止

肌ズレ米防止



整粒歩合向上

ライスグレーダーの網目は1.90mm以上（LL網）。適正流量を守ろう!! ▼



仕上げ水分は15%を目標とする▼

未熟米防止



過乾燥米防止



▲ライスグレーダーの網目は品種に応じたものを使用する  
粳すり機的能力に合わせ、適正流量で流す

お米は、全量JAに出荷しましょう。

## 《農作業メモ》

2019年

9月

|    |   |      |
|----|---|------|
| 1  | 日 |      |
| 2  | 月 |      |
| 3  | 火 |      |
| 4  | 水 |      |
| 5  | 木 |      |
| 6  | 金 |      |
| 7  | 土 |      |
| 8  | 日 |      |
| 9  | 月 |      |
| 10 | 火 |      |
| 11 | 水 |      |
| 12 | 木 |      |
| 13 | 金 |      |
| 14 | 土 |      |
| 15 | 日 |      |
| 16 | 月 | 敬老の日 |
| 17 | 火 |      |
| 18 | 水 |      |
| 19 | 木 |      |
| 20 | 金 |      |
| 21 | 土 |      |
| 22 | 日 |      |
| 23 | 月 | 秋分の日 |
| 24 | 火 |      |
| 25 | 水 |      |
| 26 | 木 |      |
| 27 | 金 |      |
| 28 | 土 |      |
| 29 | 日 |      |
| 30 | 月 |      |

## 乾 燥

- ・生粳は3時間以内に乾燥する。
- ・水分計の調整・点検は事前に行う。
- ・水分測定はこまめに行い、水分過多・過乾燥にならないよう15.0%（14.5～15.0%）に仕上げる。
- ・もち米は、一旦17%程度の状態で5～8時間おいてから、15%に仕上げる2段乾燥を行う。
- ・急激乾燥や高温乾燥は胴割米の発生原因になるので注意する。

## 粳 す り

- ・肌ズレ米は、2度すり・水分過多・粳温が高いときに発生し易くなるので注意する。
- ・粳すり前の水分点検や機械の調整（ロール間隔・選別部）を行う。また、水分計の事前点検も必ず行う。
- ・品種にあった適正網目のライスグレーダーを使い、整粒歩合を80%以上に調製する。

| 網目 | サイズ    | 品 種 名           |
|----|--------|-----------------|
| LL | 1.90mm | コシヒカリ、ゆめみづほ、もち類 |

※例年、もみ混入が目立ちます。調製はじめは、もみの混入が多いため、確認して多い場合は、最初の1袋に関しては、2度摺りを行って下さい。調製中は、2～3袋に1回はもみ混入の確認を行って下さい。

## 出 荷

- ・包装は正しく行うこと。しっかり縛らないと、破袋・荷崩れの原因になる。また記載事項は明確に記入する。
- ・生産年度の訂正はできないので注意する。
- ・皆掛け重量(30.5kg)の量目不足にならないように調整する。
- ・くず米、規格外米も全量JAに出荷しましょう。

## 注意!!

稲わら等の「野焼き」は原則として禁止されています。  
やむを得ず焼却する場合は最寄りの消防署へ連絡してください。

問い合わせ先:最寄りの消防署、または金沢市農業水産振興課 220-2213  
金沢市環境指導課 220-2521

※祝日は平成30年9月末時点

# 異品種・異物混入防止を徹底しましょう

石川の米をご愛顧いただく

消費者・取引先の

信頼に応えていくために

使用前、品種が変わる際、使用後には

コンバイン・乾燥機・粳すり機を清掃し

異品種や異物の混入を防止しましょう

## 作業をする際の注意点

### コンバイン

- 必ずエンジンを停止し、メインスイッチキーを抜いてください
- エンジン、マフラーが冷えてから作業してください
- 取り外したカバー類は、必ず元の位置に取り付けてください

### 乾燥機

- 必ず元電源のコネクタを抜いてください
- はずしたカバー、点検フタは、必ず元どおりに取り付けてください


### 粳すり機

- 各部の掃除は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてから行ってください
- はずしたカバー、点検フタは、必ず元どおりに取り付けてください

# 適正な乾燥・調製を行いましょ

- 玄米水分値は、14.5～15.0%に仕上げましょう
- 選別機の網目は、LL網(1.90mm)以上を使い、適正な流量で調製しましょう


## コンバイン



《脱穀部》  
脱穀部内・シーブケース・選別板の残米を取除いて下さい。

《1番・2番スクリュウ》  
1番・2番掃除口の開閉レバーを開いて残米を取除いて下さい。

《アンローダ》  
アンローダ掃除口を開け残米を取除いて下さい。




《2番処理胴》  
2番処理胴の掃除口を開け、残米を取除いて下さい。

《2番縦スクリュウ》  
2番縦スクリュウの掃除口を開け残米を取除いて下さい。

《グレンタンク内》  
グレンタンク内に残っている残米を取除いて下さい。

## 粳すり機 (回転式)


《ロール部》  
ゴムロールの内側に残っている残米を取除いて下さい。




《仕上米通路》  
仕上米通路に残っている残米を取除いて下さい。

《1・2番口》  
残っている残米を取除いて下さい。

《還元米点検口》  
還元米点検口を開け、異物を取り出して下さい。




## 乾燥機



《上部スクリュウ》  
上部スクリュウに残っている残米を取除いて下さい。


《水分計》  
水分計の周りに残っている残米を取除いて下さい。

《昇降機下部》  
昇降機下部に残っている残米を取除いて下さい。



《下部スクリュウ》  
下部スクリュウ内に残っている残米を取除いて下さい。

## 選別計量機




《屑米排出口》  
屑米排出口を開いて残留米を取除いて下さい。

《金網》  
タンク内の米・麦は全て取除いて下さい。

《残留米排出シャッタ》  
シャッタを開いて残留米を取除いて下さい。

《点検カバー》  
カバーを開いて残留米を取除いて下さい。



## 初すり機 (揺動式)

《ラセン底開閉レバー》  
ラセン底開閉レバーを回転させ、「取出」の位置にして下さい。

《円筒内》  
円筒内の残米を取除いて下さい。

《脱ぶ点検、残米取出口》  
「取出」の位置まで回し残米を排出して下さい。


《残米除去口》  
《還元米点検口》  
残米除去口・還元米点検口を外し中の残米・異物を除去して下さい。

《選別板》  
選別板と循環排出バルブの周りに残っている残米を取除いて下さい。

《仕上米通路》  
仕上米通路に残っている残米を取除いて下さい。

《精品排出スロフ》  
精品排出スロフに残っている残米を取除いて下さい。

《昇降機掃除口》  
混合昇降機内の残米を取除いて下さい。




《混合米スクリュウ底》  
混合米スクリュウ底の残米を取除いて下さい。

《未熟米スクリュウ底》  
未熟米スクリュウ底の残米を取除いて下さい。

《ロール部》  
ゴムロールの内側に残っている残米を取除いて下さい。

《返り初スロフ》  
送り初スロフに残っている残米を取除いて下さい。



《ダクト内》  
ダクト内の残米を取除いて下さい。

# 10月

# 稲づくりの基本は土づくり!!

## 金沢土づくりパワーアッププラン

……「土づくりで良質米競争に勝とう!!」……

金沢全域で土壌分析を実施した結果、全域で土壌の保肥力を高める腐植や、生育に重要なリン酸が不足しています。また、稲体を強くするために必要なケイ酸分も不足しています。これら不足成分を補うため、金沢土づくりパワーアッププランを実践し良質米競争に打ち勝ちましょう!!

**土づくりの基本は、稲わらの全量還元と土づくり資材の秋施用です。**

**下記の図表を参考に積極的に継続して取り組もう!!**

土壌分析の結果、良質米生産に重要な腐植・有効態リン酸・有効態ケイ酸が下記マップのとおり不足しています。

Aランク □ 現時点では目標値を上回っている地区（金沢市街、粟五、大野は除く）




Bランク ■ 不足している地区

Cランク ■ 極端に不足している地区。早急に補給が必要。

〈腐植〉

〈有効態リン酸〉

〈有効態ケイ酸〉



□ Aランク 3.0%以上  
■ Bランク 2.0%以上 3.0%未満  
■ Cランク 2.0%未満

□ Aランク 20mg以上  
■ Bランク 10mg以上 20mg未満  
■ Cランク 10mg未満  
(乾土100g中)


□ Aランク 25mg以上  
■ Bランク 15mg以上 25mg未満  
■ Cランク 15mg未満  
(乾土100g中)

## 〈金沢土づくりパワーアッププラン〉継続して実施しましょう!!

※秋に施用し秋耕すること。できない場合は春施用しましょう。

|         | 地区名                                | 土づくり資材                                  |
|---------|------------------------------------|---|
| 腐植重点地区  | 金城、湯津、川北、湯涌、大場、八田、才田、花園、医王山、薬師谷、三谷 | パワフル大地 60kg/10a                         |
| リン酸重点地区 | 金城、八田、才田、三谷                        | ようりん 60kg/10a<br>または パワフル大地 60kg/10a    |
| ケイ酸重点地区 | 崎浦、鞍月、大徳、米丸                        | スーパーけい酸 60kg/10a<br>または パワフル大地 60kg/10a |

# 土づくりのポイント



## 《農作業メモ》

| 2019年 |   | 10月  |
|-------|---|------|
| 1     | 火 |      |
| 2     | 水 |      |
| 3     | 木 |      |
| 4     | 金 |      |
| 5     | 土 |      |
| 6     | 日 |      |
| 7     | 月 |      |
| 8     | 火 |      |
| 9     | 水 |      |
| 10    | 木 |      |
| 11    | 金 |      |
| 12    | 土 |      |
| 13    | 日 |      |
| 14    | 月 | 体育の日 |
| 15    | 火 |      |
| 16    | 水 |      |
| 17    | 木 |      |
| 18    | 金 |      |
| 19    | 土 |      |
| 20    | 日 |      |
| 21    | 月 |      |
| 22    | 火 |      |
| 23    | 水 |      |
| 24    | 木 |      |
| 25    | 金 |      |
| 26    | 土 |      |
| 27    | 日 |      |
| 28    | 月 |      |
| 29    | 火 |      |
| 30    | 水 |      |
| 31    | 木 |      |

### 土づくり対策

#### (1) 有機物の還元・土づくり資材の秋施用

①稲わらは燃やさず、全量すき込む。

(10a分の稲わらは、堆肥1トンに相当します)

※稲わらの腐熟促進に、アグリ革命2kg/10aを同時施用すると効果的です。

#### ②土づくり資材等の10a当たり施用の目安

| 資材名                     | 基本施用量 | 備考   |
|-------------------------|-------|--|
| スーパーけい酸<br>(リン酸・ケイ酸)    | 60kg  | ケイ酸分は、稲体に吸収されやすいケイ酸を含んでいますので、茎・葉・根を丈夫にし耐倒伏性、耐病性を増大する効果があります。                     |
| パワフル大地<br>(リン酸・ケイ酸・腐植酸) | 60kg  | 腐植酸・リン酸・ケイ酸・加里・苦土をバランスよく配合しており、10a当たり60kg(3袋)の施用で、堆肥150kg相当の効果が得られる省力施肥型水稻土づくり肥料 |
| ようりん<br>(リン酸・ケイ酸)       | 60kg  | 土壌の酸性をゆるやかに矯正する。根張りをよくし初期生育の促進、また有効分けつを多くする。健全な稲を育て多収の効果がある。                     |
| ケイカル<br>(ケイ酸・カルシウム)     | 100kg | 茎や葉がかたくなり、節間が徒長しないで倒伏しにくくなる。下葉の枯れ上がりが少なくなり、登熟がよくなる。病害虫に対して強くなる。根ぐされ、秋落ちを防ぎます。    |
| アグリ革命                   | 2kg   | 稲わらを腐熟化し、地力の増強に役立たせます。ワラエースの代替品  |

#### (2) 秋耕と排水対策

①有機物、土づくり資材施用後、速やかに耕起(深耕)する。

②稲わら等有機物の分解を促進するため、排水溝を設置し、ほ場内に水が溜まらないようにする。

**環境に配慮して、稲わら等は燃やさないようにしましょう。**

# 担い手に夢を託そう地域の農業

明日の農業をめざして、農地の有効利用を応援します。

(参考)

## 平成30年度 農作業基本料金 (平坦地基準)

| 区 分 |                   | 金額(円)<br>消費税抜き | 備 考                              |
|-----|-------------------|----------------|----------------------------------|
| ☆   | 荒 起 し             | 6,000          | 10a当たり                           |
| ☆   | 代 か き             | 8,000          | 10a当たり                           |
| ☆   | 田 植 普 通           | 8,500          | 10a当たり (四隅は植えません)                |
|     | 側 条               | 9,500          |                                  |
|     | 苗 運 搬             | 60             | 1箱当たり                            |
|     | 箱 洗 い ・ 乾 燥       | 50             | 1箱当たり                            |
|     | 散 布 作 業 (防 除、施 肥) | 2,000          | 10a当たり (薬剤、肥料、資材は実費負担が必要です)      |
| ☆   | コ ン バ イ ン 刈 取 り   | 22,000         | 10a当たり (作業の難易度によって更に加算があります)     |
|     | ば ら 粃 運 搬         | 2,700          | 10a当たり (ライスセンターへの粃搬入)            |
|     | 機 械 畦 塗 り         | 80             | 1面m当たり (四隅は塗りません)                |
|     | 除 草 剤 散 布         | 10             | 1㎡当たり (畦畔、農道は散布できません)            |
|     | 草 刈 (手 作 業)       | 12             | 1㎡当たり (刈払による作業)                  |
|     |                   | 25             | 1㎡当たり (作業難易度が高い場合)               |
|     | 草 刈 (乗 用 機 械)     | 10             | 1㎡当たり (運搬費として、別途5,000円(税別)が必要です) |

注・☆印の作業については、ほ場条件等によって割増料金をいただきます。

・作業機械(トラクター、田植機等)の運搬代金として、別途5,000円(税別)が必要です。



### ほ場条件による割増

▼面積によるもの

| 区画の大きさ  | 加算率 |
|---------|-----|
| 4a~5a未満 | 30% |
| 4a未満    | 50% |

▼作業難易度によるもの

| 区 分 | 加算率 |
|-----|-----|
| A   | 20% |
| B   | 35% |
| C   | 50% |

# 稲作作業省力化を目指して！

## JAが提案する今後の稲作省力体系

|      |    |                               |
|------|----|-------------------------------|
| 肥料施用 | 従来 | 基肥 → 田植 → 穂肥① → 穂肥② →         |
|      | 省力 | 一発肥料<br>田植同時 →                |
| 水稻除草 | 従来 | 田植 → 一発除草剤 →                  |
|      | 省力 | 一発除草剤<br>田植同時 →               |
| 防除散布 | 従来 | 播種 → 田植 → 初期害虫 → いもち予防 → 基幹防除 |
|      | 省力 | 長期箱薬剤<br>田植前処理 → 田植 → 基幹防除    |
|      |    | 長期箱薬剤<br>播種時処理 → 基幹防除         |

### 施肥省力化

#### ①基肥施用

田植同時側条施肥機による、基肥一発肥料施用

(基肥一発肥料は、穂肥施用を省力化します。BB 新コシー発くん特号、BB 有機入りコシー発くん、BB けい酸パワー・コシー発くん、BB けい酸アップ・コシー発くん、BB スリム早生一発くん)

#### ②省力土づくり資材

BB パワフル大地…10a当たり60kg (3袋) 施用で、堆肥150kg相当の効果が得られます。

#### ③水稻育苗マット (万作さん)

育苗箱の軽量化 (特に田植時の運搬労力軽減)

### 畦畔除草の省力化

カソロン粒剤6.7の秋冬散布により  
畦畔の長期抑草が図れます。

### 直播栽培

苗づくり、苗の運搬等が省けます。



直播のは種作業



カソロン粒剤6.7散布風景

### 除草剤散布省力化

田植同時除草剤散布機による除草剤の散布

| 散布方法 | 散布機名                   | 区分      | 主な処理可能除草剤名 | 規格       |
|------|------------------------|---------|------------|----------|
| 粒剤散布 | こまきちゃん<br>及び<br>イノベーター | 初・中期一発剤 | バッチリ1キロ粒剤  | 1kg・10kg |
|      |                        |         | キクトモ1キロ粒剤  | 1kg・10kg |

※田植機によって取付け出来ない散布機がありますので、JAにご相談下さい。

※散布機及び除草剤によって開度が異なりますので、JAに確認下さい。



田植同時除草剤散布

### 防除省力化

#### ①田植同時箱施薬剤施用

専用散布機〈箱まきちゃん〉による箱施薬剤の田植同時処理

#### ②基幹防除の粒剤散布処理 (動散で一人で処理可能、粉剤処理不可能地区)

〈紋枯病・いもち病・ウンカ類・カメムシ類〉……………イモチエースキラップ粒剤  
〈カメムシ類〉……………スタークル粒剤

#### ③基幹防除の豆つぶ散布処理 (動散を使わずに、畦から手またはひしゃくで散布可能。)

〈カメムシ類〉……………スタークル豆つぶ

# BB肥料側条基肥開度目安表

1. 調節は肥料を入れる前に行い、開度は最初小さめに設定し、多肥にならないよう注意してください。
2. この開度はあくまでも目安を示したもので、車輪のスリップ率などにより施肥量が変わりますので、実際に施肥作業を行い、施肥量を確認し、目標に合うよう再度施肥量を調整してください。

## 主なBB水稻基肥側条銘柄の仮比重


| 対象銘柄              | 仮比重  | 目安表での参照    |
|-------------------|------|------------|
| BB 新コシー発くん特号      | 0.92 | 各コシー発くん    |
| BB けい酸パワー・コシー発くん  | 0.96 |            |
| BB けい酸アップ・コシー発くん  | 0.91 |            |
| BB 有機入り820号 (みさと) | 0.83 | 各コシ基肥      |
| BB いしかわ有機入り056号   | 0.90 |            |
| BB スリム早生一発くん      | 0.84 | 早生一発くん     |
| BB 有機入りコシー発くん     | 0.80 | 有機入りコシー発くん |
| BB 003-40号 (側条用)  | 0.95 | 側条用003-40号 |
| BB エコ028号         | 1.03 | エコ028号     |

※「基肥一発肥料」は、樹脂でコーティングした肥料を配合しているため、一般の肥料に比べ粒径は大きく、仮比重が小さくなっています。そのため側条施肥の場合、開度調整に注意が必要です。全量一括施肥という特性も踏まえ、必ず目盛りと実際の施肥量をチェックしてください。

## クボタ田植機用

■機種名 EPタイプ、ZPタイプ


■開度調節ツマミ



### 比重区分ラベル

| 線出し量(g) | ~359    | 360~420  | 421~    |
|---------|---------|----------|---------|
| 使用目盛    | 区分(比重)小 | 区分(比重)標準 | 区分(比重)大 |

### 施肥量調節目安表



■開度目安

各コシー発くん、各コシ基肥、早生一発くん、有機入りコシー発くん、側条用003-40号  
→比重区分を「区分(比重)小」に合わせ、施肥量を調整する。


エコ028号

→比重区分を「区分(比重)標準」に合わせ、施肥量を調整する。

# クボタ田植機用

■機種名 SPUタイプ、SPDタイプ、NSUタイプ、WPタイプ

■開度調節つまみ



■開度目安

各コシ一発くん、各コシ基肥、早生一発くん、有機入りコシ一発くん、側条用003-40号  
→ふたつ多めの目盛を使用 (例) 25kg/10a施肥の場合、30の目盛を使用



エコ028号

→ひとつ多めの目盛を使用 (例) 25kg/10a施肥の場合、28の目盛を使用

# クボタ田植機用

■機種名 SPA(ミッド施肥)タイプ

■開度調節つまみ



■開度目安表 ~10a当たり施肥量(kg)の目安~

●60株の場合

| ロール開度  | 駆動ロッドA |     |     |     |     |     |     |     | 駆動ロッドB |     |     |     |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|
|  | 2.5    | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 3.5    | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 標準   | 17     | 21  | 24  | 28  | 31  | 35  | 39  | 42  | 41     | 48  | 54  | 60  |
| 各コシ一発くん<br>各コシ基肥<br>早生一発くん<br>有機入りコシ一発くん<br>側条用003-40号 | 14     | 16  | 19  | 21  | 24  | 28  | 30  | 32  | 32     | 37  | 42  | 48  |
| エコ028号   | 15     | 17  | 20  | 22  | 26  | 29  | 32  | 34  | 34     | 39  | 45  | 51  |

●50株の場合


| ロール開度  | 駆動ロッドA |     |     |     |     |     |     |     | 駆動ロッドB |     |     |     |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|
|  | 2.5    | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 3.5    | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 標準   | 15     | 18  | 21  | 24  | 27  | 30  | 33  | 36  | 36     | 41  | 46  | 53  |
| 各コシ一発くん<br>各コシ基肥<br>早生一発くん<br>有機入りコシ一発くん<br>側条用003-40号 | 12     | 13  | 16  | 18  | 20  | 23  | 25  | 27  | 27     | 31  | 35  | 40  |
| エコ028号   | 13     | 14  | 17  | 18  | 22  | 24  | 27  | 28  | 28     | 33  | 38  | 43  |

※標準は田植機に記載の標準的な開度目盛

# ワセキ田植機用

■機種名 PG53/63/73/83、PZ50/60/70/80/100

■開度調節ツマミ (田植機の背中にツマミがある)



■開度目安表 ~10a当たり施肥量(kg)の目安~

●60株/50株の場合

| 施肥量開度(kg)  | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 標準   | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 各コシ一発くん<br>各コシ基肥<br>早生一発くん<br>有機入りコシ一発くん<br>側条用003-40号 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| エコ028号   | 19 | 23 | 26 | 30 | 34 | 40 | 45 | 50 | 54 |


※標準は田植機に記載の標準的な目盛(作動ロッドは標準位置)

# ワセキ田植機用

■機種名 PQ4/5、PQZ4/5

■開度調節ツマミ

(田植機の背中に  
開度調節ツマミがある)



■開度目安表 ~10a当たり施肥量(kg)の目安~

●60株/50株の場合

| 施肥量開度(kg)  | 作動ロッド少量位置 |    | 作動ロッド標準位置 |    |    |    |    |    |    |
|--|-----------|----|-----------|----|----|----|----|----|----|
|  | 20        | 25 | 30        | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 標準   | 20        | 25 | 30        | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 各コシ一発くん<br>各コシ基肥<br>早生一発くん<br>有機入りコシ一発くん<br>側条用003-40号 | 20        | 25 | 29        | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 58 |
| エコ028号   | 22        | 27 | 32        | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 |

※標準は田植機に記載の標準的な目盛(30kg/10a以下で施肥する場合は作動ロッドを少量位置に切替えて作業してください)

## ワセキ田植機用

■機種名 PA(F1)53/63/83、PG(F1)5/6/8

■開度調節ツマミ

(田植機のサイドに  
開度調節ツマミがある)



■開度目安表 ~10a当たり施肥量(kg)の目安~

●60株の場合

| 開度(mm)   | 4  | 6  | 8  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 標準   | 14 | 19 | 21 | 26 | 33 | 39 | 44 | 47 |
| 各コシ一発くん<br>各コシ基肥<br>早生一発くん<br>有機入りコシ一発くん<br>側条用003-40号 | 15 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| 工コ28号  | 16 | 21 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 |

●50株の場合

| 開度(mm)   | 4  | 6  | 8  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 標準   | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 35 | 38 |
| 各コシ一発くん<br>各コシ基肥<br>早生一発くん<br>有機入りコシ一発くん<br>側条用003-40号 | 13 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 |
| 工コ28号  | 13 | 18 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 39 |


※標準は田植機に記載の標準的な目盛(比重0.9未満の肥料)

## ワセキ田植機用

■機種名 PA50/60/80、PG(MF)5/6/8

■開度調節ツマミ

(田植機のサイドに  
開度調節ツマミがある)



■開度目安表 ~10a当たり施肥量(kg)の目安~

●60株の場合

| 開度(mm)   | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|--|----|----|----|----|----|----|----|
| 標準   | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 54 |
| 各コシ一発くん<br>各コシ基肥<br>早生一発くん<br>有機入りコシ一発くん<br>側条用003-40号 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 35 | 42 |
| 工コ28号  | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 44 | 48 |

●50株の場合


| 開度(mm)   | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|--|----|----|----|----|----|----|----|
| 標準   | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 45 |
| 各コシ一発くん<br>各コシ基肥<br>早生一発くん<br>有機入りコシ一発くん<br>側条用003-40号 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 29 | 35 |
| 工コ28号  | 18 | 22 | 25 | 29 | 33 | 37 | 40 |

※標準は田植機に記載の標準的な目盛(比重0.9未満の肥料)

# ヤンマー田植機用

■機種名 RJタイプ、RGタイプ、YRタイプ

■開度調節ツマミ



■開度目安表 ~10a当たり施肥量(kg)の目安~

●60株の場合

| 施肥量目盛  | 少量ギヤ(黒) |    |    | 標準ギヤ(白) |    |    |
|--|---------|----|----|---------|----|----|
|  | 5       | 8  | 11 | 3       | 5  | 7  |
| 標準   | 20      | 27 | 35 | 39      | 52 | 64 |
| 各コシ一発くん<br>各コシ基肥<br>早生一発くん<br>有機入りコシ一発くん<br>側条用003-40号 | 17      | 24 | 32 | 37      | 48 | 60 |
| エコ028号   | 19      | 26 | 34 | 38      | 51 | 63 |

●50株の場合

| 施肥量目盛  | 少量ギヤ(黒) |    |    | 標準ギヤ(白) |    |    |
|--|---------|----|----|---------|----|----|
|  | 5       | 8  | 11 | 3       | 5  | 7  |
| 標準   | 17      | 23 | 29 | 33      | 43 | 53 |
| 各コシ一発くん<br>各コシ基肥<br>早生一発くん<br>有機入りコシ一発くん<br>側条用003-40号 | 14      | 20 | 27 | 31      | 40 | 50 |
| エコ028号   | 16      | 22 | 28 | 32      | 43 | 53 |


※標準は田植機に記載の標準的な目盛(肥料のかさ比重が0.9の場合)

# ヤンマー田植機用

■機種名 VP40~80C・X・D、VP4~8・VPD・VP5~6C等、VP(ミッド施肥)タイプ

■開度調節ツマミ

インジゲータ



■開度目安表 ~10a当たり施肥量(kg)の目安~

●60株の場合

| 施肥量目盛  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | 標準 | 9  | 13 | 20 | 26 | 31 | 40 | 48 |
| 各コシ一発くん<br>各コシ基肥<br>早生一発くん<br>有機入りコシ一発くん<br>側条用003-40号 | 5  | 11 | 18 | 25 | 31 | 38 | 44 | 50 |
| エコ028号   | 7  | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 48 | 55 |

●50株の場合


| 施肥量目盛  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|
|  | 標準 | 8  | 11 | 17 | 22 | 26 | 33 | 40 |
| 各コシ一発くん<br>各コシ基肥<br>早生一発くん<br>有機入りコシ一発くん<br>側条用003-40号 | 4  | 9  | 15 | 21 | 26 | 32 | 37 | 42 |
| エコ028号   | 6  | 12 | 18 | 23 | 29 | 35 | 40 | 46 |

※標準は田植機に記載の標準的な目盛(肥料のかさ比重が0.9の場合)

# ヤンマー田植機用

■機種名 YR-Dタイプ

■開度調節ツマミ



■開度目安表 ~10a当たり施肥量(kg)の目安~

●60株/50株の場合

| 施肥量目盛  | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 7.5 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 標準   | 20  | 30  | 40  | 50  | 60  | 70  |
| 各コシ一発くん<br>各コシ基肥<br>早生一発くん<br>有機入りコシ一発くん<br>側条用003-40号 | 18  | 27  | 36  | 45  | 54  | 63  |
| エコ028号   | 19  | 29  | 39  | 49  | 59  | 69  |

※標準は田植機に記載の標準的な目盛(肥料のかさ比重が0.9の場合)

消費者・実需者から選ばれる産地になるために

ギャップ

# GAPに取組みましょう

## 1. GAP (Good Agricultural Practice) って何？

GAPとは、直訳すると「良い農業の実践」となり、未来に渡って持続的な農業生産活動を行うために必要な取組みのことで、「適正農業規範」と称しています。

この良い農業を実践するためには農業者等は、「安全な農産物の生産」や「環境の保全」、「農業者の安全確保」などを目標として、生産から出荷までの生産工程における危害を未然に防ぐための持続的な改善活動に取り組むことが求められています。

また、GAPについては、グローバルGAPやJGAP等専門的な知識を持った第三者が認証するGAP認証を取得する取組みがありますが、農家としては、まずはGAPの考え方を理解し、自分の経営のGAPレベルを上げていくことが大切です。

現在、2020年東京オリンピック・パラリンピックの食材調達の観点から、国の後押しのもと、全国的にGAPの取組みは広がりつつありますので、皆様におかれましては、主旨にご理解の上、取組みへのご協力をお願いします。

## 2. GAPの目的と効果

### 目的1

#### 適正な農業の実践

- ①「安全な農産物の生産」
- ②「環境の保全」
- ③「農業者の安全確保」

### 目的2

#### 信頼性の向上

農場のルール<sup>①</sup>の明確化や記録の徹底により、消費者等への的確な情報提供が可能となり、産地の評価や信頼性の向上につながります。



### 効果

#### 農業経営の改善

- ①整理整頓などによる無駄の排除
- ②改善活動による経営の効率化
- ③後継者の育成確保

など、GAPによる改善活動を継続することにより、経営のレベルアップや安定化が期待できます。

GAPは、すでに、生産者の皆さんが実践していることがほとんどです。

しかし、これまでの農業生産活動では経験や勘に頼り、客観的に確認できない(見えない)部分が多く、より良い農業を目指すためには、生産工程に応じた危害防止のための点検を行い、対策をルール化し、必要な場合は文書に残すことが大切です。

### 3. 具体的に何をすればいいの？

“GAP”を決定づけるのは、不適切な農業行為である“BAP”です。


実践している農業生産活動の中に問題がある(悪い)部分を改善(正しく)することが必要で、どこが問題なのか、なぜ問題なのか、どうすれば良いのかを明らかにすることが重要です。

そのためにも、まずは、JAから配布される自己点検シートを用いて、自らの農場においてBAP(不適切な農業行為)になっているところがないか自己点検することから始めましょう。

(自己点検シートの例)

| 区分   | 番号 | 点検項目   | チェック時期の目安 | 対象   | 自己点検チェック                 | 取組効果                     |
|------|----|--|-----------|------|--------------------------|--------------------------|
| 営農計画 | 1  | 営農座談会への参加や栽培暦の活用等今年の栽培(作付)計画を立てている。                    | 3月        | 全生産者 | <input type="checkbox"/> | ・安全な農産物が生産、情報の把握や共有ができる。 |
|      | 2  | 「安心・安全な農産物づくり」を意識して農業に取り組んでいる。                         | 随時        | 全生産者 | <input type="checkbox"/> | ・安全な農産物が生産できる。           |
| JA米  | 3  | JA米の要領をよく理解している。(品種のはっきりした種子、農産物検査受検、栽培履歴記帳、水分15.5%以下) | 3月        | 全生産者 | <input type="checkbox"/> | ・安全な農産物が生産できる。           |
| 栽培準備 | 4  | 納屋や作業場の清掃は徹底している。                                      | 随時        | 全生産者 | <input type="checkbox"/> | ・安全な農産物の生産、異物混入の防止が図れる。  |
|      | 5  | 農薬は整理整頓し適正に保管している。                                     | 随時        | 全生産者 | <input type="checkbox"/> | ・安全な農産物の生産ができる。          |
|      | 6  | ガソリン、混合油は専用の容器を使用するとともに、火気のない場所で保管している。                | 随時        | 全生産者 | <input type="checkbox"/> | ・安全な農産物の生産ができる。          |
|      | 7  | 納屋や作業場にネズミ駆除剤を使用せず、適正な対策を行っている。                        | 随時        | 全生産者 | <input type="checkbox"/> | ・安全な農産物の生産、異物混入の防止が図れる。  |

### 4. GAPの取組みの実践ステップ



# 2019年産石川県産米 自己点検(GAP)チェックシート

町名: ○○町 氏名: 金沢 太郎

JAグループ石川

(記入例)

※設問に該当する場合はチェック欄にチェックしてください。

| 区分   | 番号 | 点検項目   | チェック<br>時期の目安 | 対象     | 自己点検<br>チェック<br>☑ | 二重点検<br>チェック<br>☑ | 取組効果                     |
|------|----|--|---------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 営農計画 | 1  | 営農座談会への参加や栽培暦の活用等今年の栽培(作付)計画を立てている。                    | 3月            | 全生産者   | ☑                 |                   | ・安全な農産物が生産、情報の把握や共有ができる。 |
|      | 2  | 「安心・安全な農産物づくり」を意識して農業に取り組んでいる。                         | 随時            | 全生産者   |                   |                   | ・安全な農産物が生産できる。           |
| JA米  | 3  | JA米の要領をよく理解している。(品種のはっきりした種子、農産物検査受検、栽培履歴記帳、水分15.5%以下) | 3月            | 全生産者   | ☑                 |                   | ・安全な農産物が生産できる。           |
| 栽培準備 | 4  | 納屋や作業場の清掃は徹底している。                                      | 随時            | 全生産者   |                   |                   | ・安全な農産物の生産、異物混入の防止が図れる。  |
|      | 5  | 農薬は整理整頓し適正に保管している。                                     | 随時            | 全生産者   | ☑                 |                   | ・安全な農産物の生産ができる。          |
|      | 6  | ガソリン、混合油は専用の容器を使用するとともに、火気のない場所で保管している。                | 随時            | 全生産者   |                   |                   | ・安全な農産物の生産ができる。          |
|      | 7  | 納屋や作業場にネズミ駆除剤を使用せず、適正な対策を行っている。                        | 随時            | 全生産者   |                   |                   | ・安全な農産物の生産、異物混入の防止が図れる。  |
| 土づくり | 8  | 有機物や土壌改良資材の施用、深耕、排水性の改良などの土づくりを実施し、施肥改善に努めている。         | ～4月           | 全生産者   | ☑                 |                   | ・安全な農産物の生産、環境負荷の低減が図れる。  |
| 育苗   | 9  | 購入した種子および苗の品種・数量を確認している。                               | 3月            | 全生産者   |                   |                   | ・安全な農産物の生産、品質間違いの防止が図れる。 |
|      | 10 | 種子消毒済みの余った種子や消毒液は適正に処分している。                            | 3月            | 自家育苗の方 |                   |                   | ・安全な農産物の生産、環境負荷の低減が図れる。  |
|      | 11 | 育苗ハウスの苗は、品種がわかるように管理している。                              | 4～5月          | 自家育苗の方 |                   |                   | ・安全な農産物の生産、品質間違いの防止が図れる。 |
| 栽培   | 12 | 今年の栽培暦、営農情報はいつでも見られるようにしている。                           | 5月            | 全生産者   | ☑                 |                   | ・安全な農産物の生産、情報の把握や共有ができる。 |
|      | 13 | 田植の際には、品種確認をしっかりと行っている。                                | 5月            | 全生産者   | ☑                 |                   | ・安全な農産物の生産、品質間違いの防止が図れる。 |
|      | 14 | 水稻除草剤を使用後、基準の期間は止め水管理を行っている。                           | 5月            | 全生産者   | ☑                 |                   | ・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。   |
|      | 15 | 肥料は、施肥基準を確認し、生育に合わせて適正に施用している。                         | 随時            | 全生産者   | ☑                 |                   | ・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。   |
|      | 16 | 農薬の飛散・流出防止の観点から、ほ場周辺の作付け状況を確認している。                     | 随時            | 全生産者   |                   |                   | ・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。   |
|      | 17 | 農薬は、営農情報やラベルを確認し、使用量、時期、回数を遵守している。                     | 随時            | 全生産者   | ☑                 |                   | ・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。   |
|      | 18 | 農薬散布は、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯に行っている。                         | 随時            | 全生産者   | ☑                 |                   | ・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。   |
|      | 19 | 農薬を使用する前に風の強さや向きを確認し、適正な散布圧力や風量で住宅や周辺作物等への飛散防止に努めている。  | 随時            | 全生産者   |                   |                   | ・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。   |
|      | 20 | 農薬散布前後には、防除器具を十分に洗浄し、破損箇所がないか点検している。                   | 随時            | 全生産者   | ☑                 |                   | ・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。   |

※チェック項目全てを達成することが目的ですが、現段階において出来ていない項目には、チェック☑をしないでください。  
 ※チェックシートを点検することで、翌年度の生産に向けて改善点を見つけることも大きな目的のひとつです。  
 ※今年出来なかったことを、翌年度には実行、改善するように心がけてください。  
 ※チェック欄については、自己点検は生産者で行い、JAの営農指導員等が二重点検を行うなどして活用ください。  
 二重点検を行うことで、より正確に改善点を見つけることができます。

※実際のチェック項目は1～37まであります。

◆ 稲の病気の種類 ◆



リゾープス菌 (白カビ)



トリコデルマ菌 (青カビ)



フザリウム菌 (赤カビ)



紋枯病



葉いもち



白葉枯病



穂いもち (枝梗いもち)



穂いもち (首いもち)



稲こうじ病

◆ 着色粒の種類 ◆



カメムシ (斑点米)




褐色米




腹黒米

◆ 害虫の種類 ◆



イネドロオイムシ



イネゾウムシ



イネミズゾウムシ



ニカメイチュウ



ツマグロヨコバイ



セジロウンカ



コブノメイガ



ホソハリカメムシ



トゲシラホシカメムシ



アカスジカスミカメ



アカヒゲホソミドリ  
カスミカメ

◆ 水田の主な雑草 ◆



ノビエ



キシウスズメノヒエ



ミスガヤツリ



ホタルイ



クログワイ



マツバイ



コナギ



アゼナ



ウリカワ



オモダカ



ヘラオモダカ



セリ



ヒルムシロ



イボクサ



浮草・藻類



③



④



⑤

## 葉色見本

# 黄化率割合と刈取り適期



# JA 金沢中央

- |        |               |                |   |               |                |
|--------|---------------|----------------|---|---------------|----------------|
| ● 鞍月支店 | 〈電話〉 237-6240 | 〈FAX〉 238-0006 | ● 地域サービスセンター  | 〈電話〉 268-6220 | 〈FAX〉 268-8170 |
| ● 大徳支店 | 267-1288      | 267-5253       | (営農・購買)   |               |                |
| ● 戸板支店 | 265-5148      | 224-5148       | ● 農機センター  | 268-6220      | 268-8170       |
| ● 二塚支店 | 249-3478      | 249-3458       |   |               |                |
| ● 三馬支店 | 242-7256      | 243-2350       | ● ホームページもご覧ください。  |               |                |
| ● 米丸支店 | 291-2215      | 291-2263       | <a href="http://www.is-ja.jp/c-kanazawa/">http://www.is-ja.jp/c-kanazawa/</a> |               |                |

営農テレホンサービス 291-1555