




葉色見本

黄化粉割合と刈取り適期



 JA金沢中央

- | | | | | | |
|--------|---------------|----------------|---|---------------|----------------|
| ● 鞍月支店 | 〈電話〉 237-6240 | 〈FAX〉 238-0006 | ● 地域事業課 | 〈電話〉 266-5220 | 〈FAX〉 268-8170 |
| ● 大徳支店 | 267-1288 | 267-5253 | ● 農機課 | 268-6220 | 266-5228 |
| ● 戸板支店 | 265-5148 | 224-5148 | ● アグリサポートセンター(宮農) | 266-5003 | 268-0444 |
| ● 二塚支店 | 249-3478 | 249-3458 | ● ホームページもご覧ください。
https://www.is-ja.jp/c-kanazawa/ | | |
| ● 三馬支店 | 242-7256 | 243-2350 | | | |
| ● 米丸支店 | 291-2215 | 291-2263 | | | |

...ね金沢

令和7年

金沢 営農ごよみ



高品質金沢産米づくり
JA金沢中央・金沢宮農協議会

生産者の皆様方には、この営農ごよみを活用していただき、高品質な金沢産の米づくりに励んで下さい。
尚、ご不明な点がございましたら、JAにご相談下さい。

目 次


○『高品質金沢産米づくり運動』について	1～4
○異物混入対策について	5
○水稻用除草剤の上手な使い方、選び方	6～13
○知っていますか？「RACコード」	14
○ヒ工対策特集 おすすめ除草体系	15
○藻類の対策について	16
○イナゴ対策について	17
○農作業安全対策について	18～19
○水稻初期除草剤の使用時期に注意してください	20～21
○野焼きは法律で禁止されています	22
○道路の泥汚れ防止について	23
○「農将軍フロアブル」から「メテオフロアブル」への切替のご案内	24
○Jコート入り一発肥料「NEOシリーズ」について	25
○コシヒカリ一発肥料の選定にあたって	26
○高温障害対策特集	27～29
○〈営農情報〉気象変動に左右されない米づくりをめざして	30～31
○水稻肥料銘柄一覧	32
○水田畦畔等除草剤の使用について	33
○水稻防除剤の登録内容（令和6年10月登録現在）	34～35
○本田除草剤の登録内容（令和6年10月登録現在）	36～37
○ゆめみづほ栽培ごよみ	38～39
○コシヒカリ栽培ごよみ	40～41
○雑草防除基準・病害虫基幹防除基準	42～43
○3月の作業（は種）	44～45
○4月の作業（育苗、荒起し・代かき、基肥施用）	46～49
○5月の作業（田植え、除草剤散布）	50～51
○6月の作業（中干し、溝切り、中間追肥施用）	52～53
○7月の作業（穗肥施用、基幹防除）	54～57
○8月の作業（水管理、適期刈取り）	58～59
○9月の作業（乾燥、粉すり、出荷）	60～63
○10月の作業（土づくり）	64～65
○農地の有効利用を応援します	66
○JAが提案する今後の稻作省力体系	67
○BB肥料側条基肥開度目安表	68～75
○農作業の工程管理（自己点検）に取り組もう	78～82
○令和7年産 水稻生産履歴記録簿	83～90
○稻の病気の種類・着色粒の種類	91
○稻の害虫の種類	92
○水田の主な雑草	93



整粒歩合 80%
以上の良質米



登熟不良による
乳白粒



カメムシによる
斑点米

高品質金沢産米づくり運動

基 本 目 標

- 1等比率 90%以上
- 整粒歩合 80%以上
- コシヒカリ 玄米タンパク含有率 6.5%以下
- ゆめみづほ 玄米タンパク含有率 7.0%以下
- 乳白粒 3%以下
- 脳割粒 2%以下
- 着色粒 (斑点米) 0

重 点 事 項

- 着色粒（カメムシ斑点米）発生防止
- 乳白粒発生防止
- 脳割粒発生防止

令和7年度「高品質金沢産米づくり運動」実施事項

- 斑点米、乳白粒、脳割粒の発生防止をめざして
- 「10の推進技術」の実施
- 「6つの1か月対策」の徹底
- 土壤分析に基づく土づくり、深耕の実施



高品質金沢産

(10の推進技術)・(6つの1か月対策)・(総合的な土づくり)

1

10の推進技術って……なに？

お米の品質を落とす主な要因には、①米粒が白濁する乳白粒、②米粒に亀裂が入る胴割粒、③カメムシによる斑点米があげられます。

それらの発生を抑え、きれいなお米に育てあげるために必要な技術がいくつもあります。

うま・きれ+1運動では、10の技術の実践を推進し、高品質なお米の生産を目指しています。

下の表で、1つずつ確認してみてください。たぶん、日頃からみなさんが実践されている技術ばかりのはずです。

つまり、10の推進技術とは、もはや当たり前とも言える「基本技術」であり、みんなで継続して徹底することで、高品質な金沢産米を安定して食卓へ届けるために必要な技術です。



[乳白粒]



[胴割粒]



[斑点米]

米づくり運動

を実践し、おいしくきれいな金沢産米を食卓へ届けよう

2

6つの1か月対策って……なに？

「水稻」は「水の稻」と書くとおり、お米の生産にとって水は最も重要な要素であり欠かすことのできないものです。その水は、みなさんがご存知のとおり、上手に活用することで、お米の食味・品質・収穫は安定します。


6つの1か月対策とは、お米の生育期間中の水管理を中心とした管理対策を、1か月ごとに区切りシンプルに整理したもので、うま・きれ+1運動の大きな技術柱の1つとなっています。

本対策も、10の推進技術と同様で、必要な「基本技術」であり、本年産から「6つの1か月」を意識し、対策を実践していきましょう。



6つの1か月対策のポイント

- 【1】刈取り後1か月以内を目安とした土づくり（秋起こし）
- 【2】育苗日数は、1か月以内（20～25日間）
- 【3】中干し開始は、田植え1か月後
- 【4】中干し期間は、1か月間（コシヒカリ）
- 【5】中干し後から出穂までは、約1か月間（コシヒカリ）の飽水管理
- 【6】出穂から刈取り直前までの1か月以上は、①乾かさない・②ずっと溜めない・③すぐ落とさない




3

総合的な土づくりの実践

土づくりに必要なリン酸・ケイ酸・腐植が不足し、更に夏の高温による品質低下や倒伏などによる収量減少が増えてきております。まずは、基本の土づくりをしっかりと行い、稲体を強くしましょう。

詳細については、別冊4～9ページをご確認ください。



米の食味について

ご飯の食味は、粘り・硬さのような物理的因素や、香り・うま味などの化学成分に支配されている。物理的因素は、米の食味に対し7~8割も寄与している。

粘りは、主にデンプンを構成しているアミロースとアミロペクチンが関係しており、アミロースの含有率が高くなると粘りが弱くなつて食味が劣る。

硬さはタンパク質と関係しており、タンパク質含有率が高い米は、ご飯が硬く、粘りが弱くなつて食味が劣る。

食味値について

	食味との関係	主な変動要因
タンパク質	高いと食味低下	窒素の施用量、施用時期など
アミロース	低いと食味よい	品種特性、登熟温度など
水分	低いと食味低下	乾燥調製など
脂肪酸	低いと食味よい	貯蔵中の温度、湿度など

良食味生産のポイント!

基本技術を励行し、健康なイネを栽培し、稔りをよくすることが重要である。適期作業、適正施肥、適正な防除の実施が良質米生産へつながる。

玄米タンパク質 低下対策

〈目標〉 コシヒカリ6.5%以下 ゆめみづほ7.0%以下

○生育・地力に応じた穂肥の施用

地力が低く、登熟後半に凋落しやすい地帯では緩効性肥料（穂肥一発肥料、有機入り等）を活用する。

土づくり

有機物、土壤改良剤を施し、保肥力の高い土壤をつくる。
作土深15cmを目標に耕深を確保する。

水 管 理

適期に中干し、溝切りを実施する。
出穂後は飽水管理で根の活力を維持する。

収 穫

適期収穫に努める。
〈糊黄化率目安〉 高温年85%・平年90%

異物混入対策について(注意)

近年、消費者・実需者のお米の安全・安心に対する要望は年々高まっており、特に異物混入に対してはとても敏感になっています。悪気がない場合であっても、大きな問題に発展する恐れがあります。

玄米に混入する異物としては、駆除剤・異品種の米・小石・草の種・ワラくず・ゴミ等であり、農機具の使用前や品種の変更時に十分な清掃で混入防止対策をお願い致します。このような事故が発生しないよう、**納屋や作業場所のネズミ対策には、駆除剤を使用しない**ようお願いします。

ネズミが住み着く理由は、エサとなる米粒などが残っていることが原因です。このため、**掃除を徹底的に行うこと**が一番の対策になりますが、どうしても侵入を防ぐことが出来ない場合は、**粘着シート**など異物混入の危険が少ないものを利用下さいますようお願いいたします。

水稻用除草剤の上手な使い方、選び方

管理のポイント

- ① ていねいな代かきは、除草効果を引き出す第一歩
- ② あぜの管理で漏水防止
- ③ 稲は適正に植え付け、薬害を避けましょう
- ④ 水管理は除草剤の効果安定のキーポイント
- ⑤ 除草体系を見直してみましょう
- ⑥ 薬剤の散布時にはしっかり水を入れましょう
- ⑦ 代かきから田植えまでの期間を短くしましょう
- ⑧ 除草剤を選定する際のポイント

ポイント1 ていねいな代かきは、除草効果を引き出す第一歩!

●代かきが ていねいでないと…
田んぼが均平にならず、田面が水から出ます。そうすると、薬剤の処理層ができずに草が生えることにつながります。

碎土が粗いと…
効果ムラが生じます。

- 処理層が不均一(効果ムラ)
- 間隙(かんげき)から深層に水が流れる

碎土が細かいと…
薬剤のもつ残効期間がフルに発揮されます。

- 処理層が均一になりやすい
- 深層浸透を抑える

ていねいな代かきは、均一で安定した処理層をつくります。


田んぼの均平化を心がけましょう。

代かきは雑草を埋め込むだけではありません。代かきで田面が均一になると、除草剤の処理層も均一になります。また、代かきがていねいだと水持ちが良くなるので、除草剤の残効も期待できます。

ポイント
2

あぜの管理で漏水防止!

田んぼの水が田んぼの外に流れ出ると、除草剤の効果も低下します。あぜはモグラ等の穴や崩れがないようにしっかりと整備し、あぜ波板や畦畔シートなどを使って漏水を防ぎましょう。



ポイント
3

稻は適正に植え付け、薬害を避けましょう!

移植深度3cmを確保しましょう。



薬害の起こりやすい条件


- ① 砂質土壤・漏水田・植穴の戻りの悪いほ場・軟弱苗の植え付け。
- ② 除草剤処理後の高温、未熟有機質の発酵によるワキ。
- ③ 極端な浅植え、浮き苗、浅水管理、入水の遅れ(田植同時)。
- ④ 除草剤散布後の補植。
- ⑤ 敷布量、使用時期の間違い。
- ⑥ 藻等の発生や浅水条件での除草剤散布。

ポイント
4

水管理は除草剤の効果安定のキーポイント!


田植え時期に使用する初期剤や初中期一発剤と呼ばれる除草剤は、土壤表面に**処理層**をつくり、雑草の発生を抑えます。

●水稻除草剤の効果の仕組み



処理層をしっかり作るための水管理 (注意点)

- ① 除草剤がよく拡散するように、十分な湛水状態にしてください。
- ② 除草剤散布後3~4日間は通常の湛水状態を保ってください。
- ③ 敷設後7日間は落水・かけ流しをしないでください。
- ④ 除草剤散布後は田んぼに入らないでください。散布後の補植はしないでください(除草剤散布前に済ませる)。
- ⑤ 水持ちが悪い場合はやむを得ず入水する場合はなるべく静かに入水してください。



散布後、処理層が形成・安定するまで約3日間かかります。この間の急激な入水・落水は効果の低下に直結します。


3日間は湛水を保つことを心がけ、7日間の止水管理を守りましょう。



除草剤散布後の止水管理(水田水がなくなるまで給水しない)

除草剤を処理した後7日間は水田水が水田外に出ないように排水口を止め、水田水がなくなるまでの期間は給水も止める方法です。

●止水管理の模式図




この止水管理を行なうにあたって

- ① 畦畔を水漏れがないように整備する。
- ② 田面の露出がないように水を溜める。
- ③ 排水口を水漏れないようにふさぎ、給水口を止める。

注意点


- 以下の場合は適宜給水して湛水に努めてください。ただし、オーバーフローしないように注意が必要です。
 - ①低温対策等、栽培上湛水が必要な場合
 - ②処理翌日に田面が露出するような漏水田
- 田面が露出後ひび割れるような場合は給水する(オーバーフローに注意)。

右図のとおり、散布後数日(7日後まで)は除草剤成分が水中をただよっています。その間に水田水をオーバーフローしたりかけ流すと除草剤成分を流すことになるため、除草剤の効果を十分に発揮することができません。止水板を高めに設置するなどの準備してから除草剤を散布しましょう。



(財)日本植物調節剤研究会試験圃場における測定結果

水持ちが悪い田んぼでは?



いつも水口周辺に雑草が残ってしまうのはなぜ?


水口周辺は、水の動きにより処理層がなくなりやすく、除草剤の効果がなくなってから雑草が発生しやすいです。



ポイント
5

除草体系を見直してみましょう!

水稻除草剤は使用するタイミングによって、除草効果に差が出やすいです。特に、長期発生する雑草にお困りの方は、下記を参考に除草体系を見直してみましょう。



①一発処理(田植直後・田植同時)

メリット

散布時期を逸すことなく、初期の雑草を防除しやすい。田植同時散布が可能であれば、最も省力に散布することができる。

デメリット

発生期間の長い多年生雑草や後発のヒエを取りこぼす可能性が高く、中後期除草剤の散布が必要になる場合がある。結果的に薬剤コストが高くなってしまう。

次ページの除草方法がおすすめ

②一発処理(後まき) 除草剤の散布時期を、田植え後3~5日後にする

メリット

稻の活着がすすんでおり、植穴も埋まっているので薬害が発生しにくい。十分な湛水状態を確保できる。水田水の濁りが少なく、泥も落ち着いている。

除草剤の処理層がしっかりと作れるため、除草効果が長く続く

デメリット

初中期一発剤の散布時期を逸すると、雑草が大きくなりすぎるため、十分な除草効果を得られない(取りこぼす)。散布の労力が必要。

ジャンボ剤や豆つぶ剤、フロアブル剤は、動力散布機を使用しなくても、畦畔からの散布のみで処理可能です。

③体系処理 初期剤(田植え同時可)+初中期一発剤

メリット

初期剤の抑草効果がプラスされるため、上記②の抑草期間よりさらに長い効果が期待できる。

デメリット

初中期一発剤散布の労力が必要。追加で初期剤を使用するため、薬剤コストが高くなる。

●高価な中後期剤の散布割合を減らす(薬剤費、労賃の軽減)。
●収穫前の雑草抜き取り作業の軽減(労賃の軽減)。
●水田内カメムシの発生減少、稻の生育良好(収量、品質向上)。

ポイント
6

薬剤の散布時にはしっかり水を入れましょう!

除草剤散布前～散布時の水管理

- 除草剤散布時に田面が露出しないようにたっぷり湛水しましょう。
- 畦畔からの水漏れをチェックしましょう。
- 散布前にもう一度、水口・水尻をチェックしましょう。
- 減水深が2cm/日以上の漏水田では除草効果が落ちます。



ポイント
7

代かきから田植えまでの期間を短くしましょう!

雑草は、代かき直後から動き出します。代かきから田植えまでの期間が長いと、その間に雑草が生長しますので、除草剤の散布遅れにならないように注意してください。

田植日が同じでも代かき日が早いと雑草の生育が早まります

代かき日	田植日	ノビエ2.5葉期に達する日		田植後日数
		代かき後日数	田植後日数	
4/26	5/5	5/16	20日	11日
4/29		5/18	19日	13日
5/ 2		5/20	18日	15日


(注)金沢アメダスデータ、平年平均気温による推定

気温が高い年は、雑草の生育が早まります

区分	代かき日	ノビエ2.5葉期に達する日		代かき後日数
		代かき後日数	田植後日数	
平年		5/20	18日	
暑い年(H10)	5/2	5/17	15日	
寒い年(H8)		5/25	23日	

(注)金沢アメダスデータ、平年平均気温による推定

上記にあるようにノビエの生長は早いので注意が必要です。また、3葉以上になると1葉が枯れ始めるため葉齢を間違わないように注意してください。



ポイント
8

除草剤を選定する際のポイント

無くしたい雑草にターゲットを絞り、目的を達成したら剤を変更しましょう。
(初中期一発剤はヒエの残効の高いものを選定しています)



ヒエ

初中期一発剤／エンペラー、バッチャリ、アシュラ
中後期剤／ヒエクリーン、レプラス、ワイドパワー



前年のヒエ発生が多い場合は、翌年の発生量も多くなります。少しでもヒエの取りこぼし(後発)が見えたら中後期除草剤を散布しましょう。また、ヒエクリーンは残効性があるため、ヒエの発生前の散布でも効果があります。ヒエが見えなくとも、中干し後に散布すると、抑草効果が期待できます。4葉以上のヒエが見えたならクリンチャー1キロ粒剤(1.5kg/10a)を、5葉以上の場合はクリンチャーニューエフ(1.5kg/10a)の散布をお奨めします。



ホタルイ

初中期一発剤／ベンケイ、エンペラー、バッチャリ、アシュラ
中後期剤／レプラス、バサグラン、アトカラSジャンボ MX

※ホタルイは種の寿命が長いため、単年の結果で判断しない



オモダカ・クログワイ

初中期一発剤／ベンケイ、エンペラー、バッチャリ、アシュラ
中後期剤／アトリ、レプラス、バサグラン

※刈跡の除草を行うと効果的に減らすことができる



コナギ

初中期一発剤／ベンケイ、エンペラー、バッチャリ、アシュラ
中後期剤／レプラス、バサグラン、ワイドパワー


※ハート型の葉が出る前に対策する



クサネム

初中期一発剤／バッチャリ、ベンケイ、アシュラ
中後期剤／レプラス、ノミニー、アトカラSジャンボ MX

※畦畔近くからの発生が多いため、畦畔防除との合わせ技が効果的



イボクサ

初中期一発剤／ベンケイ、エンペラー、アシュラ
中後期剤／レプラス、ノミニー、アトカラSジャンボ MX

※畦畔近くからの発生が多いため、畦畔防除との合わせ技が効果的

知っていますか?「RACコード」

1 RACコードとは?

RACコードとは、世界的な農薬製造会社の国際団体が定めた農薬の分類コードの事で、同じ作用性の農薬グループを一つにまとめて、それぞれの農薬にコード番号を付しています。

殺虫剤は「IRAC」、殺菌剤は「FRAC」、除草剤は「HRAC」といいます。

RACコードは、製品ラベルやチラシなどに表示されています(※)。農業工業会のHP等でも確認することができます。また、金沢営農ごよみ本冊P22~23「本田除草剤の登録内容」にもHRACコードが記載されています。

*すべての製品ラベルやチラシにRACコードが記載されているわけではありません。



👉 製品ラベルへの
RACコード記載例

2 RACコードを活用したローテーション防除

農薬を繰り返し使い続ければ、正しく使っているはずなのに薬剤が効かなくなったり感じることはありますか?その原因は薬剤抵抗性・耐性が原因かもしれません。

同一銘柄や同じ効き方(作用性)の農薬を使い続けることにより、効果の高い農薬を散布しても生き残る害虫が現れ、被害を防げなくなることがあります。これを薬剤抵抗性がついたと言います。殺虫剤だけでなく、殺菌剤でも同じ作用性の薬剤を何度も使用すると、耐性菌の発達を促し農薬の効果が低下します。

対策として「ローテーション防除」をお奨めしますが、単に別銘柄の農薬に変更する・別成分が含まれている農薬に変更するだけでは、同じ作用性の農薬を選んでしまい、連用散布となってしまう場合があります。

そうならないためにも、RACコードにより農薬の作用性を確認し、異なる作用性の農薬を選び、正しいローテーション防除を行いましょう!



HRACコード: 1



HRACコード: 1



HRACコード: 1



HRACコード: 2

ヒ工対策
特集

おすすめ除草体系

[初期剤(田植同時可)+初中期一発剤+中後期剤]

メリット

初期剤の抑草効果がプラスされるため、
一発処理より長期間抑草効果が得られる

- 5月の水温・気温が低い場合は、後発ヒ工に注意!!
一発剤での処理ができない可能性も高いため、ヒエクリーン等の中後期剤を活用!!

初期剤

ソルネット 1キロ粒剤

一発剤

バッチリ 1キロ粒剤 ベンケイ 1キロ粒剤

中後期剤

ヒエクリーン 1キロ粒剤

ヒ工に対し優れた効果を発揮する中後期剤。豆つぶ剤での省力散布が可能。移植後15日からノビ工4葉期までの散布でノビ工を抑草できます。成分特性上長期間ゆっくりノビ工の発生を抑えます。

収穫までに除草できなかつた場合

—秋作業で雑草を減らそう—

○石灰類の効果

- ①石灰窒素はノビ工の休眠を覚醒させる効果があります。
- ②稻刈後、できるだけ早く石灰窒素を全面散布することで、地表に落ちているノビ工種子の休眠が覚醒され発芽し、冬の寒さで枯死します。
- ③発芽には18℃以上の高温が15日ぐらいと発芽できる土壌水分が必要です。秋に発芽しなかった場合は、春先、田植え前に一斉に発芽しますのでこの時にすき込みます。



・使用方法: 10aあたり40kg施用

・注意点: ①散布してから1か月後に田起こしを行ってください。

②窒素成分が含まれるので、翌春の基肥量を2割程度減らしてください。

○「プリグロックスL」の散布

- 刈取後に発生するヒ工の除草と、薬液を直接種子に付着させることで発芽を抑えます。
毎年散布することで雑草の発生量を低減できます。



・使用方法: 10aあたり100倍希釈を150リットル散布してください。


・注意点: 秋起こしする前に散布する必要があります。



〈近年、藻の発生が目立つようになっていませんか!?〉


田植後に晴天が続き、水温が20℃前後になると、基肥と稻わらや堆肥などの有機物が微生物により分解され、水田の水は窒素やリン酸が豊富となり藻類・表層はく離が発生します。

アミミドロ▶




みかん袋のような
五~六角形の網状
1~30cmの大型藻類

◀アオミドロ



触るとぬるぬる滑る
根元から先まで
均一の太さ



◀表層はく離

土壌粒子と藻類が
絡まって膜ができる

被害例



稻のなぎ倒し

ジャンボ剤の
拡散不良

多発すると。。。

- ・水温の低下を伴い、稻の生育を遅延
- ・風により稻苗のなぎ倒しなどの被害が発生
- ・ジャンボ剤などの高拡散製剤の拡散を妨害

⇒ 発生前の防除を!

〈藻類の対策方法〉

発生前

1. 初期除草剤「先陣」の使用

ジメタメトリン、ピラクロニルの2成分が藻類の発生を抑えます。

藻類発生前の使用をおすすめします。

2. 水の入れ替え

藻類が発生し始めると、水面に薄い膜のようなものができます。この段階で水を入れ替えることで、藻類の発生をリセットします。



発生後

1. 専用除草剤「モゲトン」の使用

藻類の光合成を阻害し、枯らします。

快晴の日の朝の散布が最も効果的です。

2. 田面を干す

落水して2~3日軽く田面を干すことで藻類を枯らします。ガス湧きが多いほ場では、ガス抜き効果も得られます。



<近年、水田周辺でイナゴの発生が目立つようになっていませんか!?>

イナゴ対策

◆イナゴは幼虫・成虫ともに葉を食害し、幼虫時は下位葉を主に食害、大きくなるにつれて上位の葉に移行し食害量が多くなります。

◆出穂後に、止葉や次葉の食害が多くなると登熟歩合や千粒重が低下して減収します。また、腹白粒など未熟粒と死米が増加し整粒歩合が低下します。




コバネイナゴ



食害された稲の葉

イナゴの一生

4月~6月



畠畔等で越冬した卵が、春になってふ化します。ふ化の期間が長いため、だらだらと発生します。

6月~7月



幼虫が水田内に侵入し稻を食害し始めます。発生が多く、止葉を食害されると収量にも影響します。

7月~9月



成長したイナゴは、食欲が旺盛で、発生量が多いと被害が大きくなります。産卵は9月上旬頃から始まり、雑草の多い農道や畠畔地際部に産されます。

対策① 育苗箱施薬

Dr.オリゼリディア粒剤を苗箱処理するとほ場へのイナゴ侵入初期に効果を発揮します。

※紋枯病も発生する場合はヨーバルプライムEV箱粒剤を使用。

対策② 本田防除

水稻生育時期にイナゴが発生した場合

トレボン粉剤DLを10aあたり3~4kg散布します。発生初期(6月中旬~7月上旬)の散布が効果的です。

ここで叩くのが
効果的!



ほ場内のイナゴ
の増加を抑え、
被害を防ぎます

農作業安全対策について

主な農作業事故の発生状況と対策

①トラクターが転倒・転落し、投げ出されて機体の下敷きになった。



乗用トラクターによる事故の実態



乗用トラクターの死亡原因
平成26年に発生した農作業死亡事故のうち、乗用トラクターによる死亡事故が27%を占めています。そのうち、8割近くが、ほ場や道路からの転倒・転落によるものです。

安全キャブ・フレームのあるトラクターを使用し、シートベルト着用を徹底する



作業環境を確認し、危険性に配慮する



作業が終わったら、昇降路を上がる前にブレーキの連結ロックをする



②草刈りしていたところ、足を滑らせて草刈り機で足を切った。



安定な姿勢を保って作業できるよう、作業前に点検し、準備をしておく



ヘルメット、フェイスガード、安全靴、機械の安全カバーなどの防護を徹底する



刈払機事故の4つの特徴

1 斜面・法面での不安定な姿勢による事故 (29.5%)

- 傾斜地・法面は滑りやすい
- ⇒小段の設置、スパイク靴の着用

3 詰まりなどの除去時の事故 (18.2%)

- 回転を止めず、草の詰まりなどを除こうとして
- ⇒確実にエンジンを切ってから

2 回転刃による事故 (接触、飛散物) (29.5%)

- キックバックや小石、チップの飛散
- ⇒防護の徹底、飛散物カバーを外さない

4 周辺環境に起因する事故 (15.9%)

- 草むらの中に潜む杭や空き缶など
- ⇒慣れた場所でも事前確認

3~5月は春の農作業安全確認運動、9~10月は秋の農作業安全確認運動です。下の事例を参考に農作業安全の対策を行って下さい。

③コンバインで手こぎ作業を行っていたところ、手が巻き込まれた。



緊急停止装置のついた機械を使用し、停止ボタンの位置などを確認しておく



適切な服装で作業し、機体の中に手を入れないようにする



ほ場の出入り口の整備を行う。また、進入退出路をバックで走行させるときは、補助者による誘導や確認を行う。

コンバイン事故の4つの特徴

1 移動・走行中の事故 (34.7%)

- 後退時に確認不足で
- ⇒補助者による誘導、合図の確認

2 作業中の詰まり除去時の事故 (20.4%)

- 機械を止めずに詰まり除去
- ⇒エンジン停止の徹底

3 点検・整備中の事故 (16.8%)

- 回転部への注油、詰まり除去で
- ⇒作業手順の順守

4 手こぎ作業の際の事故 (14.3%)

- 衣服がチェーンに引っ掛かり
- ⇒作業に適した服装の徹底

その他にも、農作業中には次のような事故が発生しています。

熱中症



夏に屋外で農作業をしていて、熱中症になった。

暑いときの作業

- ・作業時は定期的に日陰で休む。
- ・のどが渇いていなくても、定期的に水分補給をする。

大風・豪雨のとき



増水時に田の見回りに行って、水路に転落した。

※事故割合は日本農村医学会資料より引用

※画像は環境省、(国研)農研機構、農水省HPより引用

農家の皆さんへ

農薬散布後の止水期間は

7 日間！

水田用除草剤や本田粒剤の
散布後7日間は落水やかけ流しをしない！

7日間は
かけ流しを
しない！

畦からの
漏水にも
注意する！

7日間は
落水
しない！

効果の安定・環境への影響軽減のために、
移植前の散布でも、必ず7日間止水しましょう。

JAグループ 全農

農薬工業会

水稻初期除草剤の使用時期に注意してください

水稻除草剤の移植前・播種前の使用時期が変更となりました。

移植前・播種前の使用は「7日前まで」です

適用内容変更後
移植栽培の使用時期は
植代後～移植7日前まで
植代時（移植7日前まで）

直播栽培の使用時期は
直播の代かき後～は種7日前まで
直播の代かき時（は種7日前まで）

移植前や播種前に農薬を使用する場合は、
7日前までに行いましょう



水稻除草剤の移植前、播種前の使用時期が登録変更されました（平成24年8月）

水稻初期除草剤の使用時期は、これまで「植代後(時)～移植4日前まで」「代かき後(時)～播種4日前まで」の適用がありました。これからは、移植や播種の前に使用する場合は、移植又は播種の「7日前まで」の使用となります。移植または播種の前日～6日前の間は、農薬は使用できません。誤って使用した場合は農薬取締法の違反であり、罰則の対象となりますので必ず守ってください。

農薬の使用時期を守り、農薬散布後の止水管理を徹底します

水田での除草剤や粒剤を散布した後は、農薬が土壤などに落ち着くまでの7日間は、田面水を圃場外に出さない水管理を徹底してください。

7日間の止水管理は、農薬の効果を十分発揮させるとともに、周辺環境の保全に繋がります。



農家の皆様へ

「野焼き」は原則として法律で禁止されています

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

農作物の残さは、なるべく焼却せずに、堆肥にするなど、土づくりに有効活用しましょう。

ただし、農林業を営むために、やむを得ないものとして行われる焼却については、法律の例外として認められています。

節度を守り、必要最小限の範囲で行ってください。

ごみ減量推進課まで
ご確認ください。

やむを得ない場合、焼却が認められているもの

(例) 「稻わら」「穀殻」「剪定枝」「いもの蔓」などの農作物の残さ

※ ほ場内で発生し、燃やすゴミとして搬出することが困難なもの。

いかなる場合でも、焼却してはいけないもの

(例) 「ビニール」や「支柱」などの農業用資材

やむを得ず焼却する場合は、次のことを必ず 守ってください。

- 近くの住民に迷惑がかからないよう、時間帯や風向きなどに配慮してください。
- 焼却している間は、火の側から離れないでください。
- 焼却できるものは、あくまでも法律の例外として認められたものに限ります。
ビニールや生活ゴミ等は、絶対に焼却しないでください。
- 法律の例外として認められているものであっても、万が一、近隣の住民等から苦情が発生した場合は、すみやかに焼却を止めてください。

火災との誤解を避けるため、焼却する前には必ず、最寄りの消防署(出張所)とごみ減量推進課へ、電話連絡(火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為の届出)をしてください。

(例)「今から、○○(場所)で、△時間、□□を焼却します。」

なお、近隣の住民等から消防署へ通報があった場合には、消防車が出動する場合があります。

農家の皆様へ

道路の泥汚れ防止に ご協力ください

道路に落ちた大きな泥や土のかたまりは、歩行者や車両の通行に支障をきたし、地域住民の迷惑になるうえ、交通事故の原因にもなるため大変危険です。



農作業後に公道に出る際は泥を落としていただくよう、
ご協力をお願いします。

「農將軍フロアブル」から 「メテオフロアブル」への 切替えを推奨

「農將軍フロアブル」について、メーカーの生産終了に伴い、誠に勝手ながら**在庫が無くなり次第販売終了**とさせて頂きます。

永らくご使用頂きました皆様に心より感謝申し上げます。

なお、今後の漏生糲対策には、「メテオフロアブル」をご利用ください。



農將軍
フロアブル



メテオ
フロアブル

Jコート入り一発肥料 「NEOシリーズ」好評販売中!!

新規原料「Jコート」を使用!

- 1 被膜の崩壊性を高め、ほ場外への流出を今までよりも抑えられる環境に配慮した被覆肥料です。



軽微な力で
崩壊



- 2 従来の一発肥料に比べ10a当たりのコストが低減!
含有成分を見直すことで、コスト減を実現しました!

(早生用)

BB 早生一発くんNEO

(ネオ)

N-P-K
28-7-9

基準施肥量 40~50kg




(コシヒカリ用)

BB コシ一発くんNEO β

(ネオ ベータ)


N-P-K
25-8-10

基準施肥量 35~40kg



コシヒカリー発肥料の選定にあたって

環境に配慮した新肥料



BB コシ一発くん NEO β

N-P-K
25-8-10

従来と比べて殻の崩壊性が高い被覆肥料を配合しているため、殻のほ場外への流出の軽減に役立つ、穂肥重点型の肥料です。

施肥量
側条施肥：35～40kg/10a
全層施肥：45kg/10a

追加穗肥の省力化に



BB コシ一発くんDX24

N-P-K
24-14-10

地力低下や近年の異常高温により、生育後半の窒素が不足し、登熟が不十分なほ場、追加穗肥でもう少し収量を取りたいほ場にお勧め。

施肥量
側条施肥：35～40kg/10a
全層施肥：45kg/10a

バランスの良い定番肥料



BB 新コシ一発くん 特号

N-P-K
20-17-10

有機入りコシ一発くんと比べ、チッソ含量は同じですが、基肥を減らし、穂肥を増やした肥料です。

施肥量
側条施肥：35～40kg/10a
全層施肥：45kg/10a

高温障害対策特集

今年は夏に高温が続いた影響で、乳白米の多発などにより県下全体で米の品質が低下しました。

乳白米(粒)が多く混入した米は等級が低下して米の買取価格が安くなり、生産農家の所得に深刻なダメージを与えます。


地球温暖化の影響により今後も高温年となる可能性がありますので、しっかり対策を行いましょう。



乳白米発生の原因と対策

出穂から出穂後15日の夜温が高い場合に乳白米が発生しやすいことがわかっています。

<高温条件と乳白米発生との関係>



このような条件を回避、または乳白米発生を軽減するための対策は以下の通りです。

○作付での対策

高夜温になりやすい時期に出穂後の時期が重ならないよう、田植え時期をずらすことが効果的です。

○耕種的対策


単位面積あたりのもみ数が多いと乳白米が発生しやすくなります。過剰なもみ数抑制のための栽培が必要です。

対策 ①植付け本数の抑制
②最高分けつ期までの窒素の適量・適期施肥（過繁茂にしない）

○栄養的対策

高夜温条件では水稻の養分吸収が悪くなります。また、根痛みやもみの過乾燥を防ぐ丈夫な稲体づくりが大切です。

対策 ①カリ、ケイ酸などを十分に施用する（丈夫な稲体づくり）
②追加穗肥の施用



高温障害に強い稻づくりに効果的な「けい酸加里プレミア」

○「けい酸加里プレミア」でケイ酸とカリを補給

水稻は夜温が高い場合、カリ、次いでケイ酸の吸収が悪くなります。ケイ酸とカリの十分な施用が丈夫な稻体づくりに不可欠です。

「けい酸加里プレミア」は効果の高いケイ酸とカリを同時に施肥でき効果的です。

○けい酸加里の乳白米軽減効果


けい酸加里は根の発育を促進し活力を維持するため、高温条件に耐える健全な稻体をつくります。

①けい酸加里施用で高温に負けない根をつくる




「けい酸加里プレミア」の肥料成分

保証成分(%)			含有成分(%)		
く溶性 カリ	可溶性 けい酸	く溶性 苦土	く溶性 ほう素	石灰	鉄
20	34	4	0.1	7~12	2~5




けい酸加里施用によって根量が増え、根の活性も高まります。

②ケイ酸施用でイネの葉の温度が下がる(クーラー効果)



ケイ酸施用によって根の活性が高まり、蒸散が多くなるため、イネの葉の温度が高くなるのを防ぎます。

○けい酸加里施用により乳白米の発生が軽減されました。



○「けい酸加里プレミア」の施用で高温障害に強い稻をつくりましょう。

高温登熟条件下の玄米外観品質におよぼすケイ酸質肥料の効果
(金田:秋田県立大 2012 グリーンレポートNo.511一部改編)

玄米の品質を落とす種類と発生要因とその対策


種類	発生要因		軽減対策
	気象面	生育・管理面	
白未熟粒	乳心白粒 	胚乳部中心が白色不透明なもの ・出穗後~20日間の高温(27°C以上)急激な穀成熟でデンプンの供給がおいつかず、部分的にデンプンが不足して発生する ・主に日照不足で発生助長 ・登熟中期のフェーン ・高夜温	・粒数過多・倒伏 ・弱勢穎花での発生が多い→養分競合 ・幼穂形成期の稻体窒素濃度が低い(葉色低下)と増加 ・胚乳細胞の過大と養分蓄積不足 ・出穗後~20日間の葉色が淡くなる
	腹白粒 	米粒の腹部が白色不透明なもの ・登熟中期の高温・低温ではほとんど発生しない	・登熟期間の稻体の活力低下(出穗前後~成熟期までの水不足、生育後半の栄養不足) ・登熟期間の葉色が淡いと多発 ・登熟後期のデンプン蓄積不良→ソース(茎葉)能力やシンク(玄米)能力の調落
	背白粒 	米粒の背部が白色不透明なもの ・登熟中後期の高温27°C以上で多発 ・低温ではほとんど発生しない	
	基部未熟粒 	米粒の基部が白色不透明なもの ・登熟後期の高温27°C以上で多発 ・背白粒よりさらに後半のデンプン蓄積不良 ・低温でも発生する	
	その他未熟粒 	充実の不十分な粒。扁平で厚みが薄い、縦溝が深いもの等 ・フェーン等による枝梗の枯れ上がり ・登熟期間の気温日較差が少ない過高温による登熟阻害	・中干しの不徹底 ・過剰な基肥等により、生育量が過剰 ・穂肥量の過不足 ・選別の不徹底 ・遅発分けづ過剰による生育のバラつき ・出穂のバラつきによる登熟がバラつき
被害粒	胴割粒 	米粒に亀裂が入っている等 ・出穗後10日間の高温(特に最高気温) ・登熟期間中の高温乾燥(フェーン等) ・出穗後30日~成熟期の多照 ・圃場で軽微に発生(立毛胴割)もある	・高温登熟時の水不足 ・早期の落水 ・刈遅れ
	着色粒 	カメムシ類による斑点米等 ・生育期間の気温が温暖に推移 ・登熟期間の高温 ・幼穂形成期の低温少日照(ふわれ発生)	・畦畔雑草でのカメムシ類の増殖 ・適期防除の不徹底 ・畦畔、農道等の雑草処理の不備
による アカヒゲ カスミ カヌメ トゲ クモ ヘリ カヌ ムシ シシ	頂部黒変 側部しみ状 側部斑紋状 側部斑紋状 鈎合部 鈎合部以外		・草刈りの徹底 ・出稻後適切なカメムシ防除 ・出穂期が高温の時期に当たらないよう田植を遅くして高温を回避

※表中に27°Cあるのは、平均気温である。

※穂中のデンプンの詰まる順序①中心部(登熟初期)→②腹側(登熟中期)→③背側(登熟後期)→④基部(登熟後期)

気象変動に左右されない米づくりをめざして!!

〈現状〉 ここ近年、7~8月の気象が平年と大幅にちがっている。



〈対策〉

- (1) 適切な水管理で健全な根づくりの実践→6月の中干し+収穫直前までの間断通水
- (2) 過剰な窒素施用を回避→穗肥時は葉色・草丈・茎数・幼穂長を確認
- (3) 秋季の土づくりの励行→ケイ酸+稻わらのすき込み(浅耕)
- (4) 春季の深耕による根域の確保→目標15cm

「土づくり」と「春季の深耕」が不足しています

(1) 深耕の効果確認: 春季の荒耕で深く耕すとどうなるのか?




●根量全体のボリューム・細根の量についても実証区が勝っている。深耕により根域拡大が図られた。

米づくりの基本である「土づくり」には、ケイ酸施用と春季の深耕が重要です。单年度で結果は見えにくいが、継続して取り組めば気象変動に左右されない米づくりが実現できます。

(2) ケイ酸効果の確認: ケイ酸をしっかり効かせたらどうなるのか?



●ケイ酸の効果で稻体が硬くなり、葉がぴんと立ち、受光態勢が良くなった。



●サーモグラフィーで撮影すると、実証区の方の温度が1~2度低かった。実証区の稻は、高温のストレスも少なく、体力の消耗も少ないとから、登熟向上が期待できる。

※葉温の違いを赤外線写真(サーモグラフィー)で撮影

けい酸加里入りの一発肥料を使ってみませんか

BB けい酸パワー・コシー発くん BB けい酸アップ・コシー発くん



N-P-K
10-15-12
苦土2
ケイ酸12

施肥量 70~80kg/10a



N-P-K
15-15-10
苦土1
ケイ酸12

施肥量 45~55kg/10a

水稻肥料銘柄一覧

区分	肥料名	規格	成 分 (%)					備 考
			N	P	K	有機	その他	
育苗期	稻10号	20kg	10	10	10			苗床・床土用肥料
	液肥10号	5kg 20kg	10 5	5	8			育苗期追肥
基肥	BB 有機入820号（みさと）	20kg	8	12	10	52	Mg1	JA金沢中央、有機含量の高い基本の基肥
	BB いしかわ有機入056号	20kg	10	25	16	18		コシヒカリ・早生どちらでも
	BB コシー発くんDX24	15kg	24	14	10		(N.基肥分8% 穂肥分16%)	追加穗肥不要のコシヒカリ一発肥料
	BB コシー発くんNEO β（ネオ ベータ）	15kg	25	8	10		(N.基肥分10.5% 穂肥分14.5%)	被覆尿素(Jコート)使用の一発肥料（穂肥不要）
	BB 新コシー発くん特号	15kg	20	17	10		(N.基肥分6.5% 穂肥分13.5%)	温暖化対策の一発肥料（穂肥不要）
	BB 有機入りコシー発くん	15kg	20	12	11	20	(N.基肥分9% 穂肥分11%)	金沢用に設計されたコシヒカリ一発肥料（穂肥不要）
	BB けい酸パワー・コシー発くん	15kg	10	15	12		Mg2 Si12	新コシー発くん特号にけい酸加里を加えたもので、中間追肥の省力が図れます。
	BB けい酸アップ・コシー発くん	15kg	15	15	10		Mg1 Si12	新コシー発くんにけい酸加里を加えたもので、中間追肥の省力が図れます。
	BB 早生一発くんDX28	15kg	28	13	9		(N.基肥分9.5% 穂肥分18.5%)	追加穗肥不要の早生一発肥料
	BB 早生一発くんNEO（ネオ）	15kg	28	7	9		(N.基肥分10.2% 穂肥分17.8%)	ゆめみづほ用に設計された、被覆尿素(Jコート)使用の一発肥料（穂肥不要）
中間追肥	BB スリム早生一発くん	15kg	24	10	10		(N.基肥分10% 穂肥分14%)	ゆめみづほ用に設計された、一発肥料（穂肥不要）
	BB PKけいさん	20kg		13	11		Mg4 Si17 B0.05	登熟促進、根張り促進、倒伏防止に、必ず施用しましょう。
	粒状草木加里	20kg		2	30	100	Mg3	登熟促進、根張り促進、倒伏防止に
穂肥	けい酸加里プレミア	20kg			20		Mg4 Si34	けい酸とカリを同時に補給することで、倒伏や高温障害に強くなります。
	BB 有機入り追肥526号	20kg	15	2	6	30	Mg1	JA金沢中央、基本の穂肥
土づくり	BB スーパーけい酸	20kg		3			Mg6 Si26 AL45	登熟促進、根張り促進、倒伏防止に、必ず施用しましょう。
	BB パワフル大地	20kg		12	5		Mg9 Si20 AL27	10a当たり60kg施用で堆肥150kg相当の効果が得られる省力土づくり肥料
	ケイカル（粒）	20kg					Mg5 Si30 AL45	ケイ酸補給で稻体を強化し倒伏防止、病害虫に対して強くなる
	ようりん（粒）	20kg		20			Mg12 Si20 AL45	健全な稻を育て多収の効果がある。まき易い粒状タイプ

※一発肥料は基本的に穂肥がいらないように設計されておりますが、高温年の場合は多少穂肥が必要になる場合があります。

※ 表示成分 N = 硝素 P = りん酸 K = カリ Mg = 苦土 Si = ケイ酸 B = ホウ素 AL = アルカリ 有機 = 有機含量

水田畦畔等の除草剤の使用

区分	薬剤名 (成分)	使用時期	10a当たり使用量		使用回数	
			薬量			
			一年生雑草	多年生雑草		
水田 畦畔	ラウンドアップマックスロード (グリホサート)	雑草生育期(収穫前日まで)	200～500ml	500～1000ml	通常散布50～100L 少量散布25～50L	
	グリホエキス液剤 (グリホサート)	雑草生育期:草丈30cm以下 (収穫14日前まで)	250～500ml	500～1000ml	50～100L	
	バスタ液剤 (グルホシネット)	雑草生育期:草丈30cm以下 (収穫7日前まで)	500～1000ml	500～1000ml	100～150L	
	ザクサ液剤 (グルホシネットP)	雑草生育期 (収穫7日前まで)			2回以内	
	カーメックスD水和剤 (DCMU)	雑草発生前～雑草発生初期	150～300g	—	70～100L	
	ダイロンゾル (DCMU)	雑草発生前～雑草発生初期 :草丈15cm以下	200～250ml	—	100L	
	2,4-Dアミン塩 (2,4PA)	雑草生育期:草丈30cm以下 (収穫30日前まで)	100g	100g	100L	
休耕田	カソロン粒剤6.7 (DBN)	秋冬期～春期の雑草 (11月中下旬～降雪前)	4～6kg	4～6kg	—	
	ラウンドアップマックスロード (グリホサート)	雑草生育期	200～500ml	500～1000ml	通常散布50～100L 少量散布25～50L	
農道、 公園、 庭園、 堤とう、 駐車場、 道路、 運動場、 宅地、 のり面、 鉄道等	バスタ液剤 (グルホシネット)	雑草生育期:草丈50cm以下	500～1000ml	500～1000ml	100～150L	
	ラウンドアップマックスロード (グリホサート)	雑草生育期	200～500ml	500～1000ml	通常散布50～100L 少量散布25～50L	
	グリホエキス液剤 (グリホサート)	雑草生育期:草丈30cm以下	500ml	1000ml	100L	
	バスタ液剤 (グルホシネット)	雑草生育期	500～1000ml	1000～2000ml	100～200L	
	ザクサ液剤 (グルホシネットP)	雑草生育期			3回以内	
	サンダーボルト007 (グリホサート、ピラフルフェンエチル)	雑草生育期:草丈50cm以下	500～1000ml	500～1000ml	100L	
	カソロン粒剤6.7 (DBN)	雑草発生前～雑草発生初期	6～9kg	10～15kg	—	
3回以内	カーメックスD水和剤 (DCMU)	雑草発生前～雑草発生初期 (多年生は、生育初期～生育中期)	300～600g	1000～2000g	100～200L	
	2,4-Dアミン塩 (2,4PA)	雑草生育期:草丈20cm以下	100～200g	200～300g	70～100L	

◎ラウンドアップマックスロード、グリホエキス液剤、サンダーボルト007は同じ成分(グリホサート)を含んでいます。
例: 水田畦畔で使用する場合

- ① ラウンドアップマックスロード3回 → ○
- ② グリホエキス3回 → × (グリホエキスは使用回数2回までのため)
- ③ グリホエキス2回 + ラウンドアップマックスロード1回 → ○
- ④ グリホエキス2回 + ラウンドアップマックスロード2回 → ×
(上記2剤の場合、グリホサートを含む除草剤の総使用回数は3回までのため、4回目は使用できません。)

◎カーメックスD水和剤、ダイロンゾルは同じ成分を含んでいます。水田畦畔で使用する場合はどちらか1回までしか使用できません。

◎使用回数は前作の水稻収穫後からカウントされます。(水稻→水稻の場合)

水稻防除剤の登録内容

令和6年10月登録現在

薬剤名	適用病害虫	使用量	使用時期	使用方法	使用上のポイント
テクリードC フロアブル	もみ枯細菌病、苗立枯細菌病、褐条病、ばか苗病、いもち病、ごま葉枯病、苗立枯病（リゾープス菌・トリコデルマ菌）	200倍	浸種前	24時間種子浸漬	
ダコレート 水和剤	苗立枯病（リゾープス菌、トリコデルマ菌、フザリウム菌）	400～600倍	播種時～綠化期 但し播種14日後まで	育苗箱の上から均一に散布する。	いもち病（苗いもち）は播種時400倍／1回
タチガレースM 粉剤	苗立枯病（ピシウム菌、フザリウム菌）、ムレ苗防止、根の生育促進	6～8g／1箱	播種前	育苗土壌に均一に混和する。	土壌混和は1回のみ
タチガレースM 液剤	苗立枯病（ピシウム菌、フザリウム菌）、ムレ苗防止、根の生育促進、移植時の発根及び活着促進	500～1000倍 (500ml／1箱)	播種時又は発芽後	本剤の所定量を土壤灌注する。	育苗箱への灌注は1回のみ
エバーゴルフォルテ 箱粒剤	いもち病、紋枯病、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、白葉枯病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ	50g／1箱	播種時(覆土前)～移植当日	育苗箱の苗の上から均一に散布する。	散布量は育苗箱1箱当たり50gを守ってください。 50g以下では、効果が劣ります。
ドクターDr.オリゼリディア 箱粒剤 いもち病 初期害虫 予防対策 イナゴ類	いもち病、白葉枯病、イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウ、イネヒメハモグリバエ、イネカラバエ、フタオビコヤガ、イナゴ類	50～100g／1箱※	移植3日前～移植当日	育苗箱の上から均一に散布する。	散布量は育苗箱1箱当たり使用量を守ってください。 50g以下では、効果が劣ります。
オリゼメート 1キロ粒剤	いもち病、もみ枯細菌病、白葉枯病	1～1.3kg／10a	収穫14日前まで	散布	箱施薬した方は不要
ビームトレ モンセレン粉剤DL	いもち病、紋枯病、ごま葉枯れ病、ウンカ類、カメムシ類、コブノメイガ、ツマグロヨコバイ、イネツトムシ	4kg／10a	収穫21日前まで	散布	散布適期は、出穗7～3日前
ラブサイド スタークル粉剤DL	いもち病、ツマグロヨコバイ、ウンカ類、カメムシ類、イナゴ類、ニカメイチュウ	4kg／10a	収穫7日前まで	散布	散布適期は、出穗7～10日後
スタークル粉剤DL	カメムシ類、イナゴ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、イネドロオイムシ、ニカメイチュウ、フタオビコヤガ	3kg／10a	収穫7日前まで	散布	散布適期は、出穗2週間後頃
モンガリット粒剤	稻こうじ病、紋枯病、疑似紋枯症（褐色紋枯病菌、赤色菌核病菌、灰色菌核病菌、褐色菌核病菌）、墨黒穗病 穂枯れ（ごま葉枯病菌、すじ葉枯病菌）	3～4kg／10a 4kg／10a	収穫30日前まで	湛水散布	散布適期は、出穗21～14日前

*10a当たりの投下薬量が1kgを超えないようにご留意下さい。

薬剤名	適用病害虫	使用量	使用時期	使用方法	使用上のポイント
イモチエース スタークル粒剤	いもち病、穂枯れ（ごま葉枯病菌）、紋枯病、墨黒穗病、ウンカ類、カメムシ類、変色米（アルタナリア菌、カーブラリア菌）、ツマグロヨコバイ、フタオビコヤガ	3kg／10a	収穫35日前まで	散布	散布適期は、出穗14～10日前
スタークル粒剤	カメムシ類、ウンカ類、ニカメイチュウ、ツマグロヨコバイ、イネドロオイムシ	3kg／10a	収穫7日前まで	散布	散布適期は、出穗7～10日後頃
スタークル豆つぶ	カメムシ類 ウンカ類、ツマグロヨコバイ	250g／10a 250g～500g／10a	収穫7日前まで	散布	散布適期は、出穗7～10日後頃
トレボン粒剤	イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、イネゾウムシ、イネヒメハモグリバエ、イナゴ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ（第一世代）	2～3kg／10a 3kg／10a	収穫21日前まで	散布	初期害虫防除。箱施薬した方は不要。
リンバー粒剤	紋枯病、疑似紋枯症（褐色菌核病菌、赤色菌核病菌）	3～4kg／10a	収穫30日前まで	散布	散布適期は、出穗14～10日前
ブラシン粉剤DL	いもち病・ごま葉枯病、穂枯れ、変色米 もみ枯細菌病、稻こうじ病、内穎褐変病	3～4kg／10a 4kg／10a	収穫7日前まで	散布	発病初期を逃さず散布する
Zボルドー 粉剤DL	稻こうじ病	3～4kg／10a	出穗10日前まで	散布	前年発生圃場は必ず散布
トレボン粉剤DL	イネツトムシ カメムシ類、イネミズゾウムシ成虫、ツマグロヨコバイ、ウンカ類、コブノメイガ、アザミウマ類、イナゴ類、イネドロオイムシ、ニカメイチュウ イネヒメハモグリバエ、フタオビコヤガ	4kg／10a 3～4kg／10a 3kg／10a	収穫7日前まで	散布	コブノメイガ、イナゴの多発時に散布する

倒伏軽減剤の使用方法

使用目的・・・節間短縮による倒伏の軽減（倒伏が予想される場合のみ散布、使用時期厳守）

薬剤名	使用時期	10a当たり使用量	使用方法
ロミカ粒剤	出穗25～10日前	2～3kg	湛水散布
スマレクト粒剤	出穗20～7日前	2～3kg	湛水散布
ビビフル粉剤DL	出穗10～5日前	3～4kg	散布
ビビフルフロアブル	出穗10～2日前	75～100ml 通常散布量50～150l 少量散布量25～50l	茎葉散布

本田除草剤の登録内容

令和6年10月登録現在

<初期除草剤>

除草剤名	成 分	HRACコード	使用量/10a	使用時期	使用方法	適用雑草
ソルネット 1キロ粒剤	プレチラクロール	15	1kg	植代後～移植前7日まで 移植直後～ノビエ1葉期まで (田植同時登録あり) (移植後30日まで)	湛水散布	水田1年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ
先陣 ジャンボ	ジメタメトリン ピラクロニル	5・14	20g ×10個	植代後～移植7日前まで 移植直後～ノビエ1葉期まで (移植後30日まで)	水田に小包装 (パック)のまま投げ入れる	一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、オモダカ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離
メテオ フロアブル	ペントキサゾン	14	500ml	植代後～移植前7日まで 移植直後～ノビエ1葉期まで (田植同時登録あり) (移植後30日まで)	湛水散布	水田1年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、キシュウスズメノヒエ、アオミドロ・藻類による表層はく離

<一発除草剤>

除草剤名	成 分	HRACコード	使用量/10a	使用時期	使用方法	適用雑草
バッチャリ 1キロ粒剤 抵抗性雑草対策	イマゾスルフロン ピラクロニル プロモブチド	2・14・30	1kg	移植直後～ノビエ2.5葉期まで (田植同時登録あり) (移植後30日まで) <直播登録あり>	湛水散布	水田1年生雑草、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、セリ、ヒルムシロ、ホタルイ、マツバイ、ミズガヤツリ、アオミドロ・藻類による表層はく離
アシュラ 1キロ粒剤 抵抗性雑草対策	ピラクロニル トリアファモン ベンゾビシクロン	2・14・27	1kg	移植直後～ノビエ4葉期まで (田植同時登録あり) (移植後30日まで) <直播登録あり>	湛水散布	水田1年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、キシュウスズメノヒエ、アオミドロ・藻類による表層はく離
ベンケイ 1キロ粒剤 抵抗性雑草対策	ピリミスルファン フェノキサスルホン ベンゾビシクロン	2・15・27	1kg	移植直後～ノビエ3葉期まで (田植同時登録あり) (移植後30日まで) <直播登録あり>	湛水散布	水田1年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ
アッパレZ ジャンボ 抵抗性雑草対策	ピラクロニル プロピリスルフロン プロモブチド	14・2・30	40g ×10個	移植後3日～ノビエ3葉期まで (移植後30日まで) <直播登録あり>	水田に小包装 (パック)のまま投げ入れる。 (湛水散布)	水田1年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、ヒルムシロ、セリ、シズイ、アオミドロ・藻類による表層はく離
ガンガン ジャンボ 抵抗性雑草対策	ピリミスルファン フェノキサスルホン	2・15	25g ×10個	移植後3日～ノビエ2.5葉期 (移植後30日まで) <直播登録あり>	水田に小包装 (パック)のまま投げ入れる。 (湛水散布)	水田1年生雑草、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、セリ、ヒルムシロ、ヘラオモダカ、ホタルイ、マツバイ、ミズガヤツリ、アオミドロ・藻類による表層はく離
ウルティモZ ジャンボ 抵抗性雑草対策	シクロピリモレート ピラゾレート プロピリスルフロン	2・27・33	35g ×10個	移植後5日～ノビエ3葉期 (移植後30日まで) <直播登録あり>	水田に小包装 (パック)のまま投げ入れる。 (湛水散布)	水田1年生雑草、多年生広葉雑草、エゾノサヤヌカグサ
エンペラー フロアブル 抵抗性雑草対策	ピラクロニル ピリミノバックメチル フェンキノトリオン	2・14・27	500ml	移植直後～ノビエ3葉期 (田植同時登録あり) (移植後30日まで) <直播登録あり>	原液湛水散布	水田1年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、エゾノサヤヌカグサ、アオミドロ・藻類による表層はく離

<中期除草剤>


除草剤名	成 分	HRACコード	使用量/10a	使用時期	使用方法	適用雑草
アトカラS ジャンボMX	アジムスルフロン ペノキスラム メソトリオン	2・27	25g ×20個	移植後14日～ ノビエ3.5葉期まで (収穫45日前まで) <直播登録あり>	湛水散布	水田1年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ

<後期除草剤>

除草剤名	成 分	HRACコード	使用量/10a	使用時期	使用方法	適用雑草
ヒエクリーン 1キロ粒剤	ピリミノバックメチル	2	1kg	移植後15日～ノビエ4葉期まで (収穫45日前まで) <直播登録あり>	湛水散布	ノビエ
クリンチャー 1キロ粒剤	シハロホップブチル	1	1.5kg	移植後25日～ノビエ5葉期まで (収穫30日前まで) <直播登録あり>	湛水散布	ノビエ、キシュウスズメノヒエ、アゼガヤ
クリンチャー EW	シハロホップブチル	1	100ml 希釀量 100 l	移植後20日～ノビエ6葉期まで (収穫30日前まで) <直播登録あり>	湛水散布又は落水散布	ノビエ、キシュウスズメノヒエ、アゼガヤ
トドメMF乳剤	メタミホップ	1	200ml 希釀量 100 l	移植後14日～ノビエ7葉期まで (収穫50日前まで) <直播登録あり>	湛水散布又は落水散布	ノビエ、キシュウスズメノヒエ、アゼガヤ
バサグラント粒剤	ベンタゾン	6	3～4kg	移植後15～55日 (収穫60日前まで) <直播登録あり>	落水散布又はごく浅く湛水散布	水田1年生雑草(イネ科を除く)、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、クログワイ、シズイ、エゾノサヤヌカグサ
レプラス 1キロ粒剤	ジメタメトリンドイムロンテフルトルリオン メタゾスルフロン	0・2・5・27	1kg	移植後14日～ノビエ4葉期まで (収穫60日前まで)	湛水散布	水田1年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ
ワイドパワー 粒剤	ペノキスラム ベンタゾン	2・6	3kg	移植後20日～ノビエ5葉期まで (収穫60日前まで) <直播登録あり>	落水散布	水田1年生雑草、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、ヒルムシロ、ホタルイ、マツバイ、ミズガヤツリ
ウィードコア 1キロ粒剤	ダイムロン ペノキスラム	4・2・27	1kg	移植後7日～ノビエ4葉期まで (収穫60日前まで) <直播登録あり>	湛水散布	水田1年生雑草、キシュウスズメノヒエ、水田多年生広葉雑草
クリンチャー バスME液剤	シハロホップブチル ベンタゾン	1・6	1000ml 希釀量 100 l	移植後15日～ノビエ5葉期まで (収穫50日前まで) <直播登録あり>	落水散布又はごく浅く湛水散布	水田1年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ
ノミニー液剤	ビスピリバックナトリウム塩	2	50～100ml 希釀量 100 l	移植後30日～ クサネムの草丈40cmまで イボクサの茎長30cmまで (収穫60日前まで) <直播登録あり>	落水散布又はごく浅く湛水散布	クサネム、イボクサ
モゲトン粒剤	ACN	0	2～3kg	発生始～発生盛期 (収穫45日前まで) <直播登録あり>	湛水散布	藻類による表層はく離、ウキクサ類、藻類

ゆめみづほ栽培ごよみ



目標収量	収量	600kg/10a
	株数	60株/坪 (18.2株/m ²)
	穂数	25本/株
	1穂粒数	67粒/穂
	登熟歩合	85%
	千粒重	23g



月 旬	4			5			6		
	上	中	下	上	中	下	上	中	
生育ステージ	育苗期	移植期	活着期	分けつ期	有効分けつ決定期				
栽培のポイント	薄播きによる健苗育成 (適正播種量 乾粉130g/箱)	苗の成長段階に応じた 温度および水管理	太60株/坪植えとする 植えをさける	浅水管理による 分けつの促進	田干しによる 根の活性化	早めに 中干し開始	(確保された時 茎数が15~16本/株)		

水管理	保温のため やや深水 日中浅水 夜間深水	間断通水	中干し

施肥基準	〔一般体系〕		
	肥料名	品種	ゆめみづほ
	土づくり資材	BB パワフル大地 または BB スーパーけい酸	60
	基 肥	BB 有機入り820(みさと)	45~50
		BB いしかわ有機入り056	35~40
	中間追肥	草木加里	10
		BB P K けいさん	20
		けい酸加里プレミア	20~40
	穂 肥	BB 有機入り追肥526号	1回目 2回目 20 25
	※ほ場により施用量を加減して下さい。		




〔基肥一発体系〕	〔基肥一発体系〕		
	肥料名	品種	ゆめみづほ
	土づくり資材	BB パワフル大地 または BB スーパーけい酸	60
	基 肥	BB 早生一発くんDX28 または BB スリム早生一発くん または BB 早生一発くんNEO	40~50
	中間追肥	草木加里 BB P K けいさん けい酸加里プレミア	10 20~40 20~40


注) 穂肥の必要はありません。側条施肥が前提ですが、全層施肥でも施用できます。
初年目は上記を上限とし、2年目以降生育や収量から判断し、ほ場にあった施肥量を決定して下さい。
草木加里、PKけいさん又はけい酸加里プレミアを必ず施用下さい。

コシヒカリ栽培ごよみ

目標収量	収量		株数		穗数		1穂粒数		登熟歩合		千粒重																														
	収量	530kg/10a	株数	60株/坪 (18.2株/m ²)	穗数	21本/株	1穂粒数	73粒/穂	登熟歩合	85%	千粒重	22.5g																													
	播種		田植		葉数		14~15本																																		
					3	4	5	6	7	8																															
出穂前後日数																																									
月	4		5			6																																			
旬	上	中	下	上	中	下	上	中																																	
生育ステージ	育苗期			移植期	活着期	分けつ期	有効分けつ 決定期																																		
栽培のポイント	薄播きによる健苗育成 (適正播種量 乾粉130g/箱)	苗の成長段階に応じた 温度および水管理	太60株/坪植えとする 太植えをさける	浅水管理による 分けつの促進	田干しによる活性化	早めに 中干し開始 (確保された時 茎数が14~15本/株)																																			
水管理	保温のため 日中浅水 やや深水 夜間深水						中干し																																		
							間断通水																																		
施肥基準	<p>[一般体系]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>肥料名</th> <th>品種</th> <th>コシヒカリ</th> <th>(kg/10a)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土づくり資材</td> <td>BB パワフル大地 または BB スーパーけい酸</td> <td>60</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">基 肥</td> <td>BB 有機入り820(みさと)</td> <td>40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BB いしかわ有機入り056</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">中間追肥</td> <td>草木加里</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BB P K けいさん</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>けい酸加里プレミア</td> <td>20~40</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">穗 肥</td> <td>BB 有機入り追肥526号</td> <td>1回目 13</td> <td>2回目 17</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ほ場により施用量を加減して下さい。</p>												肥料名	品種	コシヒカリ	(kg/10a)	土づくり資材	BB パワフル大地 または BB スーパーけい酸	60		基 肥	BB 有機入り820(みさと)	40		BB いしかわ有機入り056	30		中間追肥	草木加里	10		BB P K けいさん	20		けい酸加里プレミア	20~40		穗 肥	BB 有機入り追肥526号	1回目 13	2回目 17
肥料名	品種	コシヒカリ	(kg/10a)																																						
土づくり資材	BB パワフル大地 または BB スーパーけい酸	60																																							
基 肥	BB 有機入り820(みさと)	40																																							
	BB いしかわ有機入り056	30																																							
中間追肥	草木加里	10																																							
	BB P K けいさん	20																																							
	けい酸加里プレミア	20~40																																							
穗 肥	BB 有機入り追肥526号	1回目 13	2回目 17																																						



飽水管理



雑草防除基準

除草体系

●基本処理

田植

バッチャリ1キロ粒剤

(散布適期)

田植直後～10日散布
(田植同時可能)

アシュラ1キロ粒剤

田植直後～10日散布
(田植同時可能)

●省力タイプ

田植

ガンガンジャンボ

田植後3日～10日散布
(湛水散布)

ウルティモZジャンボ

田植後5日～14日散布
(湛水散布)

エンペラーフロアブル

田植直後～10日散布
(湛水散布)

●雑草が多い場合

田植

ソルネット
1キロ粒剤

または
メテオ
フロアブル

または
先陣ジャンボ

田植直後～5日散布
(田植同時可能)

バッチャリ1キロ粒剤 または
アシュラ1キロ粒剤 または
ガンガンジャンボ または
ウルティモZジャンボ または
エンペラーフロアブル

田植後15日～20日散布

アトカラSジャンボMX

田植後20日～25日散布

初期剤と一発剤・中期剤を組合わせることで雑草を長期間抑制することができます。

①ヒエが残った場合

ヒエクリーン1キロ粒剤 田植後15日～ノビエ4葉期まで (収穫45日前まで)

クリンチャー1キロ粒剤 田植後25日～ノビエ5葉期まで (収穫30日前まで)*

クリンチャーEW 田植後20日～ノビエ6葉期まで (収穫30日前まで)

トドメMF乳剤 田植後14日～ノビエ7葉期まで (収穫50日前まで)

*クリンチャー 1.5kg/10aの場合

②広葉（多年生雑草）が残った場合

バサグラン粒剤 田植後15日～55日 (収穫60日前まで)

バサグラン液剤 田植後15日～55日 (収穫50日前まで)

③ヒエと広葉（多年生雑草）が残った場合

レプラス1キロ粒剤 田植後14日～ノビエ4葉期まで (収穫60日前まで)

ワイドパワー粒剤 田植後20日～ノビエ5葉期まで (収穫60日前まで)

ワイドコア1キロ粒剤 田植後 7日～ノビエ4葉期まで (収穫60日前まで)

クリンチャーバスME液剤 田植後15日～ノビエ5葉期まで (収穫50日前まで)

病害虫基幹防除基準

種子消毒

テクリードCフロアブル

いもち病・白葉枯病・紋枯病

イネミズヅウムシ・

イネドロオイムシ・その他害虫

・エバーゴルフォルテ箱粒剤

田植3日前～田植当日箱施用

※散布注意事項は
49ページを
参照して下さい。

[粉剤体系]

(1回目) 紋枯病・穂いもち・
カメムシ類他

・ビームトレモンセレン粉剤DL
出穂前7～3日
(収穫21日前まで)

[粒剤体系]

(1回) イもち病・紋枯病・
ウンカ類・カメムシ類他

・イモチーススタークル粒剤
出穂前14～10日
(収穫35日前まで)

(2回目) 穂いもち・カメムシ類・
ウンカ類・ツマグロヨコバイ他

・ラブサイドスタークル粉剤DL
出穂後7～10日
(収穫7日前まで)

(2回目) カメムシ類・ウンカ類・
ツマグロヨコバイ他

・スタークル粒剤
または
・スタークル豆つぶ
出穂後7～10日
(収穫7日前まで)


(隨時) カメムシ類・ウンカ類他

・スタークル粉剤DL
または
・スタークル豆つぶ
出穂後14～17日
(収穫7日前まで)

3月

5月植えを目標に種まきを行いましょう!!

うす播き、計画的なは種による、過剰生育防止、乳白粒発生防止




◎育苗箱の消毒

イチバン
500倍液
水100ℓに薬剤を
200ml入れる



瞬間浸漬
液の中で箱をゆさぶる

ジョウロで散布



◎種子消毒

薬剤名	希釈倍率 (水10ℓ当たり薬量)	浸漬時間	水温
テクリードCフロアブル	200倍 (50ml)	24時間	10~20℃

種枠量に対する水量及び薬量

種粕重量 (kg)	5	10	15	20	50	100
水量 (ℓ)	10	20	30	40	100	200
藥量 (mℓ)	50	100	150	200	500	1000

- 10℃以下にならぬよう対応する。
 - 樹脂性のラベルは字が消えるので木製の札を使用する。
 - 消毒中に2~3回袋を動かし液を攪拌する。
 - ※消毒後の廃液は河川等へ絶対に流さないで下さい。

○催芽の状態

〈80%以上ハトムネ状態に！〉



4月


水と温度管理でガッチャリ苗!!

緑化期

◎保温が第一、苗の素質が決まる

1日目

- 灌水は覆土の持ち上がりがある場合のみ軽く行う。また、種粉の見えるところは軽く覆土する。
- 夜間は温度が15°C以下にならないように保温する。
- 出芽直後の白い芽は、直射日光に当たると白化現象を起こすので、直ちにラブシートや寒冷紗で被覆する。



2日目~


- 晴れた日は、高温障害(ヤケ)にならないように日中ビニールをすかして換気を行う。
※シルバーポリトウ使用の場合または、ハウスビニールを更新した場合は特に注意する。
- 夜温が15°Cを下回るときは、十分な被覆を行い保温に努める。
- 床土表面が白く乾いた場合、灌水する。
- 緑化終了の目安は、葉が緑色になり、苗の長さが3cm程度になった時点とし、日中はラブシートや寒冷紗の被覆をとる。

硬化期

◎きめ細かな水・温度管理で丈夫な苗づくり

初期 (本葉1.0~2.0葉期)

- 徒長防止のため、日中は高温に注意し、換気につとめる。
- 夜間の温度が10°C以下になる場合は、被覆等を行い保温する。
- 土の乾き具合を見て、午前中に灌水する。雨天時の灌水は控える。
- カビの早期発見・防除に努めること。(タチガレースM液剤)




後期 (本葉2.0葉以降)

- 昼夜の温度差が大きいとムレ苗が出やすくなるので、日中の高温に注意し換気に努める。
- 水は1日に1~2回、たっぷりとかける。但し、夕方以降は行わない。
- 田植4~5日前からは極端な低温の恐れがない限り、夜間もビニールを開け外気にならし、硬い苗に仕上げる。
- 苗の葉色低下が著しい場合、田植3~4日前に、弁当肥を与える。

《温度管理と被覆資材使用の目安》

ハウスを閉めきったままにしておくと
室温が50度程度まで上るので上り
過ぎないように換気する。



ステージ	緑化期	硬化初期	硬化中期	硬化後期	注意事項
日 数	3~5日間	6日間	6日間	6日間	※育苗日数 20~25日
昼 溫 度	20~25°C	15~20°C	15~20°C	外気温	※緑化期は30°C 硬化期は25°C 以上に上げない
	〇	△	×	×	※最低8°C以下に 下げない
夜 溫 度	15~20°C	10~15°C	10~15°C	外気温	
	〇	△	×	×	

注) ○は常時必要、△は状況に応じて必要、×は不要

箱育苗の生育障害と対策


病害名	使用時期	薬剤名 (使用回数)	使用量	備 考
苗立枯病 (かび)	播種時~ 緑化期 (但し播種 14日後 まで)	ダコレート 水和剤 (播種時含み 2回以内)	500倍液を 1箱当たり 500ml灌注 <水50lに 100ml(1本) で100箱分>	●白カビ、青カビ 発生時
	播種時 または 発芽後	タチガレ エースM 液剤 (1回)		●赤カビ発生時 ●ムレ苗防止 根の生育促進にも 効果あり
ムレ苗	硬化期 (1.5~2葉 期が出や す)	●pH5.0前後にし、通 気性のある床土を使 用する ●低温時は保温資材を かける ●夜間冷えて晴天の日 には早めにビニール をあけるようにする		●葉身が針状に巻き、 しだいに黄褐色に 変わる ●夜間8°C以下の低温 と日中の高温によ る地上部と地下部 のバランスがとれ なくなり発生する

弁当肥の施用法 (稀釀液の使用量は500ml/箱)

肥料名	施用方法 (100箱当たり)
硫安	500gを50lの水にとかして施用 (100倍)
液肥10号	250mlを50lの水に薄めて施用 (200倍)

・施用後は、軽く灌水し葉についた肥料を落とす。

比べてみましょう！《稚苗》
原寸大の苗です



土づくり

- 秋に土づくり資材を施用できなかったほ場は必ず春に施用しましょう。
- ※詳しくは64ページをご覧下さい。

荒耕

- 15cm以上の深耕に努める(深耕は根の伸びる範囲を広げ、養分吸収を良くする)
- 均平は耕起前に高い所から低い所に土を運び、高低差を修正しましょう。

基肥施用基準

(10a当たり)

施肥方法	肥料名	コシヒカリ	ゆめみづほ
一般体系	BB 有機入り820号(みさと)	40kg	45~50kg
	BB いしかわ有機入り056号	30kg	35~40kg
基肥一発体系	BB コシ一発くんDX24 または BB 新コシ一発くん特号 または BB コシ一発くんNEO β	35~40kg	—
	BB 早生一発くんDX28 または BB スリム早生一発くん または BB 早生一発くんNEO	—	40~50kg
基肥一発体系・ 中間追肥省力	BB けい酸パワー・コシ一発くん	70~80kg	—
	BB けい酸アップ・コシ一発くん	45~55kg	—


※側条施肥機を利用する場合はJAの指導に従って開度を設定して下さい。(64ページ参照)

代かき

- 田植え3日前までに行い、田面の高低差をなくす。
- 代かきは水を少なめにして、稻わらを土の中に埋め込むように作業すると、田植作業の能率と精度が上がります。

●代かきはねりすぎにならないように

枕地になる所はねり込みすぎないよう注意する。代かき時の水の深さに注意し、ワラが浮かないようにする。

●ほ場を均平にする

田面が露出していると除草効果が落ち、また低い部分は薬害が出やすくなるので田面を均平にする。


濁り水などが排水路に流れ込まないよう水管理に注意しましょう。**葉いもち・初期害虫防除 (育苗箱施薬)**

薬剤名	エバーゴルフォルテ箱粒剤	Dr.オリゼリディア箱粒剤
散布時期	播種時(覆土前)～移植当日	移植3日前～移植当日
施用量	1箱当たり50g	50～100g/1箱※
散布方法	育苗箱の苗の上から均一に散布	育苗箱の上から均一に散布する
主な対象病害虫	いもち病、紋枯病、イネミニズゾウムシ、イネドロオイムシ、白葉枯病、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウ、イネヒメハモグリバエ、イネカラバエ、フタオビコヤガ、イナゴ類	いもち病、白葉枯病、イネドロオイムシ、イネミニズゾウムシ、ウンカ類、ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウ、イネヒメハモグリバエ、イネカラバエ、フタオビコヤガ、イナゴ類

※10a当たりの投下薬量が1kgを超えないようにご留意下さい。

●箱施薬剤散布においての注意事項

- 箱施薬剤は育苗ハウス使用後、後作に野菜類を栽培する場合は、必ずハウス外にて散布を行って下さい。
- 必ず1箱当たり50gの施用量を守りましょう。
- ※間違えて水稻除草剤を使用しないで下さい。



50g散布

畦畔および農道等の除草

使用時期	薬剤名	薬量	水量	散布面積	使用回数
雑草発生前～生育初期	カーメックスD水和剤	80g	40L	400m ²	どちらか1回
	ダイロンゾル	80ml	40L	400m ²	
4月～6月 雑草発生盛期	ラウンドアップマックスロード	200ml	20L	400m ²	3回以内
	バスタ液剤	400ml	40L	400m ²	2回以内
	ザクサ液剤				

注) 風の強い日は稲やその他作物にかかるないよう注意して下さい。
※バスタ液剤にカーメックスD水和剤またはダイロンゾルを混用して散布すると、抑草期間が長くなります。

例)

水 50L	+	バスタ液剤 500ml または ザクサ液剤 500ml	カーメックスD水和剤 100g または ダイロンゾル 100ml
----------	---	---	--

令和7年 4月

～ 今月の1か月対策～
育苗日数(播種～田植まで)は
1か月以内(20～25日間)が目安

1	火
2	水
3	木
4	金
5	土
6	日
7	月
8	火
9	水
10	木
11	金
12	土
13	日
14	月
15	火
16	水
17	木
18	金
19	土
20	日
21	月
22	火
23	水
24	木
25	金
26	土
27	日
28	月
29	火 昭和の日
30	水

5月

適切な初期管理で、高品質な米の第一歩

田植え

—5月植え・細植え・浅植えを心がけましょう—

- (1) 過剰生育や高温下での登熟を避けるため、5月植えを行う。
- (2) 過剰生育を抑えるため栽植密度は60株／坪とする。
- (3) 植付け本数は1株3～4本の細植えにする。植付け深さは2～3cmの浅植えにする。
- (4) 田植後5日間は、苗が水没しない程度の深水にする。

水田除草体系

—除草剤散布後は7日間止め水を徹底しましょう—

●基本処理(初・中期一発剤)

 田植直後～10日	バッチャリ1キロ粒剤 1kg/10a	(田植同時処理機による散布可能) (抵抗性雑草対策剤)
 田植直後～10日	アシュラ1キロ粒剤 1kg/10a	(田植同時処理機による散布可能) (抵抗性雑草対策剤)

●省力化処理(初・中期一発剤)

 田植後3日～10日	ガンガンジャンボ 25g×10個/10a	(畦からパック剤を手軽に投込むタイプ、拡散性高い) (抵抗性雑草対策剤)
 田植後5日～14日	ウルティモZジャンボ 35g×10個/10a	(畦からパック剤を手軽に投込むタイプ、拡散性高い) (抵抗性雑草対策剤)
 田植直後～10日	エンペラーフロアブル 500ml/10a	(畦からボトルを振るタイプ) (抵抗性雑草対策剤)

●雑草が多い場合

(初期剤)		(一発剤)
 田植直後～5日	ソルネット1キロ粒剤 1kg/10a または メテオフロアブル 500ml/10a	バッチャリ1キロ粒剤 1kg/10a または アシュラ1キロ粒剤 1kg/10a または ガンガンジャンボ 25g×10個/10a または ウルティモZジャンボ 35g×10個/10a または エンペラーフロアブル 500ml/10a
田植後 15日～20日		(中期剤)
田植後 20日～25日		アトカラSジャンボMX 500g/10a
(田植同時処理機による散布可能)		

※散布上の留意点

- (1) フロアブル剤、ジャンボ剤は湛水散布とし、特に水持ちの良いほ場で藻の発生前に使用する。
- (2) 藻の多発したほ場では、モゲトン粒剤を2～3kg/10a散布する。

〈後期剤〉

●ノビエの取りこぼしに

薬剤名	使用時期	10a当たり 使用量	注意事項
ヒエクリーン 1キロ粒剤	田植後15日～ ノビエ4葉期まで (収穫45日前まで)	1kg	湛水状態で散布 遅効性だが抑草期間が長い
クリンチャー 1キロ粒剤	田植後25日～ ノビエ5葉期まで (収穫30日前まで)	1.5kg	湛水状態で散布 速効性だが抑草効果は期待できない
クリンチャー EW	田植後20日～ ノビエ6葉期まで (収穫30日前まで)	薬量100ml 希釈水量100ℓ	落水状態で散布 効果を高めるため、展着剤を加用する
トドメMF 乳剤	田植後14日～ ノビエ7葉期まで (収穫50日前まで)	薬量200ml 希釈水量100ℓ	落水状態で散布 耐雨に優れ、展着剤不要

令和7年 5月

～今月の1か月対策～
中干し開始は田植え
1か月後が目安

1	木	
2	金	
3	土	憲法記念日
4	日	みどりの日
5	月	こどもの日
6	火	振替休日
7	水	
8	木	
9	金	
10	土	
11	日	
12	月	
13	火	
14	水	
15	木	
16	金	
17	土	
18	日	
19	月	
20	火	
21	水	
22	木	
23	金	
24	土	
25	日	
26	月	
27	火	
28	水	
29	木	
30	金	
31	土	

●広葉雑草の取りこぼしに

薬剤名	使用時期	10a当たり 使用量	注意事項
バサグラン 粒剤	田植後15～55日 (収穫60日前まで)	3～4kg	落水状態で散布 3日間入水しない
バサグラン 液剤	田植後15～55日 (収穫50日前まで)	薬量500ml 希釈水量100ℓ	落水状態で散布 展着剤必要なし

●ノビエも広葉も残った場合

薬剤名	使用時期	10a当たり 使用量	注意事項
レプラス 1キロ粒剤	移植後14日～ ノビエ4葉期まで (収穫60日前まで)	1kg	湛水状態で散布
ワイドパワー 粒剤	移植後20日～ ノビエ5葉期まで (収穫60日前まで)	3kg	落水状態で散布
ウイードコア 1キロ粒剤	移植後7日～ ノビエ4葉期まで (収穫60日前まで)	1kg	湛水状態で散布
クリンチャーバス ME液剤	田植後15日～ ノビエ5葉期まで (収穫50日前まで)	薬量1000ml 希釈水量100ℓ	落水状態で散布 展着剤必要なし

田植後の管理

- 田植後4～5日間は、やや深水としその後は日中浅水管理とする。
- 生ワラ等による有害ガスの除去を図るために、中干しまでに2～3回の軽い田干しを繰り返すこと。(根ぐされ防止対策)
- 本田初期害虫の防除。(育苗箱施薬できなかった場合)
箱施薬剤を散布していないほ場で、イネドロオイムシ・イネミズゾウムシの発生がみられたらトレボン粒剤を2～3kg/10a散布する。

薬剤名	対象害虫	10a当たり使用量	注意事項
トレボン粒剤	イネドロオイムシ、 イネミズゾウムシ	2～3kg	湛水状態で散布

6月

中干し・溝切りで健全な稻体づくり!!


中干し

一中干しは根の健全化と、過剰生育を抑える大切な作業です。-

○中干しの方法

- 中干しは14~15本／株程度が確保されたら開始する。（6月初旬）
- 中干しの程度は、土中に「小ひび」が入るのを目安にし、湿田では程度を強める。
- 高温乾燥が続く場合は、落水期間を短くしたり、土壤に応じた水管理を行う。
- 中干しやその後の間断通水を実施しやすくするために溝切り（ネキカキ）を行う。

《中干しのやり方（3日落水、1日通水）》




※乾田や地力の低い場では3日程度落水、1日通水。

※湿田や過繁茂になりやすい場では5日程度落水、1日通水。


※中干しの期間は早生で6月末まで、中生で7月上旬までとし、その後は飽水管理を行う。

○中干しの効果

- | | | |
|-------------|-------------------------|-----------|
| 1. 元気な根づくり | → 根腐れ・倒伏防止 | → 登熟・食味向上 |
| 2. 余分な窒素を抜く | → 過剰生育抑制 | → 乳白粒発生防止 |
| 3. 田面を固くしめる | → 収穫直前まで通水してもコンバイン作業は楽々 | |



中干しをした稻体
●水管理が良いため根が健全。
●下葉の枯れ上りが少ない。





中干しをしない稻体
●水管理が悪いため根ぐされを生じる。
●下葉の枯れ上りが多い。

溝切り

○溝切り（ネキカキ）の方法

- 中干し開始直前あるいは中干し開始3日後を目安に行う。
- 溝切りは3~5m間に1本の割合を目安に行う。



中間追肥の施用

一健全な稻づくりのため必ず施用しよう一

資材名	施用量	施用時期
草木加里	10Kg/10a	6月1~15日
BB PKけいさん けい酸加里プレミア	20~40Kg/10a	(早生) 6月10~20日
		(中生) 6月15~30日

<草木加里・PKけいさん・けい酸加里プレミアの効果>

○登熟向上 ○根張り促進 ○耐病性向上 ○耐倒伏性向上

※基肥一発肥料を使用の方は、必ず施用して下さい。

着色粒発生防止対策

一カメムシ斑点米や褐色粒の発生を防止しよう一

◆カメムシ防除をかねた畦畔沿い除草の4つのポイント

- **ポイント1** 畦畔・農道等の雑草は5~6月にかけて除草し、更に7月上旬に追加除草する。
- **ポイント2** 除草は、刈取るか除草剤(ラウンドアップマックスロードまたはバスタ液剤)を散布する。
- **ポイント3** 休耕田には、6月下旬にスミチオン乳剤1000倍を散布し、カメムシの生息密度を下げる。
- **ポイント4** 長く伸びた雑草を7月中旬以降に刈取るとカメムシを水田に追い込むので注意する。

令和7年 6月

～今月の1か月対策～


中干し期間は約1か月間

1	日
2	月
3	火
4	水
5	木
6	金
7	土
8	日
9	月
10	火
11	水
12	木
13	金
14	土
15	日
16	月
17	火
18	水
19	木
20	金
21	土
22	日
23	月
24	火
25	水
26	木
27	金
28	土
29	日
30	月

7月

適切な穂肥で高品質米生産を!!

穂肥の施用




穂肥施用時の注意点

1. 施用する前に、幼穂長と葉色を必ず確認

【幼穂の確認方法】

平均的な株の一番背の高い茎を根元から抜き取る



2. 最終の穂肥は、出穂7日前までに


食味（玄米タンパク含有率）と穂肥（施肥窒素）には密接な関係があるので、施用する時期が遅いほど、また量が多いほど玄米中のタンパク含有率が高まり、食味が低下する。

3. 生育、地力に応じた施肥量、時期を判断

特にコシヒカリで茎数が多く葉色が濃い場合は、倒伏させないために1回目の穂肥の施肥時期を基準より遅らせたり、施肥量を減らすなどの対応が必要です。


稻の姿による診断

十分穂肥を施用できる稻




- 茎割いが良く、茎数少なめ
- 稲が硬い
- 葉色が淡く、直立ぎみ

穂肥を施用できない稻



- 茎割いが多い
- 葉が垂れている
- 葉色が濃い

穂肥時期を遅らせる稻




- 茎割いが良く、茎数少なめ
- 直立ぎみの稲
- 葉色が濃い

水 管 理

●中干し終了後の水管理

- 中干し後から刈取り5日前まで飽水管理に努め、常に土壤に水分を与え乾き過ぎないようにする。
- 穂ばらみ期に極端な低温が予想される場合は、深水管理とする。
- この時期は稲体の水分蒸散量が最も多くなるので、特に飽水管理を徹底する。
- 台風等によるフェーン現象時には、事前に通水する。
- 通水する場合、可能な限り夜間通水に努め、根の活力低下を防ぐ。

●飽水状態とは



出穂期とは…茎から穂の先端部が抽出することを出穂といいます。水田全体の40~50%が出穂した日が出穂期です。出穂10日前とは出穂期の10日前のことをいいます。

※葉色は、裏表紙の葉色見本を参考にして下さい。

基幹防除

…きれいな金沢米づくりは防除の完全実施から…

〈粉剤体系〉 基幹防除 隨時防除

	7月			8月	
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬
ゆめみづほ	出穂前20~10日 Zボルドー粉剤DL 4kg/10a	出穂前7~3日 ビームトレモンセレン粉剤DL 4kg/10a	出穂後7~10日 ラブサイドスタークル粉剤DL 4kg/10a	出穂後14~17日 スタークル粉剤DL 3kg/10a	
	いもち病・紋枯病 カメムシ類他 (収穫21日前まで)			いもち病・カメムシ類他 (収穫7日前まで)	
コシヒカリ	出穂前20~10日 Zボルドー粉剤DL 4kg/10a	出穂前7~3日 ビームトレモンセレン粉剤DL 4kg/10a	出穂後7~10日 ラブサイドスタークル粉剤DL 4kg/10a	出穂後14~17日 スタークル粉剤DL 3kg/10a	
	稻こうじ病	いもち病・紋枯病 カメムシ類他 (収穫21日前まで)		いもち病・カメムシ類他 (収穫7日前まで)	

〈粒剤体系〉 基幹防除 隨時防除

	7月			8月	
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬
ゆめみづほ	出穂前14~10日 イモチエーススタークル粒剤 3kg/10a		出穂後7~10日 スタークル粒剤 3kg/10a または スタークル豆つぶ 250g/10a		
	いもち病・紋枯病 ウンカ類・カメムシ類 (収穫35日前まで)			カメムシ類他 (収穫7日前まで)	
コシヒカリ	出穂前21~14日 モンガリット粒剤 3kg/10a	出穂前14~10日 イモチエーススタークル粒剤 3kg/10a	出穂後7~10日 スタークル粒剤 3kg/10a または スタークル豆つぶ 250g/10a		
	稻こうじ病 紋枯病・他 (収穫30日前まで)	いもち病・紋枯病 ウンカ類・カメムシ類 (収穫35日前まで)		カメムシ類他 (収穫7日前まで)	

ポジティブリスト制度に対応した農薬飛散防止対策を

水稻ほ場の近くに他の作物（なし、なす、きゅうり等）がある場合は、水稻の防除薬剤がこれらの作物にかかるないように、飛散防止対策をとって下さい。

- ① 散布時の風力、風向き、散布機の圧力調整などに注意する。
- ② 飛散しにくい粒剤に切り替える。

異常発生時の防除

(随時防除)

(10a当たり)

対象病害虫	薬剤名	防除時期	使用量
紋枯病	リンバー粒剤	出穂14~10日前 (収穫30日前まで)	3~4kg
紋枯病 稻こうじ病	モンガリット粒剤	出穂14~10日前 (収穫30日前まで)	3~4kg
いもち病	ブラシン粉剤DL	発生時 (収穫7日前まで)	3~4kg
稻こうじ病	Zボルドー粉剤DL	出穂20~10日前	3~4kg
コブノメイガ	トレボン粉剤DL	多発時 (収穫7日前まで)	3~4kg

令和7年 7月

～今月の1か月対策～
中干し後（幼穂形成期以降）から
出穂までの約1か月間は飽水管理

1	火
2	水
3	木
4	金
5	土
6	日
7	月
8	火
9	水
10	木
11	金
12	土
13	日
14	月
15	火
16	水
17	木
18	金
19	土
20	日
21	月 海の日
22	火
23	水
24	木
25	金
26	土
27	日
28	月
29	火
30	水
31	木


《稻こうじ病防除》

- 前年度、稻こうじ病の発生したほ場は必ずZボルドー粉剤DLを散布する。
- 発生したほ場では3年間継続して防除する。
- 穂ばらみ期に雨の多い場合は発生を助長するので、晴れ間をみて防除する。
- Zボルドー粉剤DLは薬害の恐れがあるため、出穂10日前以降の散布はしない。また、散布量(4kg/10a)を守り、均一に散布する。

追加除草の実施

カメムシの生息密度を下げるため、追加除草を実施する。

- 畦畔・農道等の雑草は7月上旬にもう1回、追加除草を行う。



8月

きめ細かな水管理と防除の徹底できれいなお米!!

カメムシ等害虫防除の徹底!!

◆粉剤散布の場合

防除時期	3回目防除	
	ゆめみづほ:8月上旬	コシヒカリ:8月中旬
薬剤名	スタークル粉剤DL	
使用量	3kg/10a	

◆粒剤散布の場合（粉剤散布できない所）


防除時期	ゆめみづほ:7月下旬	コシヒカリ:8月上旬
薬剤名	スタークル粒剤 3kg/10a	
使用量	または スタークル豆つぶ 250g/10a	

カメムシ粒剤防除におけるスタークル粒剤・豆つぶの使い方

- 散布適期…穂が出揃った時～穂が傾き始めた頃
- 散布方法…湛水状態(3～5cm)で均一に散布し、3～4日間は水の出し入れをしない。

品質向上のための水管理

- 刈取り5日前まで、飽水管理を継続する。
- 台風等によるフェーン現象時には、事前に通水する。
- 高温時は可能な限り、夜間の通水に努める。



乳白粒・脳割粒の発生を防止するために、きめ細かな水管理に努めましょう!!

適期刈取りで品質向上

- 穂数の85～90%が黄化した時期を目安とする(平年)。
- 出穂後の日数での目安

ゆめみづほ	34～38日頃
コシヒカリ	37～42日頃

飽水管理で良好な稲体

根部が健全であり、登熱も良い。




水不足の稲体

根部が不健全であり、乳白粒や着色粒が発生しやすい。また、早期落水で脳割粒が発生しやすい。



☆穂黄化率の目安



〈刈取り適期の目安〉

穂黄化率	平年	高温年
	85～90%	
	80～85%	80～85%

裏表紙に写真記載してありますので参考にして下さい。

- 最終防除後すみやかに、水稻生産履歴記録簿を提出しましょう。(営農ごよみ添付)

令和7年 8月

～今月の1か月対策～
出穂から刈取直前までの1か月以上は
①乾かさない ②ずっと溜めない
③すぐ落とさない

1	金
2	土
3	日
4	月
5	火
6	水
7	木
8	金
9	土
10	日
11	月 山の日
12	火
13	水
14	木
15	金
16	土
17	日
18	月
19	火
20	水
21	木
22	金
23	土
24	日
25	月
26	火
27	水
28	木
29	金
30	土
31	日

9月

適期収穫、適正な乾燥調製できれいなお米!!

◆万全な仕上げ6つのポイント

仕上乾燥は、ゆっくりと行う（毎時0.8%以下の乾減率が最適）▼



お米は、全量JAに出荷しましょう。

乾燥

- ・生粉は3時間以内に乾燥する。
- ・水分計の調整・点検は事前に行う。
- ・水分測定はこまめに行い、水分過多・過乾燥にならないよう15.0% (14.5~15.0%) に仕上げる。
- ・もち米は、一旦17%程度の状態で5~8時間おいてから、15%に仕上げる2段乾燥を行う。
- ・急激乾燥や高温乾燥は胴割米の発生原因になるので注意する。

粉すり

- ・肌ズレ米は、2度すり・水分過多・粉温が高いときに発生し易くなるので注意する。
- ・粉すり前の水分点検や機械の調整(ロール間隔・選別部)を行う。また、水分計の事前点検も必ず行う。
- ・品種にあった適正網目のライスグレーダーを使い、整粒歩合を80%以上に調製する。

網目	サイズ	品種名
LL	1.90mm	コシヒカリ、ゆめみづほ、もち類

※例年、もみ混入が目立ちます。調製はじめは、もみの混入が多いため、確認して多い場合は、最初の1袋に関しては、2度摺りを行って下さい。調製中は、2~3袋に1回はもみ混入の確認を行って下さい。

出荷

- ・包装は正しく行うこと。しっかり縛らないと、破袋・荷崩れの原因になる。また記載事項は明確に記入する。
- ・生産年度の訂正はできないので注意する。
- ・JAに出荷される場合は、皆掛け重量(30.5kg)の量目不足にならないように調整する。
- ・くず米、規格外米も全量JAに出荷しましょう。

注意!!

稻わら等の「野焼き」は原則として禁止されています。
やむを得ず焼却する場合は最寄りの消防署へ連絡してください。

問い合わせ先: 最寄りの消防署、または金沢市農業水産振興課 220-2213
金沢市ごみ減量推進課 220-2521

令和7年 9月	
1	月
2	火
3	水
4	木
5	金
6	土
7	日
8	月
9	火
10	水
11	木
12	金
13	土
14	日
15	月 敬老の日
16	火
17	水
18	木
19	金
20	土
21	日
22	月
23	火 秋分の日
24	水
25	木
26	金
27	土
28	日
29	月
30	火

異品種・異物混入防止を徹底しましょう

石川の米をご愛顧いただき
消費者・取引先の
信頼に応えていくために

使用前、品種が変わる際、使用後には
コンバイン・乾燥機・粉すり機を清掃し
異品種や異物の混入を防止しましょう

作業をする際の注意点

コンバイン

- 必ずエンジンを停止し、メインスイッチキーを抜いてください
- エンジン、マフラーが冷えてから作業してください
- 取り外したカバー類は、必ず元の位置に取り付けてください

乾燥機

- 必ず元電源のコネクタを抜いてください
- はずしたカバー、点検フタは、必ず元どおりに取り付けてください


粉すり機

- 各部の掃除は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてから行ってください
- はずしたカバー、点検フタは、必ず元どおりに取り付けてください


適正な乾燥・調製を行いましょう

- 玄米水分値は、14.5~15.0%に仕上げましょう
- 選別機の網目は、LL網(1.90mm)以上を使い、適正な流量で調製しましょう


コンバイン




乾燥機




選別計量機



粉すり機 (回転式)



粉すり機 (揺動式)



10月

稻づくりの基本は土づくり!!

土づくりで良質米競争に勝とう!!

金沢全域で土壤分析を実施した結果、全域で土壤の保肥力を高める腐植や、生育に重要なリン酸が不足しています。また、稻体を強くするために必要なケイ酸分も不足しています。これら不足成分を補うため、土づくりを実践し良質米競争に打ち勝ちましょう!!

土づくりの基本は、稻わらの全量還元と土づくり資材の秋施用です。

下記の図表を参考に積極的に継続して取り組もう!!


土壤分析の結果、良質米生産に重要な腐植・有効態リン酸・有効態ケイ酸が下記マップのとおり不足しています。

Aランク 現時点では目標値を上回っている地区（金沢市街、粟五、大野は除く）


Bランク 不足している地区

Cランク 極端に不足している地区。早急に補給が必要。


〈腐植〉



〈有効態リン酸〉



〈有効態ケイ酸〉



Aランク 3.0%以上
 Bランク 2.5%以上 3.0%未満
 Cランク 2.5%未満

Aランク 20mg以上
 Bランク 15mg以上 20mg未満
 Cランク 15mg未満
(乾土100g中)


Aランク 25mg以上
 Bランク 20mg以上 25mg未満
 Cランク 20mg未満
(乾土100g中)
(令和5年度 分析点数115点)

土づくりを継続して実施しましょう!!

※秋に施用し秋耕すること。できない場合は春施用しましょう。

	地 区 名	土づくり 資 材
腐植重点地区	金城、医王山、弓取、大場、金浦、才田、薬師、小坂、八田、川北、三谷、花園、潟津	コンポストエース 100kg/10a
リン酸重点地区	内川、浅川、金城、大場、金浦、才田、小坂、八田、川北、三谷、花園、潟津	BB良米健土 60kg/10a または BBひゃくまん馬力 60kg/10a
ケイ酸重点地区	薬師、湯涌、崎浦、医王山、才田、小坂、八田、川北、三谷、花園、潟津	BBスーパーけい酸 60kg/10a または BB良米健土 60kg/10a または BBひゃくまん馬力 60kg/10a

土づくり
の
ポイント



土づくり対策

(1) 有機物の還元・土づくり資材の秋施用

①稻わらは燃やさず、全量すき込む。

(10a分の稻わらは、堆肥1トンに相当します)

※稻わらの腐熟促進に、アグリ革命2kg/10aを同時施用すると効果的です。

②土づくり資材等の10a当たり施用の目安

資材名	基本施用量	備 考
BB スーパーけい酸 (リン酸・ケイ酸)	60kg	ケイ酸分は、稻体に吸収されやすいケイ酸を含んでいますので、茎・葉・根を丈夫にし耐倒伏性、耐病性を増大する効果があります。
BB パワフル大地 (リン酸・ケイ酸・腐植酸)	60kg	腐植酸・リン酸・ケイ酸・加里・苦土をバランスよく配合しており、10a当たり60kg(3袋)の施用で、堆肥150kg相当の効果が得られる省力施肥型水稻土づくり肥料
ようりん (リン酸・ケイ酸)	60kg	土壤の酸性をゆるやかに矯正する。根張りをよくし初期生育の促進、また有効分けつを多くする。健全な稻を育て多収の効果がある。
ケイカル (ケイ酸・カルシウム)	100kg	茎や葉がかたくなり、節間が徒長しないで倒伏しにくくなる。下葉の枯れ上がりが少なくなり、登熟がよくなる。病害虫に対して強くなる。根ぐされ、秋落ちを防ぎます。
アグリ革命	2kg	稻わらを腐熟化し、地力の増強に役立たせます。フラエースの代替品

(2) 秋耕と排水対策

①有機物、土づくり資材施用後、速やかに耕起(5cm程度の浅耕)する。

②稻わら等有機物の分解を促進するため、排水溝を設置し、ほ場内に水が溜まらないようにする。

環境に配慮して、稻わら等は燃やさないようにしましょう。

令和7年 10月

1 水	
2 木	
3 金	
4 土	
5 日	
6 月	
7 火	
8 水	
9 木	
10 金	
11 土	
12 日	
13 月	スポーツの日
14 火	
15 水	
16 木	
17 金	
18 土	
19 日	
20 月	
21 火	
22 水	
23 木	
24 金	
25 土	
26 日	
27 月	
28 火	
29 水	
30 木	
31 金	

明日の農業をめざして、農地の有効利用を応援します

(参考)

令和6年度 農作業基本料金(平坦地基準)

アグリサポートセンター

区分	金額(円) 消費税込	備考
☆荒起し	6,600	10a当たり
☆代かき	8,800	10a当たり
☆田植	普通 9,350	10a当たり(肥料・農薬を同時散布しない田植のみ単価)
	側条 10,450	10a当たり(肥料を同時散布する単価)
苗運搬	66	1箱当たり
箱洗い・乾燥	55	1箱当たり
散布作業(防除、施肥)	2,200	10a当たり(農薬、肥料、資材は実費負担が必要です)
散布作業(防除)	11,000	10a当たり(薬剤等は実費負担が必要です ほ場内からの動力噴霧機による散布単価)
☆コンバイン刈取り	24,200	10a当たり
ばら糀運搬	2,970	10a当たり(ライスセンターへの糀搬入)
機械畦塗り	8,800	100m当たり(四隅は塗れません)
除草剤散布	13,200	10a当たり(畦畔、農道は散布できません)
草刈(手作業)	16,500	10a当たり(刈払による作業)
	33,000	10a当たり(作業難易度が高い場合)
草刈(乗用機械)	11,000	10a当たり(運搬費として、別途5,500円(税込)が必要です)

注・☆印の作業については、ほ場条件等によって割増料金をいただきます。

・作業機械(トラクター、田植機、コンバイン等)の運搬代金として、別途5,500円(税込)が必要です。



ほ場条件による割増

▼面積によるもの

区画の大きさ	加算率
4a~5a未満	30%
4a未満	50%

▼作業難易度によるもの

区分	加算率
A	20%
B	35%
C	50%

稻作作業省力化を目指して!

JAが提案する今後の稻作省力体系



施肥省力化

①基肥施用

田植同時側条施肥機による、基肥一発肥料施用(基肥一発肥料は、穂肥施用を省力化します。)

②省力土づくり資材

BBパワフル大地…10a当たり60kg(3袋) 施用で、堆肥150kg相当の効果が得られます。

③水稻育苗マット

育苗箱の軽量化(特に田植時の運搬労力軽減)



カソロン粒剤6.7散布風景

畦畔除草の省力化

カソロン粒剤6.7の秋冬散布により畦畔の長期抑草が図れます。

・ザクサ液剤+ダイロンゾルの混用

ザクサ液剤のすばやく枯らす力とダイロンゾルの再生を抑える力で長期抑草防除が図れます。これにより、夏場の除草から解放され、カメムシ被害の軽減にもつながります。



直播のは種作業

直播栽培

苗づくり、苗の運搬等が省けます。

除草剤散布省力化

田植同時除草剤散布機による除草剤の散布

散布方法	散布機名	区分	主な処理可能除草剤名	規格
粒剤散布	こまきちゃん 及び イノベーター	初・中期一発剤	バッチャリ1キロ粒剤	1kg・10kg
			アシュラ1キロ粒剤	1kg・10kg

※田植機によって取付け出来ない散布機がありますので、JAにご相談下さい。

※散布機及び除草剤によって開度が異なりますので、JAにご確認下さい。

防除省力化

①田植同時箱施薬剤施用

専用散布機(箱まきちゃん)による箱施薬剤の田植同時処理

②基幹防除の粒剤散布処理(動散で一人で処理可能、粉剤処理不可能地区)

〈紋枯病・いもち病・ウンカ類・カメムシ類〉…………イモチエーススタークリ粒剤
〈カメムシ類〉…………スタークリ粒剤

③基幹防除の豆つぶ散布処理(動散を使わずに、畦から手またはひしゃくで散布可能。)

〈カメムシ類〉…………スタークリ豆つぶ



田植同時除草剤散布

BB肥料側条基肥開度目安表

- 調節は肥料を入れる前に行い、開度は最初小さめに設定し、多肥にならないよう注意してください。
- この開度はあくまでも目安を示したもので、車輪のスリップ率などにより施肥量が変わりますので、実際に施肥作業を行い、施肥量を確認し、目標に合うよう再度施肥量を調整してください。

主なBB水稻基肥側条銘柄の仮比重


対象銘柄	仮比重	目安表での参照
BB コシ一発くんDX24	0.85	各コシ一発くん
BB コシ一発くんNEO β	0.85	
BB 新コシ一発くん特号	0.92	
BB けい酸パワー・コシ一発くん	0.96	
BB けい酸アップ・コシ一発くん	0.91	
BB 有機入り820号(みさと)	0.83	
BB いしかわ有機入り056号	0.90	各コシ基肥
BB 早生一発くんDX28	0.84	早生一発くん
BB 早生一発くんNEO	0.85	
BB スリム早生一発くん	0.84	
BB 有機入りコシ一発くん	0.80	有機入りコシ一発くん
BB 003-40号(側条用)	0.95	側条用003-40号

※「基肥一発肥料」は、樹脂でコーティングした肥料を配合しているため、一般的の肥料に比べ粒径は大きく、仮比重が小さくなっています。そのため側条施肥の場合、開度調整に注意が必要です。全量一括施肥という特性も踏まえ、必ず目盛りと実際の施肥量をチェックしてください。

クボタ田植機用

機種名 WDシリーズ、EPシリーズ、ZPシリーズ

開度調節ツマミ



比重区分ラベル

10回転 繰出し量(g)	~359	360~420	421~
使用目盛り	区分(比重) 小	区分(比重) 標準	区分(比重) 大

施肥量調節目安表

10回転 繰出し量(g)	~359	360~420	421~
使用目盛り	区分(比重) 小	区分(比重) 標準	区分(比重) 大


開度目安

各コシ一発くん、各コシ基肥、早生一発くん、有機入りコシ一発くん、側条用003-40号
→比重区分を「区分(比重)小」に合わせ、施肥量を調整する。

クボタ田植機用

機種名 SPUタイプ、SPDタイプ、NSUタイプ、WPタイプ

開度調節ツマミ



1AKACAZAP131A


開度目安

各コシ一発くん、各コシ基肥、早生一発くん、有機入りコシ一発くん、側条用003-40号
→ふたつ多めの目盛を使用 (例) 25kg/10a施肥の場合、30の目盛を使用

クボタ田植機用

機種名 SPA(ミッド施肥)タイプ

開度調節ツマミ



開度目安表 ~10a当たり施肥量(kg)の目安~

●60株の場合

ロール開度	駆動ロッドA								駆動ロッドB			
	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	3.5	4.0	4.5	5.0
標準	17	21	24	28	31	35	39	42	41	48	54	60
各コシ一発くん 各コシ基肥 早生一発くん 有機入りコシ一発くん 側条用003-40号	14	16	19	21	24	28	30	32	32	37	42	48

●50株の場合

ロール開度	駆動ロッドA								駆動ロッドB			
	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	3.5	4.0	4.5	5.0
標準	15	18	21	24	27	30	33	36	36	41	46	53
各コシ一発くん 各コシ基肥 早生一発くん 有機入りコシ一発くん 側条用003-40号	12	13	16	18	20	23	25	27	27	31	35	40


※標準は田植機に記載の標準的な開度目盛

クボタ田植機用


■機種名 NWシリーズ

■施肥量調節


- 計量 ①平たんな場所に機械を止め、植え付け部を最上昇位置から少し下げた位置でエンジン停止。
 ②右側2条分(プロアと反対側)のホッパ内に肥料を入れ、施肥ホースを取り外しバケツ等空の容器に移動。
 ③エンジンを始動し、右側のあぜぎわスイッチのみ「入」(ライト点灯)状態にします。
 ④ホッパ右側にある計量ボタンを押すと、施肥ホースから肥料が排出されます。
 ※1回目の計量データはロールの溝に肥料が十分に溜まっている恐れがあるので、2回目の計量データを参考することを推奨します。




(1) ホッパ (右側 2 条分)



(1) 施肥ホース (右側 2 条分) (A) 移動する
 (2) バケツなど空の容器



(1) あせぎわスイッチ (右側 2 条分) (2) あせぎわスイッチ (右側 2 条分以外)



(1) 計量ボタン

計量方法の詳細につきましては、取り扱い説明書の「施肥量調節」の項目をご覧ください。

施肥量設定

パネルのメイン画面「施肥」の項目を選択いただき、計量結果と施肥量を入力してください。



メイン画面



[施肥]




スイッチボックス

※施肥量は1kg/10a単位で調整できます。
 計量値は5g単位で変更できます。

ヰセキ田植機用

■機種名 PG53/63/73/83、PZ50/60/70/80/100

■開度調節ツマミ (田植機の背中にツマミがある)



■開度目安表 ~10a当たり施肥量(kg)の目安~

●60株/50株の場合


施肥量開度(kg)	20	25	30	35	40	45	50	55	60
標準	20	25	30	35	40	45	50	55	60
各コシ一発くん	17	20	23	27	31	36	40	44	48
各コシ基肥									
早生一発くん									
有機入りコシ一発くん									
側条用003-40号									

※標準は田植機に記載の標準的な目盛(作動ロッドは標準位置)

ヰセキ田植機用

■機種名 PQ4/5、PQZ4/5

■開度調節ツマミ
 (田植機の背中に
 開度調節ツマミがある)



■開度目安表 ~10a当たり施肥量(kg)の目安~

●60株/50株の場合

施肥量開度(kg)	作動ロッド少量位置		作動ロッド標準位置							
	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
標準	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
各コシ一発くん										
各コシ基肥										
早生一発くん										
有機入りコシ一発くん										
側条用003-40号										

※標準は田植機に記載の標準的な目盛(30kg/10a以下で施肥する場合は作動ロッドを少量位置に切替えて作業してください)

ヰセキ田植機用

■機種名 PA(F1)53/63/83、PG(F1)5/6/8

■開度調節ツマミ

(田植機のサイドに
開度調節ツマミがある)



■開度目安表 ~10a当たり施肥量(kg)の目安~

●60株の場合

開度(mm)	4	6	8	10	12	14	16	18
標準	14	19	21	26	33	39	44	47
各コシ一発くん								
各コシ基肥								
早生一発くん	15	20	24	27	30	33	36	39
有機入りコシ一発くん								
側条用003-40号								

※標準は田植機に記載の標準的な目盛(比重0.9未満の肥料)

●50株の場合

開度(mm)	4	6	8	10	12	14	16	18
標準	13	17	20	24	27	30	35	38
各コシ一発くん								
各コシ基肥								
早生一発くん	13	17	20	23	25	28	30	33
有機入りコシ一発くん								
側条用003-40号								

ヰセキ田植機用

■機種名 NPシリーズ、PRシリーズ(ガソリン仕様)

■開度調整ツマミ



■開度目安表 ~10a当たり施肥量(kg)の目安~

●60株/50株の場合


開度	開度								
	30	35	40	45	50	55	60	65	70
標準	30	35	40	45	50	55	60	65	70
BB各一発	24	28	32	36	41	45	49	53	57
BB分施基肥	28	32	37	41	46	51	55	60	64

ヰセキ田植機用

■機種名 PA50/60/80、PG(MF)5/6/8

■開度調節ツマミ

(田植機のサイドに
開度調節ツマミがある)



■開度目安表 ~10a当たり施肥量(kg)の目安~

●60株の場合

開度(mm)	10	12	14	16	18	20	22
標準	25	30	35	40	45	50	54
各コシ一発くん							
各コシ基肥							
早生一発くん	19	22	26	30	34	35	42
有機入りコシ一発くん							
側条用003-40号							

※標準は田植機に記載の標準的な目盛(比重0.9未満の肥料)

●50株の場合

開度(mm)	10	12	14	16	18	20	22
標準	21	25	29	33	38	42	45
各コシ一発くん							
各コシ基肥							
早生一発くん	16	18	22	25	28	29	35
有機入りコシ一発くん							
側条用003-40号							

ヰセキ田植機用

■機種名 PR・PRJ(DF)

■調節方法 今回の田植機では、従来の田植機と異なり比重or試し繰出量を入力しますと、設定した施肥量に合わせて自動で施肥量を調節します。



比重or試し繰出量
を入力

■試し繰出量参考値



仮比重	BB各一発				BB分施
	0.9~0.94	0.85~0.9	0.8~0.85	~0.8	
試し繰出量	178	168	160	152	192

※施肥量を調節する際は、比重もしくは試し繰出量を入力ください。

ヤンマー田植機用

■機種名 RJタイプ、RGタイプ、YRタイプ

■開度調節ツマミ



■開度目安表 ~10a当たり施肥量(kg)の目安~

●60株の場合

施肥量目盛	少量ギヤ(黒)			標準ギア(白)		
	5	8	11	3	5	7
標準	20	27	35	39	52	64
各コシ一発くん 各コシ基肥 早生一発くん 有機入りコシ一発くん 側条用003-40号	17	24	32	37	48	60

●50株の場合


施肥量目盛	少量ギヤ(黒)			標準ギア(白)		
	5	8	11	3	5	7
標準	17	23	29	33	43	53
各コシ一発くん 各コシ基肥 早生一発くん 有機入りコシ一発くん 側条用003-40号	14	20	27	31	40	50

※標準は田植機に記載の標準的な目盛(肥料のかさ比重が0.9の場合)

ヤンマー田植機用

■機種名 YR-Dタイプ

■開度調節ツマミ



■開度目安表 ~10a当たり施肥量(kg)の目安~

●60株/50株の場合


施肥量目盛	2.2	3.3	4.4	5.4	6.5	7.5
標準	20	30	40	50	60	70
各コシ一発くん 各コシ基肥 早生一発くん 有機入りコシ一発くん 側条用003-40号	18	27	36	45	54	63

※標準は田植機に記載の標準的な目盛(肥料のかさ比重が0.9の場合)

ヤンマー田植機用

■機種名 VP40~80C・X・D、VP4~8・VPD・VP5~6C等、VP(ミッド施肥)タイプ

■開度調節ツマミ インジゲータ



■開度目安表 ~10a当たり施肥量(kg)の目安~

●60株の場合

施肥量目盛	2	3	4	5	6	7	8	9
標準	9	13	20	26	31	40	48	56
各コシ一発くん 各コシ基肥 早生一発くん 有機入りコシ一発くん 側条用003-40号	5	11	18	25	31	38	44	50

●50株の場合

施肥量目盛	2	3	4	5	6	7	8	9
標準	8	11	17	22	26	33	40	47
各コシ一発くん 各コシ基肥 早生一発くん 有機入りコシ一発くん 側条用003-40号	4	9	15	21	26	32	37	42

※標準は田植機に記載の標準的な目盛(肥料のかさ比重が0.9の場合)

✖ ⚡

✖ ⚡

消費者・実需者から選ばれる産地になるために

ギャップ

GAPに取組みましょう

1. GAP (Good Agricultural Practice) って何?

GAPとは、直訳すると「良い農業の実践」となり、未来に渡って持続的な農業生産活動を行うために必要な取組みのことで、「適正農業規範」と称しています。

この良い農業を実践するためには農業者等は、「安全な農産物の生産」や「環境の保全」、「農業者の安全確保」などを目標として、生産から出荷までの生産工程における危害を未然に防ぐための持続的な改善活動に取組むことが求められています。

また、GAPについては、グローバルGAPやJGAP等専門的な知識を持った第三者が認証するGAP認証取得の取り組みがありますが、農家の皆様におかれましては、まずご自身の経営改善に資する取り組みとしてGAP実践活動のご協力をお願いします。

2. GAPの目的と効果

目的1 適正な農業の実践

- ①「安全な農産物の生産」
- ②「環境の保全」
- ③「農業者の安全確保」

目的2 信頼性の向上

農場のルールの明確化や記録の徹底により、消費者等への的確な情報提供が可能となり、産地の評価や信頼性の向上につながります。

GAPは、すでに、生産者の皆さんが実践していることがほとんどです。

しかし、これまでの農業生産活動では経験や勘に頼り、客観的に確認できない(見えない)部分が多く、より良い農業を目指すためには、生産工程に応じた危害防止のための点検を行い、対策をルール化し、必要な場合は文書に残すことが大切です。

3. 具体的に何をすればいいの?

“GAP”を決定づけるのは、不適切な農業行為である“BAP”です。

実践している農業生産活動の中に問題がある(悪い)部分を改善(正しく)することが必要で、どこが問題なのか、なぜ問題なのか、どうすれば良いのかを明らかにすることが重要です。



そのためにも、まずは、JAから配布される自己点検シートを用いて、自らの農場においてBAP(不適切な農業行為)になっているところがないか自己点検することから始めましょう。

(自己点検シートの例)

区分	番号	点検項目	チェック時期の目安	対象	自己点検チェック	取組効果
當農計画	1	當農座談会への参加や栽培暦の活用等今年の栽培(作付)計画を立てている。	3月	全生産者	<input checked="" type="checkbox"/>	・安全な農産物が生産、情報の把握や共有ができる。
	2	「安心・安全な農産物づくり」を意識して農業に取り組んでいる。	随時	全生産者	<input checked="" type="checkbox"/>	・安全な農産物が生産できる。
JA米	3	JA米の要領をよく理解している。(品種のはっきりした種子、農産物検査受検、栽培履歴記帳、水分15.5%以下)	3月	全生産者	<input checked="" type="checkbox"/>	・安全な農産物が生産できる。
	4	納屋や作業場の清掃は徹底している。	随時	全生産者	<input checked="" type="checkbox"/>	・安全な農産物の生産、異物混入の防止が図れる。
	5	農薬は整理整頓し適正に保管している。	随時	全生産者	<input checked="" type="checkbox"/>	・安全な農産物の生産ができる。
	6	ガソリン、混合油は専用の容器を使用するとともに、火気のない場所で保管している。	随時	全生産者	<input checked="" type="checkbox"/>	・安全な農産物の生産ができる。
	7	納屋や作業場にネズミ駆除剤を使用せず、適正な対策を行っている。	随時	全生産者	<input checked="" type="checkbox"/>	・安全な農産物の生産、異物混入の防止が図れる。
	8	被覆殻のほ場外流出防止にむけ、自然落水や水戻ネット設置を行っている。	随時	全生産者	<input checked="" type="checkbox"/>	・安全な農産物の生産ができる。


4. GAPの取組みの実践ステップ

自己点検シートを用いて、自らの農場において“BAP”になっているところがないか確認しましょう。




自己点検結果を基に、農場におけるBAPの改善に取り組みましょう。

改善事項や農場ルールを全作業員が共有し、そのうえで農作業を実践しましょう。また、新たなBAPや改善可能なことに気づけば、記録に残すとともに関係者で共有し改善しましょう。



日々の活動や点検結果から、改善すべきところを見つけ、関係者全員でGAPに取り組みましょう。



実践後、BAPが改善されているか点検しましょう。また、自分一人の点検でなく、産地の仲間や外部の人にも点検・評価してもらうとGAPへの近道になります。

令和7年産石川県産米 自己点検(GAP)チェックシート

町名: ○○町 氏名: 金沢 太郎

JAグループ石川

(記入例)

※設問に該当する場合はチェック欄にチェックしてください。

区分	番号	点検項目	チェック 時期の目安	対象	自己点検 チェック <input checked="" type="checkbox"/>	二重点検 チェック <input checked="" type="checkbox"/>	取組効果
営農計画	1	営農座談会への参加や栽培暦の活用等今年の栽培(作付)計画を立てている。	3月	全生産者	✓		・安全な農産物が生産、情報の把握や共有ができる。
	2	「安心・安全な農産物づくり」を意識して農業に取り組んでいる。	随時	全生産者			・安全な農産物が生産できる。
JA米	3	JA米の要領をよく理解している。 (品種のはっきりした種子、農産物検査受検、栽培履歴帳、水分15.5%以下)	3月	全生産者	✓		・安全な農産物が生産できる。
栽培準備	4	納屋や作業場の清掃は徹底している。	随時	全生産者			・安全な農産物の生産、異物混入の防止が図れる。
	5	農薬は整理整頓し適正に保管している。	随時	全生産者	✓		・安全な農産物の生産ができる。
	6	ガソリン、混合油は専用の容器を使用するとともに、火気のない場所で保管している。	随時	全生産者			・安全な農産物の生産ができる。
	7	納屋や作業場にネズミ駆除剤を使用せず、適正な対策を行っている。	随時	全生産者			・安全な農産物の生産、異物混入の防止が図れる。
	8	被覆殻のほ場外流出防止にむけ、自然落水や水戻ネット設置を行っている。	随時	全生産者			・安全な農産物の生産ができる。
土づくり	9	有機物や土壤改良資材の施用、深耕、排水性の改良などの土づくりを実施し、施肥改善に努めている。	~4月	全生産者	✓		・安全な農産物の生産、環境負荷の低減が図れる。
育苗	10	購入した種子および苗の品種・数量を確認している。	3月	全生産者			・安全な農産物の生産、品質間違いの防止が図れる。
	11	種子消毒済みの余った種子や消毒液は適正に処分している。	3月	自家育苗の方			・安全な農産物の生産、環境負荷の低減が図れる。
	12	育苗ハウスの苗は、品種がわかるように管理している。	4~5月	自家育苗の方			・安全な農産物の生産、品質間違いの防止が図れる。
栽培	13	今年の栽培暦、営農情報はいつでも見られるようになっている。	5月	全生産者	✓		・安全な農産物の生産、情報の把握や共有ができる。
	14	田植の際には、品種確認をしっかりと行っている。	5月	全生産者	✓		・安全な農産物の生産、品質間違いの防止が図れる。
	15	水稻除草剤を使用後、基準の期間は止め水管理を行っている。	5月	全生産者	✓		・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。
	16	肥料は、施肥基準を確認し、生育に合わせて適正に施用している。	随時	全生産者	✓		・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。
	17	農薬の飛散・流出防止の観点から、ほ場周辺の作付け状況を確認している。	随時	全生産者			・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。
	18	農薬は、営農情報やラベルを確認し、使用量、時期、回数を遵守している。	随時	全生産者	✓		・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。
	19	農薬散布は、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯に行っている。	随時	全生産者	✓		・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。
	20	農薬を使用する前に風の強さや向きを確認し、適正な散布圧力や風量で住宅や周辺作物等への飛散防止に努めている。	随時	全生産者			・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。
	21	農薬散布前後には、防除器具を十分に洗浄し、破損個所がないか点検している。	随時	全生産者	✓		・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。

※チェック項目全てを達成することが目的ですが、現段階において出来ていない項目には、チェック□をしないでください。

※チェックシートを点検することで、翌年度の生産に向けて改善点を見つけることも大きな目的のひとつです。

※今年出来なかったことを、翌年度には実行、改善するように心がけてください。

※チェック欄については、自己点検は生産者で行い、JAの営農指導員等が二重点検を行うなどして活用ください。

二重点検を行うことで、より正確に改善点を見つけることができます。

※実際のチェック項目は1~41まであります。

令和7年産石川県産米 自己点検(GAP)チェックシート

町名: 氏名: JAグループ石川

生産者控

※設問に該当する場合はチェック欄にチェックしてください。

区分	番号	点検項目	チェック時期の目安	対象	自己点検チェック <input checked="" type="checkbox"/>	取組効果
営農計画	1	営農座談会への参加や栽培暦の活用等今年の栽培(作付)計画を立てている。	3月	全生産者		・安全な農産物が生産、情報の把握や共有ができる。
	2	「安心・安全な農産物づくり」を意識して農業に取り組んでいる。	隨時	全生産者		・安全な農産物が生産できる。
JA米	3	JA米の要領をよく理解している。(品種のはっきりした種子、農産物検査受検、栽培履歴記帳、水分15.5%以下)	3月	全生産者		・安全な農産物が生産できる。
栽培準備	4	納屋や作業場の清掃は徹底している。	隨時	全生産者		・安全な農産物の生産、異物混入の防止が図れる。
	5	農薬は整理整頓し適正に保管している。	随时	全生産者		・安全な農産物の生産ができる。
	6	ガソリン、混合油は専用の容器を使用するとともに、火気のない場所で保管している。	随时	全生産者		・安全な農産物の生産ができる。
	7	納屋や作業場にネズミ駆除剤を使用せず、適正な対策を行っている。	随时	全生産者		・安全な農産物の生産、異物混入の防止が図れる。
	8	被覆殻のほ場外流出防止にむけ、自然落水や水戻ネット設置を行っている。	随时	全生産者		・安全な農産物の生産ができる。
土づくり	9	有機物や土壤改良資材の施用、深耕、排水性の改良などの土づくりを実施し、施肥改善に努めている。	~4月	全生産者		・安全な農産物の生産、環境負荷の低減が図れる。
育苗	10	購入した種子および苗の品種・数量を確認している。	3月	全生産者		・安全な農産物の生産、品質間違いの防止が図れる。
	11	種子消毒済みの余った種子や消毒液は適正に処分している。	3月	自家育苗の方		・安全な農産物の生産、環境負荷の低減が図れる。
	12	育苗ハウスの苗は、品種がわかるように管理している。	4~5月	自家育苗の方		・安全な農産物の生産、品質間違いの防止が図れる。
栽培	13	今年の栽培暦、営農情報はいつでも見られるようにしている。	5月	全生産者		・安全な農産物の生産、情報の把握や共有ができる。
	14	田植の際には、品種確認をしっかり行っている。	5月	全生産者		・安全な農産物の生産、品質間違いの防止が図れる。
	15	水稻除草剤を使用後、基準の期間は止め水管理を行っている。	5月	全生産者		・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。
	16	肥料は、施肥基準を確認し、生育に合わせて適正に施用している。	随时	全生産者		・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。
	17	農薬の飛散・流出防止の観点から、ほ場周辺の作付け状況を確認している。	随时	全生産者		・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。
	18	農薬は、営農情報やラベルを確認し、使用量、時期、回数を遵守している。	随时	全生産者		・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。
	19	農薬散布は、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯に行っている。	随时	全生産者		・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。
	20	農薬を使用する前に風の強さや向きを確認し、適正な散布圧力や風量で住宅や周辺作物等への飛散防止に努めている。	随时	全生産者		・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。
	21	農薬散布前には、防除器具を十分に洗浄し、破損個所がないか点検している。	随时	全生産者		・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。

※チェック項目全てを達成することが目的ですが、現段階において出来ていない項目には、チェックをしないでください。

※チェックシートを点検することで、翌年度の生産に向けて改善点をみつけることも大きな目的のひとつです。

※今年出来なかったことを、翌年度には実行、改善するように心がけてください。

※チェック欄については、自己点検は生産者で行い、JAの営農指導員等が二重点検を行うなどして活用ください。

二重点検を行うことで、より正確に改善点をみつけることができます。

令和7年産石川県産米 自己点検(GAP)チェックシート

町名: 氏名: JAグループ石川

※設問に該当する場合はチェック欄にチェックしてください。

区分	番号	点検項目	チェック時期の目安	対象	自己点検チェック <input checked="" type="checkbox"/>	二重点検チェック <input checked="" type="checkbox"/>	取組効果
営農計画	1	営農座談会への参加や栽培暦の活用等今年の栽培(作付)計画を立てている。	3月	全生産者			・安全な農産物が生産、情報の把握や共有ができる。
	2	「安心・安全な農産物づくり」を意識して農業に取り組んでいる。	随时	全生産者			・安全な農産物が生産できる。
JA米	3	JA米の要領をよく理解している。(品種のはっきりした種子、農産物検査受検、栽培履歴記帳、水分15.5%以下)	3月	全生産者			・安全な農産物が生産できる。
栽培準備	4	納屋や作業場の清掃は徹底している。	随时	全生産者			・安全な農産物の生産、異物混入の防止が図れる。
	5	農薬は整理整頓し適正に保管している。	随时	全生産者			・安全な農産物の生産ができる。
	6	ガソリン、混合油は専用の容器を使用するとともに、火気のない場所で保管している。	随时	全生産者			・安全な農産物の生産ができる。
	7	納屋や作業場にネズミ駆除剤を使用せず、適正な対策を行っている。	随时	全生産者			・安全な農産物の生産、異物混入の防止が図れる。
	8	被覆殻のほ場外流出防止にむけ、自然落水や水戻ネット設置を行っている。	随时	全生産者			・安全な農産物の生産ができる。
土づくり	9	有機物や土壤改良資材の施用、深耕、排水性の改良などの土づくりを実施し、施肥改善に努めている。	~4月	全生産者			・安全な農産物の生産、環境負荷の低減が図れる。
育苗	10	購入した種子および苗の品種・数量を確認している。	3月	全生産者			・安全な農産物の生産、品質間違いの防止が図れる。
	11	種子消毒済みの余った種子や消毒液は適正に処分している。	3月	自家育苗の方			・安全な農産物の生産、環境負荷の低減が図れる。
	12	育苗ハウスの苗は、品種がわかるように管理している。	4~5月	自家育苗の方			・安全な農産物の生産、品質間違いの防止が図れる。
栽培	13	今年の栽培暦、営農情報はいつでも見られるようにしている。	5月	全生産者			・安全な農産物の生産、情報の把握や共有ができる。
	14	田植の際には、品種確認をしっかり行っている。	5月	全生産者			・安全な農産物の生産、品質間違いの防止が図れる。
	15	水稻除草剤を使用後、基準の期間は止め水管理を行っている。	5月	全生産者			・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。
	16	肥料は、施肥基準を確認し、生育に合わせて適正に施用している。	随时	全生産者			・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。
	17	農薬の飛散・流出防止の観点から、ほ場周辺の作付け状況を確認している。	随时	全生産者			・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。
	18	農薬は、営農情報やラベルを確認し、使用量、時期、回数を遵守している。	随时	全生産者			・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。
	19	農薬散布は、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯に行っている。	随时	全生産者			・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。
	20	農薬を使用する前に風の強さや向きを確認し、適正な散布圧力や風量で住宅や周辺作物等への飛散防止に努めている。	随时	全生産者			・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。
	21	農薬散布前には、防除器具を十分に洗浄し、破損個所がないか点検している。	随时	全生産者			・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。

※チェック項目全てを達成することが目的ですが、現段階において出来ていない項目には、チェックをしないでください。

※チェックシートを点検することで、翌年度の生産に向けて改善点をみつけることも大きな目的のひとつです。

※今年出来なかったことを、翌年度には実行、改善するように心がけてください。

※チェック欄については、自己点検は生産者で行い、JAの営農指導員等が二重点検を行うなどして活用ください。

二重点検を行うことで、より正確に改善点をみつけることができます。

〈裏面にも記入欄あります〉

提出用

令和7年産石川県産米 自己点検(GAP)チェックシート

町名: 氏名: JAグループ石川

提出用

※設問に該当する場合はチェック欄にチェックしてください。

区分	番号	点検項目	チェック時期の目安	対象	自己点検チェック <input checked="" type="checkbox"/>	二重点検チェック <input checked="" type="checkbox"/>	取組効果
履歴管理	22	種子や苗・肥料・農薬の購入伝票を保存し、使用状況を栽培履歴簿に記入している。	随時	全生産者			・安全な農産物の生産、消費者等からの情報開示に対応できる。
収穫前	23	収穫前に、乾燥機や粉碎機の清掃と点検をしっかりと行っている。	8月	自家乾燥の方			・安全な農産物の生産、異物混入の防止が図れる。
	24	出穫期以降散布する農薬は収穫前使用可能日数を必ず確認している。	8月	全生産者			・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。
	25	品種の切替時には、コンバインの清掃をしっかりと行っている。	9月	全生産者			・安全な農産物の生産、異品種混入の防止が図れる。
	26	収穫及び乾燥調製作業時に異種穀粒や石、金属等の異物が混入しないように注意して作業している。	9月	全生産者			・安全な農産物の生産、異物混入の防止が図れる。
収穫後の管理	27	適期刈取りに努めるとともに、収穫後は速やかに施設に搬入している。	9月	施設利用の方			・安全な農産物の生産、発酵による変質事故の防止が図れる。
	28	適期刈取りに努めるとともに、収穫後は速やかに乾燥機に張り込み、適切な温度管理で乾燥している。	9月	自家乾燥の方			・安全な農産物の生産、発酵による変質事故の防止が図れる。
	29	乾燥機、粉碎機、選別機は品種の切り替えごとに清掃している。	9月	自家乾燥の方			・安全な農産物の生産、異品種混入の防止が図れる。
	30	粉碎、選別等の作業は、作業着、帽子、履物等清潔な衣類を着て行っている。	9月	自家乾燥の方			・安全な農産物の生産、異物混入の防止が図れる。
	31	ネズミや野鳥、部外者などが作業場及び米穀の保管場所に入らないようにしている。	9月~	自家乾燥の方			・安全な農産物の生産、異物混入の防止が図れる。
	32	収穫後の稻わらは焼却せず、有機物の補給としてほ場にすき込んでいる。	9月~	全生産者			・安全な農産物の生産、持続的な農地の保全が図れる。
	33	JA出荷契約を結んだ米は確実にJAに出荷している。	9月	全生産者			・安定販売の取組、消費者等の信頼が確保できる。
	34	出荷に関して、米穀の名称、産地、数量、年月日、相手方の氏名又は名称等きちんと整理し、その記録を原則3年間保存している。	9月	自家乾燥の方			・法令が遵守できるとともに、消費者等への信頼が確保できる。
	35	米は用途（加工用、飼料用、非食用など）や品種ごとに明確に区分して保管・販売・処分している。	9月	自家乾燥の方			・法令が遵守できるとともに、消費者等の信頼が確保できる。
労働安全	36	作業場やほ場などの危険な箇所（高所、段差等）を把握し、作業手順や機械・器具類の使用方法について適切に理解し農作業を行っている。	随時	全生産者			・ケガや事故を防止し、安全な農作業を行なうことができる。
	37	必要に応じて免許の取得または講習を受講し、運転や操作、取扱い（貨物積載量等）については法令等に準拠している。	随時	全生産者			・ケガや事故を防止し、安全な農作業を行なうことができる。
環境保全	38	使用済み薬剤の空き容器や、不要になったビニール等は適切に廃棄している。	随時	全生産者			・環境への負荷を軽減できる。
	39	代かき後等の濁った水が、ほ場外に流れないようにしている。	随時	全生産者			・環境への負荷を軽減できる。
全般	40	GAPに関して時期毎に点検を実施し、改善の必要な部分の見直しをおこなっている。	随時	全生産者			・安全な農産物の生産、消費者等の信頼が確保できる。
	41	今年の米づくりの反省点をまとめている。	随時	全生産者			・安全な農産物の生産、消費者等の信頼を確保できる。

※チェック項目全てを達成することが目的ですが、現段階において出来ていない項目には、チェックをしないでください。

※チェックシートを点検することで、翌年度の生産に向けて改善点をみつけることも大きな目的のひとつです。

※今年出来なかったことを、翌年度には実行、改善するように心がけてください。

※チェック欄については、自己点検は生産者で行い、JAの営農指導員等が二重点検を行うなどして活用ください。

二重点検を行うことで、より正確に改善点をみつけることができます。

令和7年産石川県産米 自己点検(GAP)チェックシート

町名: 氏名: JAグループ石川

生産者控

※設問に該当する場合はチェック欄にチェックしてください。

区分	番号	点検項目	チェック時期の目安	対象	自己点検チェック <input checked="" type="checkbox"/>	取組効果
収穫前	22	種子や苗・肥料・農薬の購入伝票を保存し、使用状況を栽培履歴簿に記入している。	随時	全生産者		・安全な農産物の生産、消費者等からの情報開示に対応できる。
	23	収穫前に、乾燥機や粉碎機の清掃と点検をしっかりと行っている。	8月	自家乾燥の方		・安全な農産物の生産、異物混入の防止が図れる。
	24	出穫期以降散布する農薬は収穫前使用可能日数を必ず確認している。	8月	全生産者		・安全な農産物の生産、環境負荷が低減できる。
	25	品種の切替時には、コンバインの清掃をしっかりと行っている。	9月	全生産者		・安全な農産物の生産、異品種混入の防止が図れる。
収穫後の管理	26	収穫及び乾燥調製作業時に異種穀粒や石、金属等の異物が混入しないように注意して作業している。	9月	全生産者		・安全な農産物の生産、異物混入の防止が図れる。
	27	適期刈取りに努めるとともに、収穫後は速やかに施設に搬入している。	9月	施設利用の方		・安全な農産物の生産、発酵による変質事故の防止が図れる。
	28	適期刈取りに努めるとともに、収穫後は速やかに乾燥機に張り込み、適切な温度管理で乾燥している。	9月	自家乾燥の方		・安全な農産物の生産、発酵による変質事故の防止が図れる。
	29	乾燥機、粉碎機、選別機は品種の切り替えごとに清掃している。	9月	自家乾燥の方		・安全な農産物の生産、異品種混入の防止が図れる。
	30	粉碎、選別等の作業は、作業着、帽子、履物等清潔な衣類を着て行っている。	9月	自家乾燥の方		・安全な農産物の生産、異物混入の防止が図れる。
	31	ネズミや野鳥、部外者などが作業場及び米穀の保管場所に入らないようにしている。	9月~	自家乾燥の方		・安全な農産物の生産、異物混入の防止が図れる。
	32	収穫後の稻わらは焼却せず、有機物の補給としてほ場にすき込んでいる。	9月~	全生産者		・安全な農産物の生産、持続的な農地の保全が図れる。
	33	JA出荷契約を結んだ米は確実にJAに出荷している。	9月	全生産者		・安定販売の取組、消費者等の信頼が確保できる。
	34	出荷に関して、米穀の名称、産地、数量、年月日、相手方の氏名又は名称等きちんと整理し、その記録を原則3年間保存している。	9月	自家乾燥の方		・法令が遵守できるとともに、消費者等への信頼が確保できる。
	35	米は用途（加工用、飼料用、非食用など）や品種ごとに明確に区分して保管・販売・処分している。	9月	自家乾燥の方		・法令が遵守できるとともに、消費者等の信頼が確保できる。
労働安全	36	作業場やほ場などの危険な箇所（高所、段差等）を把握し、作業手順や機械・器具類の使用方法について適切に理解し農作業を行っている。	随時	全生産者		・ケガや事故を防止し、安全な農作業を行なうことができる。
	37	必要に応じて免許の取得または講習を受講し、運転や操作、取扱い（貨物積載量等）については法令等に準拠している。	随時	全生産者		・ケガや事故を防止し、安全な農作業を行なうことができる。
環境保全	38	使用済み薬剤の空き容器や、不要になったビニール等は適切に廃棄している。	随時	全生産者		・環境への負荷を軽減できる。
	39	代かき後等の濁った水が、ほ場外に流れないようにしている。	随時	全生産者		・環境への負荷を軽減できる。
全般	40	GAPに関して時期毎に点検を実施し、改善の必要な部分の見直しをおこなっている。	随時	全生産者		・安全な農産物の生産、消費者等の信頼が確保できる。
	41	今年の米づくりの反省点をまとめている。	随時	全生産者		・安全な農産物の生産、消費者等の信頼を確保できる。

※チェック項目全てを達成することが目的ですが、現段階において出来ていない項目には、チェックをしないでください。

※チェックシートを点検することで、翌年度の生産に向けて改善点をみつけることも大きな目的のひとつです。

※今年出来なかったことを、翌年度には実行、改善するように心がけてください。

※チェック欄については、自己点検は生産者で行い、JAの営農指導員等が二重点検を行うなどして活用ください。

二重点検を行うことで、より正確に改善点をみつけることができます。


JA金沢中央 ~しっかり記帳、安全・安心の米づくり~
令和7年産 水稻生産履歴記録簿

(記入例)

※ 記入上の注意事項

- 品種・栽培方法(移植・直播など)で、別々に1枚ずつ記入して下さい。
- 何筆かあるほ場のうち、1筆でも使用したものは記入して下さい。
- この用紙を汚したり、折り曲げたり、穴を開けたりしないで下さい。
- コンピュータ処理を行いますので、シャープペンシル(0.5mm HB)で、丁寧に記入して下さい。
- 不明な点はJAまでお問い合わせ下さい。

住 所 金沢市○○町○○番地



生産者名 金沢 太郎 電話番号 076-○○○-○○○○

品種名 コシヒカリ 作付面積 30a 筆数 2筆

秋耕(令和6年わら等の鋤込み) 前年始期 10月1日 前年終期 10月2日

種苗	育苗方法	<input type="checkbox"/> 自家※1 <input checked="" type="checkbox"/> JAから苗購入 <input type="checkbox"/> その他から苗購入※2
	※1自家の場合には種日を記入 月 日 ~ 月 日	
	※2その他の場合に農家名等をカタカナで記入	
種子調達先	(自分で種まきした場合のみ記入) <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> 自家採種 <input type="checkbox"/> その他※ (kg) (kg) (kg)	
※その他の場合に農家名等をカタカナで記入		
床 土	<input type="checkbox"/> 加工床土 <input type="checkbox"/> 原土	→ 肥料名 (床土銘柄) PH調整剤

栽培	栽培方法	<input checked="" type="checkbox"/> 移植 <input type="checkbox"/> 直播 <input type="checkbox"/> 晩植 <input type="checkbox"/> 農特 <input type="checkbox"/> 全指
	田植(直播)日	5月3日 ~ 5月4日
	出穂時確認	<input checked="" type="checkbox"/> 異品種の混入が見られなかった → 確認日 8月5日

管理	田干しの実施	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 中干し期間 6月5日 ~ 7月5日
	溝 切 り	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 間断通水 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無

刈取	刈取(予定)日	9月12日 ~ 9月13日
	乾燥・調製	<input type="checkbox"/> 自家 <input checked="" type="checkbox"/> JA施設 <input type="checkbox"/> 農家委託等※
	※農家委託等の場合に農家名等をカタカナで記入	

秋耕(当年作わらの鋤込み) 始期(予定) 10月1日

(JA 使用欄)	
支 店 名	
組合員コード	
品種コード	
一次確認	二次確認
/	/

【肥 料】

- 使用した肥料に○をつけ、最終施肥日および10a当たり使用量を記入します。
- 掲載していない肥料を使用した場合、「その他」欄にカタカナで品名と単位欄を記入します。

分類	肥 料 名	施肥基準	チェック	最終施肥日 月	10a当たり使用量	単位
土づくり	BB スーパーけい酸	60kg/10a	<input checked="" type="checkbox"/>	1010	60	kg
	BB パワフル大地	60kg/10a				kg
	ようりん(粒)	60kg/10a				kg
	ケイカル	100kg/10a				kg
	その他1					
基肥(活着肥料)	その他2					
	BB 有機入り820号(みさと)	40~50kg/10a	<input checked="" type="checkbox"/>	420	40	kg
	BB いしかわ有機入り056号	30~40kg/10a				kg
	BB コシー発くんDX24	35~40kg/10a				kg
	BB コシー発くんNEO β	35~40kg/10a				kg
	BB 有機入りコシー発くん	35~40kg/10a				kg
	BB 新コシー発くん特号	35~40kg/10a				kg
	BB けい酸パワー・コシー発くん	70~80kg/10a				kg
	BB けい酸アップ・コシー発くん	45~55kg/10a				kg
	BB 早生一発くんDX28	40~50kg/10a				kg
	BB 早生一発くんNEO	40~50kg/10a				kg
	BB スリム早生一発くん	40~50kg/10a				kg
	その他1					
	その他2					
中間追肥	BB PKけいさん	20~40kg/10a	<input checked="" type="checkbox"/>	620	20	kg
	草木加里	10kg/10a				kg
	けい酸加里プレミア	20~40kg/10a				kg
	その他1					
分類	その他2					
	肥 料 名	施肥基準	チェック	施肥日①	施肥日②	施肥日③
	BB 有機入り追肥526号	30~45kg/10a	<input checked="" type="checkbox"/>	717	725	
	その他1					
	その他2					

農薬はウラ面に記入します。

【農 薬】

- 使用した農薬に○をつけ、最終使用日および10a当たり使用量(苗箱消毒・箱施薬の場合は1箱当たり使用量)を記入します。
- 掲載していない農薬を使用した場合、「その他」欄にカタカナで品名と単位欄を記入します。

[] - [] - 2

品種名 コシヒカリ

分類	農 薬 名	使用量・使用時期	チェック	最終使用日 月 日	10a当たり 1箱当たり 使用量	単位
収穫後防除	ラウンドアップマックスロード	200~1000ml/10a	○	1 0 2 0	5 0 0	ml
	その他					
種子消毒	消毒済種子購入					
	テクリードCフロアブル	200倍				
	その他					
苗箱消毒	ダコレート水和剤	400~600倍				ml
	タチガレースM液剤	500~1000倍 (500ml/箱)				ml
	その他					
箱施薬	薬剤処理済苗購入					
	エバーゴルフォルテ箱粒剤	50g/箱	○	5 3	5 0	g
	Dr.オリゼリディア箱粒剤	50~100g/箱				g
	その他					
本田隨時防除	リンバー粒剤	3~4kg/10a 収穫30日前まで			●	kg
	ブラシン粉剤DL	3~4kg/10a 収穫7日前まで			●	kg
	Zボルドー粉剤DL	3~4kg/10a 出穂10日前まで	○	7 1 7	4 0	kg
	トレボン粉剤DL	3~4kg/10a 収穫7日前まで			●	kg
	モンガリット粒剤	3~4kg/10a 収穫30日前まで			●	kg
	その他				●	
	その他液剤					倍
本田仕上防除	ビームトレモンセレン粉剤DL	3~4kg/10a 収穫21日前まで	○	7 2 5	4 0	kg
	ラブサイドスタークル粉剤DL	3~4kg/10a 収穫7日前まで	○	8 6	4 0	kg
	スタークル粉剤DL	3kg/10a 収穫7日前まで			●	kg
	イモチエーススタークル粒剤	3kg/10a 出穂14~10日前 収穫35日前まで			●	kg
	スタークル粒剤	3kg/10a 収穫7日前まで	○	8 1 3	3 0	kg
	スタークル豆つぶ	250g/10a 収穫7日前まで			●	g
					●	
					●	
					●	
	その他1					
	その他2					

分類	農 薬 名	使用量・使用時期	チェック	最終使用日 月 日	10a当たり使用量	単位
初期除草剤	ソルネット1キロ粒剤	1kg/10a 移植直後~30日まで			●	kg
	先陣ジャンボ	200g/10a 移植直後~30日まで			●	ml
	メテオフロアブル	500ml/10a 移植直後~30日まで			●	ml
	その他1				●	
	その他2				●	
一発除草剤	バッチャリ1キロ粒剤	1kg/10a 移植直後~30日まで			●	kg
	アシュラ1キロ粒剤	1kg/10a 移植直後~30日まで	○	5 1 0	1.0	kg
	ガンガンジャンボ	250g/10a 移植後3日~30日まで			●	g
	ウルティモZジャンボ	350g/10a 移植後5日~30日まで			●	g
	エンペラーフロアブル	500ml/10a 移植直後~30日まで			●	ml
	その他1				●	
	その他2				●	
中・後期除草剤	アトカラSジャンボMX	500g/10a 移植後14日~収穫45日前まで			●	g
	ヒエクリーン1キロ粒剤	1kg/10a 移植後15日~収穫45日前まで			●	kg
	バサグラン粒剤	3kg/10a 移植後15~55日 収穫60日前まで			●	kg
	レプラス1キロ粒剤	1kg/10a 移植後14日~収穫60日前まで			●	kg
	ウィードコア1キロ粒剤	1kg/10a 移植後7日~収穫60日前まで			●	kg
	ワイドパワー粒剤	3kg/10a 移植後20日~収穫60日前まで			●	kg
	その他1				●	
	その他2				●	
畦畔除草剤	農 薬 名	使用量・使用時期	チェック	使用日①	使用日②	使用日③
	ラウンドアップマックスロード(3回まで)	200~500ml/10a 収穫前日まで	○	6 1 0		
	グリホエキス	250~500ml/10a 草丈30cm以下 収穫14日前まで				2回まで
	バスタ液剤	500~1000ml/10a 収穫7日前まで				2回まで
	ザクサ液剤	500~1000ml/10a 収穫7日前まで				2回まで
	プリグロックスL(5回まで)	600~1000ml/10a				
	カーメックスD	150~300g/10a				
	ダイロンゾル	200~250ml/10a 雜草発生前~初期				どちらか1回まで
	その他					

★「苗箱消毒」では、使用基準欄に希釈倍率を記入して下さい。

★「その他液剤」を使用した場合は、使用量欄には希釈倍率を記入して下さい。

※農薬取締法を遵守し、使用基準を守って使用して下さい。※P34~の農薬登録内容を確認して下さい。

JAの点検により誤使用が発覚した場合、そのコメは『別扱い』とします。

JA金沢中央 ~しっかり記帳、安全・安心の米づくり~

令和7年産 水稻生産履歴記録簿

※ 記入上の注意事項

- 品種・栽培方法(移植・直播など)で、別々に1枚ずつ記入して下さい。
- 何筆かあるほ場のうち、1筆でも使用したものは記入して下さい。
- この用紙を汚したり、折り曲げたり、穴を開けたりしないで下さい。
- コンピュータ処理を行いますので、シャープペンシル(0.5mm HB)で、丁寧に記入して下さい。
- 不明な点はJAまでお問い合わせ下さい。

住 所

印

生産者名

 電話番号

品種名

 作付面積 a 筆数 筆

秋耕(令和6年わら等の鋤込み) 前年始期 月 日 前年終期 月 日

種 苗	育苗方法	<input type="checkbox"/> 自家※1 <input type="checkbox"/> JAから苗購入 <input type="checkbox"/> その他から苗購入※2
	※1自家の場合には種日を記入 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 ~ <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日	
	※2その他の場合に農家名等をカタカナで記入	
	※ <input type="checkbox"/> 種子保証票・農薬履歴あり	
栽 培	種子調達先	<input type="checkbox"/> (自分で種まきした場合のみ記入) (数量) <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> 自家採種 <input type="checkbox"/> その他※ (<input type="text"/> kg) (<input type="text"/> kg) (<input type="text"/> kg)
	※その他の場合に農家名等をカタカナで記入	
	※ <input type="checkbox"/> 種子保証票あり	
	床 土 <input type="checkbox"/> 加工床土 <input type="checkbox"/> 原土 → 肥料名 (床土銘柄) <input type="text"/> PH調整剤 <input type="text"/>	

管 理	栽培方法	<input type="checkbox"/> 移植 <input type="checkbox"/> 直播 <input type="checkbox"/> 晩植 <input type="checkbox"/> 農特 <input type="checkbox"/> 全指
	田植(直播)日 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 ~ <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日	
	出穂時確認 <input type="checkbox"/> 異品種の混入が見られなかった → 確認日 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日	

刈 取	田干しの実施	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 中干し期間 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 ~ <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日
	溝 切 り	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 間断通水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無

刈 取	刈取(予定)日	<input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 ~ <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日
	乾燥・調製	<input type="checkbox"/> 自家 <input type="checkbox"/> JA施設 <input type="checkbox"/> 農家委託等※

※農家委託等の場合に農家名等をカタカナで記入

秋耕(当年作わらの鋤込み) 始期(予定) 月 日

(JA 使用欄)

支 店 名

一次確認 二次確認

/ /

組合員コード

品種コード

【肥 料】

■ 使用した肥料に○をつけ、最終施肥日および10a当たり使用量を記入します。

■ 掲載していない肥料を使用した場合、「その他」欄にカタカナで品名と単位欄を記入します。

[] - [] - 1

分類	肥 料 名	施肥基準	チェック	最終施肥日 月 日	10a当たり使用量	単位
土 づ く り	BB スーパーけい酸	60kg/10a				kg
	BB パワフル大地	60kg/10a				kg
	ようりん(粒)	60kg/10a				kg
	ケイカル	100kg/10a				kg
	その他1					
	その他2					
基肥(活着肥)	BB 有機入り820号(みさと)	40~50kg/10a				kg
	BB いしかわ有機入り056号	30~40kg/10a				kg
	BB コシー発くんDX24	35~40kg/10a				kg
	BB コシー発くんNEO β	35~40kg/10a				kg
	BB 有機入りコシー発くん	35~40kg/10a				kg
	BB 新コシー発くん特号	35~40kg/10a				kg
	BB けい酸パワー・コシー発くん	70~80kg/10a				kg
	BB けい酸アップ・コシー発くん	45~55kg/10a				kg
	BB 早生一発くんDX28	40~50kg/10a				kg
	BB 早生一発くんNEO	40~50kg/10a				kg
中 間 追 肥	BB スリム早生一発くん	40~50kg/10a				kg
	その他1					
	その他2					
穗 肥	BB PKけいさん	20~40kg/10a				kg
	草木加里	10kg/10a				kg
	けい酸加里プレミア	20~40kg/10a				kg
	その他1					
	その他2					
分類	肥 料 名	施肥基準	チェック	施肥日①	施肥日②	施肥日③
穗 肥	BB 有機入り追肥526号	30~45kg/10a				
肥	その他1					
	その他2					

農薬はウラ面に記入します。

2024版

【農 薬】

- 使用した農薬に○をつけ、最終使用日および10a当たり使用量(苗箱消毒・箱施薬の場合は1箱当たり使用量)を記入します。
- 掲載していない農薬を使用した場合、「その他」欄にカタカナで品名と単位欄を記入します。

[] - [] - 2

品種名 []

分類	農 薬 名	使用量・使用時期	チェック	最終使用日 月 日	10a当たり 1箱当たり 使用量	単位
収穫後防除	ラウンドアップマックスロード	200~1000ml/10a				ml
	その他					
種子消毒	消毒済種子購入					
	テクリードCフロアブル	200倍				
	その他					
苗箱消毒	ダコレート水和剤	400~600倍				ml
	タチガレースM液剤	500~1000倍 (500ml/箱)				ml
	その他					
箱施薬	薬剤処理済苗購入					
	エバーゴルフォルテ箱粒剤	50g/箱				g
	Dr.オリゼリディア箱粒剤	50~100g/箱				g
	その他					
本田隨時防除	リンバー粒剤	3~4kg/10a 収穫 30日前まで			●	kg
	ブラシン粉剤DL	3~4kg/10a 収穫 7日前まで			●	kg
	Zボルドー粉剤DL	3~4kg/10a 出穂 10日前まで			●	kg
	トレボン粉剤DL	3~4kg/10a 収穫 7日前まで			●	kg
	モンガリット粒剤	3~4kg/10a 収穫 30日前まで			●	kg
	その他				●	
	その他液剤					倍
本田仕上防除	ビームトレモンセレン粉剤DL	3~4kg/10a 収穫 21日前まで			●	kg
	ラブサイドスタークル粉剤DL	3~4kg/10a 収穫 7日前まで			●	kg
	スタークル粉剤DL	3kg/10a 収穫 7日前まで			●	kg
	イモチエーススタークル粒剤	3kg/10a 出穂14~10日前 収穫35日前まで			●	kg
	スタークル粒剤	3kg/10a 収穫 7日前まで			●	kg
	スタークル豆つぶ	250g/10a 収穫 7日前まで			●	g
					●	
					●	
					●	
	その他1					
	その他2					

分類	農 薬 名	使用量・使用時期	チェック	最終使用日 月 日	10a当たり使用量	単位
初期除草剤	ソルネット1キロ粒剤	1kg/10a 移植直後 ~30日まで			●	kg
	先陣ジャンボ	200g/10a 移植直後 ~30日まで			●	ml
	メテオフロアブル	500ml/10a 移植直後 ~30日まで			●	ml
	その他1				●	
	その他2				●	
一発除草剤	バッチャリ1キロ粒剤	1kg/10a 移植直後 ~30日まで			●	kg
	アシュラ1キロ粒剤	1kg/10a 移植直後 ~30日まで			●	kg
	ガンガンジャンボ	250g/10a 移植後3日 ~30日まで			●	g
	ウルティモZジャンボ	350g/10a 移植後5日 ~30日まで			●	g
	エンペラーフロアブル	500ml/10a 移植直後 ~30日まで			●	ml
	その他1				●	
	その他2				●	
中・後期除草剤	アトカラSジャンボMX	500g/10a 移植後14日~ 収穫45日前まで			●	g
	ヒエクリーン1キロ粒剤	1kg/10a 移植後15日~ 収穫45日前まで			●	kg
	バサグラン粒剤	3kg/10a 移植後15~55日 収穫60日前まで			●	kg
	レプラス1キロ粒剤	1kg/10a 移植後14日~ 収穫60日前まで			●	kg
	ウィードコア1キロ粒剤	1kg/10a 移植後7日~ 収穫60日前まで			●	kg
	ワイドパワー粒剤	3kg/10a 移植後20日~ 収穫60日前まで			●	kg
	その他1				●	
	その他2				●	
畦畔除草剤	農 薬 名	使用量・使用時期	チェック	使用日①	使用日②	使用日③
	ラウンドアップマックスロード(3回まで)	200~500ml/10a 収穫前日 まで				
	グリホエキス	250~500ml/10a 草丈30cm以下 収穫14日前まで				2回まで
	バスタ液剤	500~1000ml/10a 収穫 7日前まで				2回まで
	ザクサ液剤	500~1000ml/10a 収穫 7日前まで				2回まで
	プリグロックスL(5回まで)	600~1000ml/10a				
	カーメックスD	150~300g/10a				
	ダイロンゾル	200~250ml/10a 雜草発生前~ 雑草発生初期				どちらか1回まで
	その他					

★「苗箱消毒」では、使用基準欄に希釈倍率を記入して下さい。

★「その他液剤」を使用した場合は、使用量欄には希釈倍率を記入して下さい。

JJAの点検により誤使用が発覚した場合、そのコメは『別扱い』とします。[]

JA金沢中央 ~しっかり記帳、安全・安心の米づくり~

令和7年産 水稻生産履歴記録簿

※ 記入上の注意事項

- 品種・栽培方法(移植・直播など)で、別々に1枚ずつ記入して下さい。
- 何筆かあるほ場のうち、1筆でも使用したものは記入して下さい。
- この用紙を汚したり、折り曲げたり、穴を開けたりしないで下さい。
- コンピュータ処理を行いますので、シャープペンシル(0.5mm HB)で、丁寧に記入して下さい。
- 不明な点はJAまでお問い合わせ下さい。

住 所

印

生産者名

 電話番号

品種名

 作付面積 a 筆数 筆

秋耕(令和6年わら等の鋤込み) 前年始期 月 日 前年終期 月 日

種 苗	育苗方法	<input type="checkbox"/> 自家※1 <input type="checkbox"/> JAから苗購入 <input type="checkbox"/> その他から苗購入※2
	※1自家の場合には種日を記入 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 ~ <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日	
	※2その他の場合に農家名等をカタカナで記入 <input type="text"/> ※ <input type="checkbox"/> 種子保証票・農薬履歴あり	
種子調達先	(自分で種まきした場合のみ記入) (数量)	
	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> 自家採種 <input type="checkbox"/> その他※	(<input type="text"/> kg) (<input type="text"/> kg) (<input type="text"/> kg)
※その他の場合に農家名等をカタカナで記入 <input type="text"/> ※ <input type="checkbox"/> 種子保証票あり		
床 土	<input type="checkbox"/> 加工床土 <input type="checkbox"/> 原土	→ 肥料名 (床土銘柄) <input type="text"/> PH調整剤 <input type="text"/>

栽培	栽培方法	<input type="checkbox"/> 移植 <input type="checkbox"/> 直播 <input type="checkbox"/> 晩植 <input type="checkbox"/> 農特 <input type="checkbox"/> 全指
	田植(直播)日	<input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 ~ <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日
	出穂時確認	<input type="checkbox"/> 異品種の混入が見られなかった → 確認日 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日

管理	田干しの実施	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 中干し期間 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 ~ <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日
	溝 切 り	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 間断通水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無

刈 取	刈取(予定)日	<input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 ~ <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日
	乾燥・調製	<input type="checkbox"/> 自家 <input type="checkbox"/> JA施設 <input type="checkbox"/> 農家委託等※
	※農家委託等の場合に農家名等をカタカナで記入 <input type="text"/>	

秋耕(当年作わらの鋤込み) 始期(予定) 月 日

(JA 使用欄)

支 店 名

一次確認 二次確認

/ /

組合員コード

品種コード

【肥 料】

■ 使用した肥料に○をつけ、最終施肥日および10a当たり使用量を記入します。

■ 掲載していない肥料を使用した場合、「その他」欄にカタカナで品名と単位欄を記入します。

[] - [] - 1

分類	肥 料 名	施肥基準	チェック	最終施肥日 月 日	10a当たり使用量	単位
土 づ く り	BB スーパーけい酸	60kg/10a				kg
	BB パワフル大地	60kg/10a				kg
	ようりん(粒)	60kg/10a				kg
	ケイカル	100kg/10a				kg
	その他1					
	その他2					
基肥(活着肥)	BB 有機入り820号(みさと)	40~50kg/10a				kg
	BB いしかわ有機入り056号	30~40kg/10a				kg
	BB コシー発くんDX24	35~40kg/10a				kg
	BB コシー発くんNEO β	35~40kg/10a				kg
	BB 有機入りコシー発くん	35~40kg/10a				kg
	BB 新コシー発くん特号	35~40kg/10a				kg
	BB けい酸パワー・コシー発くん	70~80kg/10a				kg
	BB けい酸アップ・コシー発くん	45~55kg/10a				kg
	BB 早生一発くんDX28	40~50kg/10a				kg
	BB 早生一発くんNEO	40~50kg/10a				kg
中 間 追 肥	BB スリム早生一発くん	40~50kg/10a				kg
	その他1					
	その他2					
穗 肥	BB PKけいさん	20~40kg/10a				kg
	草木加里	10kg/10a				kg
	けい酸加里プレミア	20~40kg/10a				kg
	その他1					
	その他2					
分類	肥 料 名	施肥基準	チェック	施肥日①	施肥日②	施肥日③
穗 肥	BB 有機入り追肥526号	30~45kg/10a				
肥	その他1					
	その他2					

農薬はウラ面に記入します。

【農 薬】

- 使用した農薬に○をつけ、最終使用日および10a当たり使用量(苗箱消毒・箱施薬の場合は1箱当たり使用量)を記入します。
- 掲載していない農薬を使用した場合、「その他」欄にカタカナで品名と単位欄を記入します。

分類	農 薬 名	使用量・使用時期	チェック	最終使用日 月 日	10a当たり 1箱当たり 使用量	単位
収穫後防除	ラウンドアップマックスロード	200~1000ml/10a				ml
	その他					
種子消毒	消毒済種子購入					
苗箱消毒	テクリードCフロアブル	200倍				
	その他					
	ダコレート水和剤	400~600倍				ml
箱施薬	タチガレースM液剤	500~1000倍 (500ml/箱)				ml
	その他					
	薬剤処理済苗購入					
	エバーゴルフォルテ箱粒剤	50g/箱				g
本田随時防除	Dr.オリゼリディア箱粒剤	50~100g/箱				g
	その他					
	リンバー粒剤	3~4kg/10a 収穫30日前まで			●	kg
	ブラシン粉剤DL	3~4kg/10a 収穫7日前まで			●	kg
	Zボルドー粉剤DL	3~4kg/10a 出穂10日前まで			●	kg
	トレボン粉剤DL	3~4kg/10a 収穫7日前まで			●	kg
	モンガリット粒剤	3~4kg/10a 収穫30日前まで			●	kg
本田仕上防除	その他				●	
	その他液剤					倍
	ビームトレモンセレン粉剤DL	3~4kg/10a 収穫21日前まで			●	kg
	ラブサイドスタークル粉剤DL	3~4kg/10a 収穫7日前まで			●	kg
	スタークル粉剤DL	3kg/10a 収穫7日前まで			●	kg
	イモチエーススタークル粒剤	3kg/10a 出穂14~10日前 収穫35日前まで			●	kg
	スタークル粒剤	3kg/10a 収穫7日前まで			●	kg
	スタークル豆つぶ	250g/10a 収穫7日前まで			●	g
	その他1				●	
	その他2				●	

分類	農 薬 名	使用量・使用時期	チェック	最終使用日 月 日	10a当たり使用量	単位
初期除草剤	ソルネット1キロ粒剤	1kg/10a 移植直後~30日まで			●	kg
	先陣ジャンボ	200g/10a 移植直後~30日まで			●	ml
一発除草剤	メテオフロアブル	500ml/10a 移植直後~30日まで			●	ml
	その他1				●	
中・後期除草剤	その他2				●	
	バッチャリ1キロ粒剤	1kg/10a 移植直後~30日まで			●	kg
畦畔除草剤	アシュラ1キロ粒剤	1kg/10a 移植直後~30日まで			●	kg
	ガンガンジャンボ	250g/10a 移植後3日~30日まで			●	g
	ウルティモZジャンボ	350g/10a 移植後5日~30日まで			●	g
	エンペラーフロアブル	500ml/10a 移植直後~30日まで			●	ml
	その他1				●	
	その他2				●	
分類	アトカラSジャンボMX	500g/10a 移植後14日~収穫45日前まで			●	g
	ヒエクリーン1キロ粒剤	1kg/10a 移植後15日~収穫45日前まで			●	kg
	バサグラン粒剤	3kg/10a 移植後15~55日 収穫60日前まで			●	kg
	レプラス1キロ粒剤	1kg/10a 移植後14日~ 収穫60日前まで			●	kg
	ウィードコア1キロ粒剤	1kg/10a 移植後7日~ 収穫60日前まで			●	kg
	ワイドパワー粒剤	3kg/10a 移植後20日~ 収穫60日前まで			●	kg
	その他1				●	
その他	その他2				●	
JAの点検により誤使用が発覚した場合、そのコメは『別扱い』とします。[]	どちらか1回まで					

★「苗箱消毒」では、使用基準欄に希釈倍率を記入して下さい。

★「その他液剤」を使用した場合は、使用量欄には希釈倍率を記入して下さい。

品種名 []

[] - [] - 2

JA金沢中央 ~しっかり記帳、安全・安心の米づくり~

令和7年産 水稻生産履歴記録簿

※ 記入上の注意事項

- 品種・栽培方法(移植・直播など)で、別々に1枚ずつ記入して下さい。
- 何筆かあるほ場のうち、1筆でも使用したものは記入して下さい。
- この用紙を汚したり、折り曲げたり、穴を開けたりしないで下さい。
- コンピュータ処理を行いますので、シャープペンシル(0.5mm HB)で、丁寧に記入して下さい。
- 不明な点はJAまでお問い合わせ下さい。

住 所

印

生産者名

 電話番号

品種名

 作付面積 a 筆数 筆

秋耕(令和6年わら等の鋤込み) 前年始期 月 日 前年終期 月 日

種 苗	育苗方法	<input type="checkbox"/> 自家※1 <input type="checkbox"/> JAから苗購入 <input type="checkbox"/> その他から苗購入※2
	※1自家の場合は種日を記入 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 ~ <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日	
	※2その他の場合に農家名等をカタカナで記入 <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 種子保証票・農薬履歴あり	
	種子調達先	(自分で種まきした場合のみ記入) (数量)
※その他の場合に農家名等をカタカナで記入 <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 種子保証票あり		
床 土	<input type="checkbox"/> 加工床土 <input type="checkbox"/> 原土	→ 肥料名 (床土銘柄) <input type="text"/> PH調整剤 <input type="text"/>

栽培	栽培方法	<input type="checkbox"/> 移植 <input type="checkbox"/> 直播 <input type="checkbox"/> 晩植 <input type="checkbox"/> 農特 <input type="checkbox"/> 全指
	田植(直播)日	<input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 ~ <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日
	出穂時確認	<input type="checkbox"/> 異品種の混入が見られなかった → 確認日 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日

管理	田干しの実施	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 中干し期間 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 ~ <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日
	溝 切 り	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 間断通水 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無

刈 取	刈取(予定)日	<input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 ~ <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日
	乾燥・調製	<input type="checkbox"/> 自家 <input type="checkbox"/> JA施設 <input type="checkbox"/> 農家委託等※ ※農家委託等の場合に農家名等をカタカナで記入 <input type="text"/>

秋耕(当年作わらの鋤込み) 始期(予定) 月 日

(JA 使用欄)

支 店 名

一次確認 二次確認

/ /

組合員コード

品種コード

【肥 料】

■ 使用した肥料に○をつけ、最終施肥日および10a当たり使用量を記入します。

■ 掲載していない肥料を使用した場合、「その他」欄にカタカナで品名と単位欄を記入します。

[] - [] - 1

分類	肥 料 名	施肥基準	チェック	最終施肥日 月 日	10a当たり使用量	単位
土 づ く り	BB スーパーけい酸	60kg/10a				kg
	BB パワフル大地	60kg/10a				kg
	ようりん(粒)	60kg/10a				kg
	ケイカル	100kg/10a				kg
	その他1					
	その他2					
基肥(活着肥)	BB 有機入り820号(みさと)	40~50kg/10a				kg
	BB いしかわ有機入り056号	30~40kg/10a				kg
	BB コシー発くんDX24	35~40kg/10a				kg
	BB コシー発くんNEO β	35~40kg/10a				kg
	BB 有機入りコシー発くん	35~40kg/10a				kg
	BB 新コシー発くん特号	35~40kg/10a				kg
	BB けい酸パワー・コシー発くん	70~80kg/10a				kg
	BB けい酸アップ・コシー発くん	45~55kg/10a				kg
	BB 早生一発くんDX28	40~50kg/10a				kg
	BB 早生一発くんNEO	40~50kg/10a				kg
中 間 追 肥	BB スリム早生一発くん	40~50kg/10a				kg
	その他1					
	その他2					
穗 肥	BB PKけいさん	20~40kg/10a				kg
	草木加里	10kg/10a				kg
	けい酸加里プレミア	20~40kg/10a				kg
	その他1					
	その他2					
分類	肥 料 名	施肥基準	チェック	施肥日①	施肥日②	施肥日③
穗 肥	BB 有機入り追肥526号	30~45kg/10a				
肥	その他1					
	その他2					

農薬はウラ面に記入します。

【農 薬】

- 使用した農薬に○をつけ、最終使用日および10a当たり使用量(苗箱消毒・箱施薬の場合は1箱当たり使用量)を記入します。
- 掲載していない農薬を使用した場合、「その他」欄にカタカナで品名と単位欄を記入します。

[] - [] - 2

品種名 []

分類	農 薬 名	使用量・使用時期	チェック	最終使用日 月 日	10a当たり 1箱当たり 使用量	単位
収穫後防除	ラウンドアップマックスロード	200~1000ml/10a				ml
	その他					
種子消毒	消毒済種子購入					
	テクリードCフロアブル	200倍				
	その他					
苗箱消毒	ダコレート水和剤	400~600倍				ml
	タチガレースM液剤	500~1000倍 (500ml/箱)				ml
	その他					
箱施薬	薬剤処理済苗購入					
	エバーゴルフォルテ箱粒剤	50g/箱				g
	Dr.オリゼリディア箱粒剤	50~100g/箱				g
	その他					
本田隨時防除	リンバー粒剤	3~4kg/10a 収穫30日前まで			●	kg
	ブラシン粉剤DL	3~4kg/10a 収穫7日前まで			●	kg
	Zボルドー粉剤DL	3~4kg/10a 出穂10日前まで			●	kg
	トレボン粉剤DL	3~4kg/10a 収穫7日前まで			●	kg
	モンガリット粒剤	3~4kg/10a 収穫30日前まで			●	kg
	その他				●	
	その他液剤					倍
本田仕上防除	ビームトレモンセレン粉剤DL	3~4kg/10a 収穫21日前まで			●	kg
	ラブサイドスタークル粉剤DL	3~4kg/10a 収穫7日前まで			●	kg
	スタークル粉剤DL	3kg/10a 収穫7日前まで			●	kg
	イモチエーススタークル粒剤	3kg/10a 出穂14~10日前 収穫35日前まで			●	kg
	スタークル粒剤	3kg/10a 収穫7日前まで			●	kg
	スタークル豆つぶ	250g/10a 収穫7日前まで			●	g
					●	
					●	
					●	
	その他1					
	その他2					

分類	農 薬 名	使用量・使用時期	チェック	最終使用日 月 日	10a当たり使用量	単位
初期除草剤	ソルネット1キロ粒剤	1kg/10a 移植直後~30日まで			●	kg
	先陣ジャンボ	200g/10a 移植直後~30日まで			●	ml
	メテオフロアブル	500ml/10a 移植直後~30日まで			●	ml
	その他1				●	
	その他2				●	
一発除草剤	バッチャリ1キロ粒剤	1kg/10a 移植直後~30日まで			●	kg
	アシュラ1キロ粒剤	1kg/10a 移植直後~30日まで			●	kg
	ガンガンジャンボ	250g/10a 移植後3日~30日まで			●	g
	ウルティモZジャンボ	350g/10a 移植後5日~30日まで			●	g
	エンペラーフロアブル	500ml/10a 移植直後~30日まで			●	ml
	その他1				●	
	その他2				●	
中・後期除草剤	アトカラSジャンボMX	500g/10a 移植後14日~収穫45日前まで			●	g
	ヒエクリーン1キロ粒剤	1kg/10a 移植後15日~収穫45日前まで			●	kg
	バサグラン粒剤	3kg/10a 移植後15~55日 収穫60日前まで			●	kg
	レプラス1キロ粒剤	1kg/10a 移植後14日~ 収穫60日前まで			●	kg
	ウィードコア1キロ粒剤	1kg/10a 移植後7日~ 収穫60日前まで			●	kg
	ワイドパワー粒剤	3kg/10a 移植後20日~ 収穫60日前まで			●	kg
	その他1				●	
	その他2				●	
畦畔除草剤	農 薬 名	使用量・使用時期	チェック	使用日①	使用日②	使用日③
	ラウンドアップマックスロード(3回まで)	200~500ml/10a 収穫前日まで				
	グリホエキス	250~500ml/10a 草丈30cm以下 収穫14日前まで				2回まで
	バスタ液剤	500~1000ml/10a 収穫7日前まで				2回まで
	ザクサ液剤	500~1000ml/10a 収穫7日前まで				2回まで
	プリグロックスL(5回まで)	600~1000ml/10a				
	カーメックスD	150~300g/10a				
	ダイロンゾル	200~250ml/10a 雜草発生前~ 雑草発生初期				どちらか1回まで
	その他					

★「苗箱消毒」では、使用基準欄に希釈倍率を記入して下さい。

★「その他液剤」を使用した場合は、使用量欄には希釈倍率を記入して下さい。

※農薬取締法を遵守し、使用基準を守って使用して下さい。※P34~の農薬登録内容を確認して下さい。
JAの点検により誤使用が発覚した場合、そのコメは『別扱い』とします。

水田畦畔や農道の雑草防除に！

農林水産省登録 第14216号



ホクコー
カソロン[®]
粒剤6.7

- 農閑期の散布で雑草の発生を長期間抑える！
- 頑固なスギナにも良く効く！
- 粒剤で簡単散布！○畦畔は崩れにくい！
- 忙しい春先の除草作業を軽減！

使用時期
11月下旬～3月中旬頃

使用量
4～6 kg/10a(水田畦畔)
10～15kg/10a(農道)

使用方法
全面土壤散布
※3kg(1袋)で
500m²～750m²(水田畦畔)、
200m²～333m²(農道)
散布できます。



斑点米カメムシの
増殖場所を減らし、
密度を下げます。

◎金沢市
散布日：平成26年 1月13日
撮影日：平成26年 5月31日

薬剤の散布でこれだけの差がでます！

秋冬期雑草防除体系



使用上の注意

- ① 薬剤を散布する際には水田に飛散しないように注意してください。
- ② 畦塗りをする場合は畦塗りをした後に散布してください。
- ③ 土壤が乾燥していると効果が不十分となりますので、雨上がりなどの土が湿った状態で散布してください。

DZ作戦 水田畦畔除草のご紹介

DZ作戦とは

ダイロン(D)とザクサ(Z)を混用して散布することにより、畦畔除草の省力化・コスト削減、カメムシ対策を目指した取り組みです。

農林水産省登録 第22908号
有効成分: DCMU 50.0%

農林水産省登録 第22902号
有効成分: グルホシネートPナトリウム塩 11.5%



ダイロンゾル：土壤に処理層を作り、これから発生する雑草を長期間抑えます。
ザクサ液剤：すでに生えている雑草を枯らします。

長期間 草刈り不要！

DZ作戦 おすすめポイント

① 畦畔除草作業の省力化

雑草の発生を長期間抑えることにより、除草作業の省力化が図れます。



② 除草コストの削減

茎葉処理除草剤2回散布を1回で済ませられるのでコスト削減が可能です。

③ 斑点米カムシ類対策

斑点米カムシ類の住処となる畦畔雑草を長期間抑え、斑点米発生のリスクを軽減します。

DZ作戦 の試験散布事例

試験場所: 静岡県浜松市 薬剤散布日: 2020年7月2日

ダイロンとザクサの混用散布 (DZ作戦) (散布倍率: ダイロンゾル: 400倍、ザクサ液剤100倍)



「DZ作戦」は水田畦畔雑草を速やかに枯らし、新たな雑草の発生を長期間抑えることができます。

◆ 稲の病気の種類 ◆



リゾープス菌 (白カビ)



トリコデルマ菌 (青カビ)



フザリウム菌 (赤カビ)



紋枯病



葉いもち



白葉枯病



穂いもち (枝梗いもち) 穂いもち (首いもち)



稻こうじ病

◆ 着色粒の種類 ◆



カメムシ (斑点米)



褐色米



腹黒米

◆ 害虫の種類 ◆



イネドロオイムシ



イネゾウムシ



イネミズゾウムシ



ニカメイチュウ



ツマグロヨコバイ



セジロウンカ



コブノメイガ



ホソハリカメムシ



トゲシラホシカメムシ



アカスジカスミカメ



アカヒゲホソミドリカスミカメ



クモヘリカメムシ

◆ 水田の主な雑草 ◆



ノビエ



キシウスズメノヒエ



ミズガヤツリ



ホタルイ



クログワイ



マツバイ



コナギ



アゼナ



ウリカワ



オモダカ



ヘラオモダカ



セリ



ヒルムシロ



イボクサ



浮草・藻類