



溝切りは、6月6日頃から始めましょう！中干し開始の目安は田植え後一ヶ月！！

乳白粒を減らすために中干しと溝切りを徹底しよう！！

## 今月のポイント① 浅水管理と田干しで分けつ確保

- 浅水管理で地温の上昇を図り、良質な分けつの確保に努めましょう。
- 天気の良い日は落水して田干しをし、根張りを良くしましょう。藻の対策にもなります。
- 低温や強風時には、深水（5cm）管理とし保温に努めましょう。

## 今月のポイント② 田植後1ヶ月を目安に中干し、溝切りで過剰生育の抑制！

### ●中干しの適期実施 → 株の出来すぎストップ → 乳白粒の減少

- ・ 本年は、田植え後の天候に恵まれたことから、生育は早まっています。中干し開始適期も前年より早いことから、遅れないように実施しましょう。



写真：中干し開始適期  
コシヒカリ 13本/株

中干し開始適期 6月1日～6日

中干し開始本数の目安

- ・ コシヒカリ 13本/株 (60株/坪) 16本/株 (50株/坪)
- ・ ゆめみづほ 15本/株 (60株/坪) 18本/株 (50株/坪)

中干しの程度 田面にひびが入る程度

※地区ごとに、中干し開始の目安となる圃場に看板を設置しますので参考にしてください。

- ・ 茎（稈）が太く根張りがよく、健全な稲体になります。
- ・ 中干しは、基肥一発肥料施用圃場では、過剰生育を抑える唯一の管理です。
- ・ しっかり中干しをした固い田面は、収穫作業がらくになります。

### ●溝切りで、入水・排水がらくらく！

- ・ 溝切りは5～6m（20条）間隔に行い、溝はしっかりと排水口に繋げましょう。
- ・ 溝切りを行う際には、4～5日干してから行うと溝がしっかりとつきます。

## 今月のポイント③ 本田および本田周辺の除草

### ●本田の後発雑草対策

適用雑草	除草剤名	使用量	使用時期	使用方法
ノビエ	ヒエクリーン 1キロ粒剤	1kg/10a	移植後15日～ ノビエ4葉期まで (但し収穫45日前まで)	湛水散布 (土が見えては いけない)
水田雑草（イネ科除く） ホタルイ、オモダカ、クログワイ、 マツバイ、ミズガヤツリ、ウリカワ	バサグラン粒剤	3～4kg/10a	移植後15日～50日 (但し収穫60日前まで)	落水状態（足跡 に水が残る程 度）で散布
オモダカ、クログワイ	アトトリ 1キロ粒剤	1kg/10a	移植後20日（稲5葉期以降） ～収穫45日前まで	湛水散布 (土が見えては いけない)
水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、 ミズガヤツリ、ウリカワ、ク ログワイ、オモダカ、ヒルムシロ	ワイドパワー粒剤	3kg/10a	移植後20日～ ノビエ5葉期まで (但し収穫60日前まで)	落水状態（足跡 に水が残る程 度）で散布
イボクサ、クサネム	ノミニー液剤	100ml/10a水 100L/10aに希釈	移植後30日～ イボクサの茎長30cmまで クサネムの草丈40cmまで (但し収穫60日前まで)	落水状態

### ●農道及び畦畔の除草

水田周辺の斑点米カメムシの生息密度を下げるため、草刈りまたは除草剤で除草に努めましょう。

裏面に続きます

今月のポイント④ 珪酸加里プレミアの施用で良質米生産！

- 稲体を強くし、根の活力が向上します。
- 施用時期 6月中～下旬、施用量 30kg/10a
- 土づくり肥料を施用していない場合は施用に努めましょう。
- けい酸パワーコシー発くん施用の圃場には珪酸加里プレミアを施用する必要はありません。

今月のポイント⑤ いもち病・白葉枯病の予防

- 田植え時にツインターボ箱粒剤08・ブイゲットバリアード粒剤・Dr.オリゼフェルテラ粒剤などの箱施薬剤を施用しなかった圃場は、必ずオリゼメート1キロ粒剤を散布する。(6月15日～20日頃) 特に白葉枯病の常発地では必ず散布してください。
- 補植苗はいもち病の発生源になるので早急に処分してください。

石川かほく環境にやさしい農業のすすめ ～グランドカバープランツ～

● 除草剤を使用しない圃場周辺の雑草防除対策

グランドカバープランツの植栽により、ほ場周辺における除草剤の使用を減らせます。

● グランドカバープランツによる雑草抑制とは？

グランドカバープランツは、畦畔や法面等に地面を覆う背の低い植物で、雑草の繁殖を抑制します。

かほく管内では、ヒメイワダレソウや、センチピートグラスなどで取り組みが行われています。

植栽の作業や、生長して被覆が完了するまでの雑草抜き取り等に労力を要しますが、植栽時に防草シートを敷設することで管理が軽減できます。

● 防草シートだけでも抑草効果があります。



ヒメイワダレソウ



防草シート (内日角)

JA石川かほく米555共励会 今月のポイント

- 中干しの適期開始で過剰生育を抑制し、乳白粒発生防止・単収アップ
- 中干しの実施で田面を固くし、収穫作業楽々で労働時間短縮
- 珪酸加里プレミア施用で、登熟向上・品質向上・単収アップ  
「JA石川かほく米555共励会」エントリー受付中。


「乗用管理機」で溝切りが楽々できる！

「溝切りの作業請負」のご案内

- 作業請負の期間 ◆ 6月6日～6月30日  
 申し込み条件 ◆ 1地区当たり5ha以上



多目的管理機



溝切り部



JAでは「経営所得安定対策」の加入申請書を今後配布します。

・「経営所得安定対策」の加入申請書を配布しますので提出をお願いします。