


第1号
平成28年4月

湛水直播だより (カルパー)


JA松任 JA白山
JAののいち
白山石川営農推進協議会

1. ほ場の準備・土壌条件

- (1) 高低差の大きい圃場は耕起前に土を移動させ、均平にする。
- (2) 代かき後、播種までの日数が長くなると雑草の発生が多くなり、除草剤の効果の低下が懸念されるため、代かきは播種日から逆算して行う。



- (3) 代かきは、均平化に努めるように丁寧に行い、枕地等の旋回部分は、練らないように注意する。
- (4) 播種前日に落水し、播種時の水深は0~2cm程度とする。
(ひたひた水程度)
- (5) 播種時の土壌の硬さは移植以上とし、代かきと播種の間隔で調整する。田面の硬さは、ゴルフボールを1mの高さから落下させた場合に田面からの露出高さ1~-1cmを目安とする。



2. 施肥

品種	肥料名	施肥量(10a当たり)
コシヒカリ	コシ直播一発くん	30~35kg (N:6~7kg)

3. 播種および播種後の管理

- (1) 播種時期 4月25日~5月15日
日平均気温が15℃以上になる時期(平年値4月29日)とする。

① 播種 播種量 コシヒカリ: 乾籾 2.0~2.5kg/10a

※播種後は入水せず落水状態を保ち、出芽を安定させる。

② 落水状態 7~10日間

※停滞水は出芽率が低下するので、溝切りを行い、排水を徹底する。

※落水期間中、田面が乾き過ぎる場合は入水を行い、速やかに落水する。

※播種直後に強い雨が予想される場合は湛水し、その後落水する。

③ 入水・除草剤の散布

※湛水後、雑草の状況に応じて、散布する。

除草剤名	散布時期	施用量	適用雑草
キックバイ1キロ粒剤	は種後5日~ルエ2葉期	1kg/10a	水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ、セリ

☆直播についてのお問い合わせは、各JAの営農担当者、
または、石川農林総合事務所農業振興部TEL:076-276-0371まで。