

H29 大豆栽培農事メモ 号外「茎疫病」

平成29年7月25日
白山石川営農推進協議会
石川県農業共済組合
JA松任、JA白山、JAののいち

茎疫病の発生に注意！

梅雨末期の大雨により、大豆の湿害が予想されますので、排水対策に努めてください。
また、冠水及び水分の多いほ場では、茎疫病の発生が懸念されるので注意してください。

1 排水対策

排水溝を点検し、すみやかにほ場内から排水するよう努めてください。

2 茎疫病の対策

本病は、大豆の発芽期から収穫期近くまで生育のほぼ全期間発病する。
土壌伝染し、水分の多いほ場で多発する。

① 防除薬剤（発病初期）

病害の兆候が見られたら、地際部を中心に薬剤散布する。

薬剤名	希釈倍数 (10a 使用液量)	使用回数	備考
フェスティバル C 水和剤	600 倍 (100～300 ㍓)	3 回以内	収穫 7 日前まで
フェスティバル M 水和剤	750 倍 (150～300 ㍓)	3 回以内	収穫 45 日前まで
ベトファイター 顆粒水和剤	2000 倍 (100～300 ㍓)	2 回以内	収穫 7 日前まで

※フェスティバルの使用回数は、CおよびBの2つ合わせて3回以内となります。

② 病株は早期に抜き取り処分し、あわせてほ場の排水に努める。



ダイズ茎疫病の症状

↑ダイズ茎疫病
(石川県病害虫防除ハンドブック)