

JA 能美 令和5年度 鉄コーティング直播栽培暦 (コシヒカリ)

能美小松宮農推進協議会

月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	
旬																					
水管理	<p>播種期：4月25日～5月8日</p> <p>出穂期：8月8日頃</p> <p>成熟期：9月17日頃</p> <p>代かき 播種</p> <p>4~5日程</p> <p>ボデーガードプロ 1キロ粒剤散布</p> <p>入水 2cm</p> <p>自然減水</p> <p>最低3日間 3cm以上</p> <p>落水出芽</p> <p>7~14日</p> <p>稲出芽</p> <p>稲1葉</p> <p>自然落水後は、飽水管理程度に土壌水分を保つ。</p> <p>初中期除草剤散布</p> <p>定期的に田干し</p> <p>中干し</p> <p>飽水管理</p> <p>落水</p>																				
施肥	<p>土づくり資材</p> <p>コシ直播一発くん (20~25kg/10a)</p> <p>珪酸加里プレミア (30~40kg/10a)</p>																				
除草体系	<p>播種直後</p> <p>ボデーガードプロ 1キロ粒剤 (1kg/10a)</p> <p>マスラオ 1キロ粒剤 (1kg/10a)</p> <p>稲1葉～</p> <p>デオレ1キロ粒剤 (1kg/10a)</p> <p>ベンケイ1キロ粒剤 (1kg/10a)</p> <p>バッチリLXジャンボ (400g/10a)</p> <p>※散布前に、必ず軽い田干しをすること</p> <p>稲3葉～</p> <p>レプラス1キロ粒剤 (1kg/10a)</p> <p>※残草した場合</p> <p>ヒエが残ったらクリンチャーで対応 (但し、収穫30日前まで)</p>																				
病害虫防除	<p>基幹防除</p> <p>葉いもち予防(6月中旬)</p> <p>オリゼメート1キロ粒剤 (1kg/10a)</p> <p>無人ヘリ防除 (2回)</p> <p>いもち病、紋枯病、カメムシ</p>																				
その他	<p>★播種量：乾粉3kg/10a</p> <p>★ほ場準備のポイント</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「苗立率」や「除草効果」に影響するので、ほ場の均平化に努める。 ・播種時の土壌の硬さは移植以上とし、代かきと播種の間隔で調整する。(播種は、落水状態で行う。) 																				

目標 530kg/10a

- ・苗立 40~70本/㎡
- ・穂数 380本/㎡
- ・籾数 75粒
- ・㎡あたり籾数 28,500粒/㎡
- ・千粒重 22.0g
- ・登熟歩合 85%

★乾粉20kgに必要なコーティング資材

- ・鉄コーティング比 0.5倍重
- A 粉美人11kg (鉄粉10kg+焼石膏1kg)
- ・仕上げの焼石膏
- B 焼石膏0.5kg(鉄粉の5%)

★種子準備

- ・コーティング作業
- ①種子消毒後、積算温度40~60℃を目安に浸種する。
- ②浸種した種籾を脱水し、コーティング作業に移る。
- ③種籾とAを混ぜ(Aは3回に分けて投入)、水を噴霧器でかけながら調節する。仕上げBを投入。

・酸化乾燥・保存

- ①苗箱乾燥の場合、1000cc/箱を目安に均等にならす。
- ②日陰で風通しの良い場所で1~2週間を目安に酸化乾燥(サビ色)させる。苗箱の中で部分的に粒が固着するので、日に1回ほぐし散水して酸化を促す。

切り取り線