

1 生育調査

品種	ID	調 査 場 所	草 丈 (cm)					㎡当たり茎数 (本／㎡)					株当たり茎数 (本／株)					葉 齢 (枚)				
			本 年	前 年		平 年		本 年	前 年		平 年		本 年	前 年		平 年		本 年	前 年		平 年	
					前年比		平年比			前年比		平年比			前年比		平年比			前年比		平年比
コシヒカリ	2	加賀市西島町																				
コシヒカリ	1	小松市月津町	33.1	33.3	99%	34.3	96%	341.2	256.5	133%	319.4	107%	19.6	15.1	130%	18.4	107%	8.6	8.3	104%	8.4	103%
コシヒカリ	2	小松市長田町	32.6	29.7	110%	30.3	108%	290.9	271.5	107%	312.6	93%	17.3	15.2	114%	17.1	101%	7.8	7.3	107%	8.0	98%
コシヒカリ	3	能美市秋常町	32.1	29.5	109%	32.1	100%	261.9	214.3	122%	317.0	83%	16.2	14.1	115%	18.6	87%	8.6	8.2	105%	8.4	103%
コシヒカリ	4	川北町下先出	32.4	28.2	115%	30.4	107%	187.1	142.9	131%	252.0	74%	11.0	8.1	136%	14.3	77%	7.1	6.6	107%	7.6	93%
コシヒカリ	平均	平 均	32.5	30.1	108%	31.8	102%	270.3	221.3	122%	300.2	90%	16.0	13.1	122%	17.1	94%	8.0	7.6	106%	8.1	100%
ゆめみづほ	1	加賀市西島町																				
ゆめみづほ	3	能美市中ノ江町	25.1	22.9	109%	27.7	91%	224.7	140.4	160%	318.6	71%	13.3	8.9	149%	18.9	70%	8.1	8.1	100%	8.6	95%
ゆめみづほ	4	川北町橘	31.5	29.5	107%	28.5	110%	436.9	187.9	233%	328.0	133%	25.5	10.2	250%	18.9	134%	9.8	8.4	116%	8.4	116%
ゆめみづほ	平均	平 均	28.3	26.2	108%	28.1	101%	330.8	164.1	202%	323.3	102%	19.4	9.6	203%	18.9	102%	8.9	8.3	108%	8.5	105%

2 生育概況

- ・草丈は、ゆめみづほ(平年比101%)、コシヒカリ(平年比102%)。
- ・㎡当たり茎数は、ゆめみづほは平年並(平年比102%)、コシヒカリは平年よりやや少なくなっている(平年比90%)。
- ・葉齢は、ゆめみづほ(平年+0.4葉)は平年よりやや多く、コシヒカリ(平年-0.1葉)は平年並。
- ・藻やガスが発生しているほ場が散見されている。
- ・葉色は全般的に平年より淡い。

3 病害虫発生状況

- ・一部ほ場でイネミズゾウムシ成虫が発生し、食害がみられる。
- ・畦畔等の雑草地では、カメムシが発生している。

4 今後の管理

- ・目標茎数(ゆめみづほ15本／株、コシヒカリ13本／株)が確保できていないほ場は、田干し(2～3日の落水)と浅水管理で茎数確保に努める。
- ・目標茎数を確保したほ場または田植後1ヶ月を目処に中干しを実施し、根の伸長を促進させるとともに過剰分けつを抑制することで登熟の向上を図る。
- ・中干し期間中(ゆめみづほ6月末まで、コシヒカリ7月初旬まで)は、土壌にひび割れができたら適宜入水し、ひび割れが大きくなりすぎないように水管理をする。
- ・中干し効果を高めるため、溝切りを実施し、今後の水管理の効率化を図る。
- ・斑点米カメムシの生息密度を下げるため、生息地となる畦畔や水田周辺の雑草地の除草を徹底する。