

大麦だより(第7号)

令和5年4月 日
J A 能 美
J A 根 上

○管内大麦の出穂予想(4月3日時点)

出穂期予想 : 4月4日～11日頃

※ 出穂期とは、ほ場の50%が出穂した日を指す

今後、気温が平年より高く推移すると、**出穂期が早まる可能性あり**

本年度の大麦の出穂は、地域・ほ場単位だけでなく、ほ場内でも出穂がバラついております。個人防除を行う場合は、出穂期を各自で確認し、適期に防除するよう、努めましょう。

明渠の補修について

・春作業の開始に伴い、**明渠の補修を実施**しましょう。

赤かび防除について

・赤かび発生防止のため、**出穂後2回の適期防除**を徹底してください。

<粉剤体系>

防除回数	防除時期	薬剤名	散布量 (10aあたり)
1回目	出穂期の3～5日後	トップジンM粉剤DL	4kg
2回目	1回目散布の7日後	ワークアップ粉剤DL	3kg

<液剤体系※無人ヘリ防除>

防除回数	防除時期	薬剤名	散布量 (10aあたり)
1回目	出穂期の3～5日後	トップジンMゾル	0.8L (8倍希釈)
2回目	1回目散布の7日後	ワークアップフロアブル	0.8L (10～16倍希釈)

※ 無人ヘリ防除の日程は、改めてご連絡いたします。

☆個人防除の留意事項☆

・防除は風の弱い早朝に散布すると飛散しにくいいため、薬剤の効果が高くなります。また、規定薬量の厳守をお願いします。