

令和7年度 くり防除情報②

令和7年8月7日発行 石川県くり生産振興会

- ・ 早生品種「丹沢」の収穫始め※は、生育の早い園で9/2頃、生育の遅い園で9/4頃と、平年に比べてやや早まる見込みです（※ 8/4までの気温で計算した推定日）
- ・ 農薬の収穫前日数に十分注意し、クリシギゾウムシの防除を実施しましょう！

○ 第3回防除適期

8/16 ~ 8/20※1
生育の早い園 生育の遅い園

対象病害虫	散布薬剤	濃度	使用時期	使用回数
クリシギゾウムシ	アディオオン乳剤	2000倍	収穫14日前まで	5回以内

※1 生育の早い園（輪島市門前・三井町内屋など）では8/15頃、生育の平均的な園（穴水町、能登町柳田・藤ノ瀬など）では8/18頃、生育の遅い園（能登町瑞穂、輪島市三井町市ノ坂など）では8/20頃までに散布する。

イガに十分かかるよう
散布しましょう！

○ 第4回防除適期

8/26 ~ 8/30※2
生育の早い園 生育の遅い園

対象病害虫	散布薬剤	濃度	使用時期	使用回数
クリシギゾウムシ	アグロスリン水和剤	1500 ~3000倍	収穫7日前まで	5回以内

要注意！

第4回防除の対象品種は、中生～晩生品種（ぼろたん、筑波、石鎚など）です。
早生品種（丹沢など）に農薬がかからないよう散布しましょう。

※2 生育の早い園（輪島市門前・三井町内屋など）では8/26頃、生育の平均的な園（穴水町、能登町柳田・藤ノ瀬など）では8/28頃、生育の遅い園（能登町瑞穂、輪島市三井町市ノ坂など）では8/30頃を目安に散布する。

詳しくはJ Aのと、または奥能登農林総合事務所にご相談下さい。