



能登やさしいこめづくり情報

能登ひかり収穫編

令和8年8月
能登米振興協議会
能登米生産者協議会
J A の 月

《「適期刈取り」で品質向上！》

今年も出穂後20日間の日平均気温が27℃を上回る「高温登熟年」となっています。
籾黄化率80%を目安に刈取りを開始し、刈遅れによる胴割粒の発生を防ぎましょう。
田植え時期・ほ場条件・生育条件等が異なるため、出穂がほ場によりバラついていま
す。**籾の黄化率および籾水分（下段参照）を確認し、適期刈取りを実施してください。**

【今年の刈取り適期（5月上旬田植えの場合）】 8月12日調査結果

品 種	出穂期	刈取り始期	刈取り適期
能登ひかり	7月17日	8月17日 (前年より2日早い)	8月19日～ 8月25日※


※今後の気象条件（高温）によっては収穫が早まる場合もあります。

今年も高温登熟による胴割粒に注意！



籾黄化率80%から刈取りを開始し、
黄化率85%までに収穫を終えましょう。

＜能登ひかり（1穂81粒）＞
籾黄化率80%とは・・・
穂下半分の籾に注目し、
1穂あたり13～18粒程度
「青籾」が残っている状態です。



能登北部営農推進協議会
公式LINEアカウント開設！
営農情報を発信していきますので
ぜひ、友だち登録をお願いします！

【籾の黄化程度による刈取適期予測】

籾の黄化程度	30% 1/3程度黄化	50% 1/2程度黄化	65% 2/3程度黄化	80%	85%	90%
刈取適期予測	15～13 日前	11～9 日前	7～5 日前	適期		刈遅れ

（参考）籾水分測定による刈取の判断

穀粒水分計（ライスタ等）をお持ちの方は、上記の籾黄化率とあわせて立毛中の籾水分（畔際は避ける）を籾モードで測定することで、より正確な刈取の判断が可能になります。

刈取の目安となる籾水分は**25%前後**です。