

# 営農だより



## 4月のポイント～10の推進技術・5つの1ヶ月対策～

●育苗日数は1ヶ月以内

生育ステージ	出芽期	緑化期	硬化前期・中期														硬化後期								
搬入後日数		1 2 3 4	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	21 22 23 24 25																					
適正温度	30℃	← ハウス管理 →																							
	20℃	昼間20℃～25℃														昼間15℃～20℃					外気温にならず				
	10℃	夜間15℃～20℃														夜間10℃～15℃									
水 管 理	—	原則灌水は行わない														前期・中期は1日1回程度					後期は1日1～2回程度 夕方はやらない				
被覆資材	昼	—	○	△														×							
	夜	—	◎	△														×							

◎被覆資材等の2枚がけ ○被覆資材が必要 △低温時のみ被覆 ×被覆資材不要

### ハウス管理

☆近年、緑化期間中のハウスの換気不足、高温管理（25℃以上）によって病気が発生しています。

搬入後	温度管理		水管理	
	温度計は苗の高さに設置!		天候に応じた水管理!	
緑化期 1～4日 苗丈3cm	<b>昼間20～25℃ 夜間15～20℃</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 高温（25℃以上）にならないように換気する。</li> <li>● ハウスを開けた場合は、夜温確保のため、午後3時頃までに閉める。</li> <li>● ミラーシートやシルバーポリトウ等の保温性が高いものを使用する場合はヤケに十分注意する。</li> </ul> <p>※ゆめみづほは緑化期間を十分にとり、苗丈2.5cmになったことを確認してから被覆資材を取るようにする。</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 原則灌水は行わないが、晴天が続く場合は土の状態をよくみて灌水する。</li> <li>● 灌水が多いと過湿状態が続くため、床土の温度が上がらず生育が遅れる。又、カビの発生にもつながる。</li> </ul> <p>※本店育苗センター出芽苗については、蒸気で加湿し十分に水分を含んでいるため、<u>原則ハウス搬入時に灌水の必要はありません。</u></p>	
硬化前期 5～20日 葉齢1～1.5	<b>昼間15～20℃ 夜間10～15℃</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 極端な低温時や強風時以外の日中は、ハウスを開け換気に努める。</li> <li>● 午後3～4時頃にはハウスを閉め、保温に努める。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 灌水は原則として午前中1回とし、箱の底まで水が浸透するよう十分に行う。（雨や曇りの日は灌水を控える）</li> <li>● 晴天時に床土が乾燥し、2回目の灌水が必要な場合は、午後3時までに行う。</li> <li>● この時期の過湿は生育ムラにつながります。（苗の短い箇所は、カビの発生や根張り不足、軟弱化の原因になります。）</li> </ul>	
硬化後期 21～25日 葉齢2～2.5	<b>原則外気温</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 日中はハウスのビニールをめくり、温度が上がるときはハウスの腰部も開け、換気する。</li> </ul> <p>※強風や霜などには注意する。</p>		<p>※ 毎朝たっぷり1回灌水する。苗箱のフチは乾きやすく、灌水ムラができやすいので十分灌水する。2回目以降の灌水が必要な場合は午後3時まで済ませる。</p>	


## カビ及びムレ苗対策

対象病害	原因	薬剤名	使用期間	処理方法
白・青カビ	育苗初期によく見られ、高温・過湿条件で発生。	ダコレート水和剤	は種時から緑化期 但し、は種14日後まで	500倍液（水100ℓに200g）を1箱当たり 500ml灌注する。総使用回数：2回以内
赤カビ	高温条件で発生。	タチガレースM液剤	は種時又は発芽後	500倍液（水100ℓに200ml）を1箱当たり 500ml灌注する。総使用回数：1回以内
ムレ苗	急激な温度変化による 生理障害。	タチガレースM液剤	は種時又は発芽後	500倍液（水100ℓに200ml）を1箱当たり 500ml灌注する。総使用回数：1回以内


育苗日数が長く葉色がさめてきた苗には、液肥10号200倍液（水10ℓに50ml）を田植え3日前～前日に500ml/箱を2回灌注する。灌注後は、葉焼け防止のため軽く灌水する。

老化苗にさせない！（老化苗は植傷みの原因になり、生育が遅れます。）


## 苗箱の置き方のポイント



## 田植時の良い苗



## 緑化期の障害の例



※温度が低すぎても高すぎてもよくないので温度管理に十分気をつける。

## 本田の準備 ～とても重要な代かき作業～

①圃場の均平	代かきによる圃場の田面の高低差をなくすことにより、雑草を生えさせない効果があり、田面の低いところは均平にすることによって生育ムラをなくしたり、薬害を生じさせない効果がある。
②土壌の硬度	田植作業の能率と精度を上げることに繋がる。代かきは浅水で行い、ねりすぎないようにするとよい。
③河川汚濁防止に配慮	代かき中や、代かき後に濁り水を落水しない。

代かき時の濁水は  
河川へ流入させない！！

