

営農だより

田植えは品種の
植え間違いに
気をつけましょう!!



4月・5月のポイント～10の推進技術・5つの1ヶ月対策～ (営農ブックP23.24参照)

- 植付本数は1株当たり3～4本
- 栽植密度は基本の60株植え
- 5月田植えの励行 (コシヒカリ)

■田植えのポイント ひやくまん穀は60株以上を推奨します

植付け株数/坪	60株	・ 茎と根を太く丈夫にする (倒伏、乳白粒対策) (基本は60株植えですが、地力の高い圃場では50株植えも可能です)
使用箱数/10a	18箱	
植付け本数	1株に3～4本	・ 過剰生育の抑制
植付け深さ	3cmの浅植え	初期生育の促進
補 植	連続欠株のみ行う	除草剤散布後は除草剤の効果が劣るため行わない


- 代かきは浅水でおこない、濁った水を排水路に流さないようにする。
- 田植え後5日間程度は深水管理とし、苗を保護する。

■苗箱施用剤 (ハウスで後作として作物を栽培する場合はハウス内で散布しない。)

ゆめみづほ・ひやくまん穀

薬 剤 名	散布時期	散布量	対 象 病 害 虫 (移植当日の場合)
エバーゴルフフォルテ箱粒剤	は種時(覆土前)～移植当日	50g/箱	いもち病・疑似紋枯症・白葉枯病・紋枯病・内穎褐変病・もみ枯細菌病 イネミズゾウムシ・イネドロオウムシ・ウンカ類・ツマグロヨコバイ

箱剤と除草剤を
間違えないように
注意しましょう!



コシヒカリ

薬 剤 名	散布時期	散布量	対 象 病 害 虫 (移植7日前～移植当日の場合)
Dr.オリゼリディア箱粒剤	移植7日前～移植当日	50g/箱	いもち病・白葉枯病・イネカラバエ・イナゴ類・ウンカ類・ イネヒメハモグリバエ・イネミズゾウムシ・イネドロオウムシ・ ニカメイチュウ・ツマグロヨコバイ・フタオビコヤガ
ブイゲットバリアード粒剤	移植10日前～移植当日	50g/箱	対 象 病 害 虫 (移植当日の場合) いもち病・白葉枯病・もみ枯細菌病・イネミズゾウムシ・ イネドロオウムシ・ツマグロヨコバイ・ニカメイチュウ

※Dr.オリゼリディア箱粒剤・ブイゲットバリアード粒剤は紋枯病に対する効果はありません。

■地域別施肥基準 ～過剰生育・栄養凋落しないよう努めましょう～


土 壤	肥 料 名	基肥一発 (kg/10a)			分施肥体系 (kg/10a)				
		コシヒカリ	ゆめみづほ	ひやくまん穀	全層施肥	側条施肥	コシヒカリ	ゆめみづほ	ひやくまん穀
砂質土 乾田	けい酸アップ・コシ一発くん	40～46			BB 056号	側条 10号	25～30	40	40
	新コシ一発くん コシ一発くんDX24	30～35							
	コシ一発くんNEOα	24～28							
	新早生一発くん 早生一発くんDX28 早生一発くんNEO		40						
	ひやくまん穀一発くん			38～40					
	けい酸アップ・コシ一発くん	32～40							
埴壤土 半湿地	新コシ一発くん コシ一発くんDX24	25～30			BB 056号	側条 10号	20～25	35～40	35
	コシ一発くんNEOα	20～24							
	新早生一発くん 早生一発くんDX28 早生一発くんNEO		35～40						
	ひやくまん穀一発くん			35～38					
	けい酸アップ・コシ一発くん	26～32							
	新コシ一発くん コシ一発くんDX24	20～25							
埴壤土 湿地	コシ一発くんNEOα	16～20			BB 056号	側条 10号	15～20	35	30
	新早生一発くん 早生一発くんDX28 早生一発くんNEO		35						
	ひやくまん穀一発くん			35					
	けい酸アップ・コシ一発くん	26～32							
	新コシ一発くん コシ一発くんDX24	20～25							
	コシ一発くんNEOα	16～20							

- ※①上記基準は目安です。営農ブック(土壌分析結果P35～)を参考に施肥量を調整して下さい。
- ②圃場によって地力差があるので、圃場条件にあわせて基肥量を設定して下さい。
- ③砂質土壌など地力の低い圃場では、上記目安より1～2割程度増肥して下さい。

代かきは浅水で行い、田植え時の濁り水流を防止しましょう。

農作業後に公道に出る際は、できるだけ泥を落としていただくようご協力お願いします。

水稲除草剤体系



※上記内容はJA加賀オススの体系です。


除草剤使用上の留意点

- ①藻類・表層はく離の発生前に散布すること。(発生時にはモグトン粒剤を3kg/10a散布)
- ②粒剤は、動散等で均一に散布する。


田植え同時散布の注意点

- ①代かきは丁寧にいき、田面をできるだけ均平にする。
- ②強風の際は田植えを控える。(薬害の恐れあり)

水管理は除草剤の効果安定のキーポイント!



- ①除草剤がよく拡散するように、十分な湛水状態にしてください。
- ②除草剤散布後 3~4 日間は通常の湛水状態を保ってください。
- ③散布後 7 日間は落水・かけ流しをしないでください。
- ④除草剤散布後は田んぼに入らないでください。散布後の補植はしないでください(除草剤散布前に済ませる)。
- ⑤水持ちが悪いほ場でやむを得ず入水するような場合はなるべく静かに入水してください。



散布後、処理層が形成・安定するまで約3日間かかります。この間の急激な入水・落水は効果の低下に直結します。

3日間は湛水を保つことを心がけ、7日間の止水管理を守りましょう。

除草剤散布前～散布時の水管理

- ①除草剤散布時に田面が露出しないようにたっぷり湛水しましょう。
- ②畦畔からの水漏れをチェックしましょう。
- ③散布前にもう一度、水口・水尻をチェックしましょう。
- ④減水深が 2 cm / 日以上 of 漏水田では除草効果が落ちます。



除草剤は
水管理の徹底!

